SERRAPEPTIDASE LEMMA

ENZIMA PROTEOLÍTICA COM POTENTE ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA

Enzima proteolítica derivada da enterobactéria não patogênica pertencente ao gênero *Serratia* que tem se revelado alternativa aos anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Tem sido usada com sucesso há quase 40 anos no alívio da dor e inflamação em patologias como artrite, trauma, cirurgia, sinusite, bronquite e síndrome do túnel do carpo. Como alternativa viável aos AINEs, ao contrário destes fármacos é desprovida de efeitos secundários gastrointestinais.

Serrapetidase efeito anti-inflamatório

Pós-operatório e inchaço traumático:	Serrapetidase *vs* aplicação ou não de gelo, elevação da perna e repouso.	Serrapeptidase reduziu o inchaço em 50% no 3° dia após a operação, além de reduzir rapidamente a dor.
Síndrome do túnel do carpo	Serrapeptidase 10mg 2x ao dia vs placebo	Serrapeptidase proporcionoi melhora clínica significativa, resultado que foi apoiado por melhora nos parâmetros eletrofisiológicos.
Ingurgitamento mamário	Serrapeptidase 10mg 3x ao dia vs placebo	A serrapeptidase proporcionou significativa melhora na dor no peito, inchaço e endurecimento mamário.

Evidências demonstram que a serrapeptidase auxilia na redução do inchaço e alívio da dor em patologias inflamatórias, sugerindo seu uso como alternativa anti-inflamatória ao AINEs.

Serrapetidase efeito analgésico

A capacidade da serrapeptidase em reduzir e drenar o fluido a partir da área inflamada pode reduzir o inchaço e a dor e ainda, reduz a dor através da sua capacidade de bloquear a liberação de aminas dolorosas aos tecidos inflamados.

Serrapetidase na otorrinolaringologia

Pacientes com patologias aguda ou crônica de ouvido, nariz e garganta que ingeriram serrapeptidase apresentaram redução significativa da intensidade da dor, quantidade de secreção, dificuldade de engolir, disfonia e obstrução nasal.

Serrapetidase efeito antimicrobiano

Estudos demonstram que a serrapeptidase associada à antibióticos é capaz de proporcionar o aumento das concentrações destes no local da infecção.

As bactérias podem passar por um processo de produção de biofilme, que resulta em resistência a antibióticos. A serrapeptidase, pode melhorar significativamente a eficácia dos antibióticos contra biofilme e possa inibir a formação deste.

A serrapeptidase demonstrou capacidade em aumentar a atividade de diversos antibióticos, incluindo ampicilina, cefalexina e minociclina.

Serrapetidase indicações

- Ortopedia (inchaço traumático após lesão esportiva, síndrome do túnel do carpo, infecção osteoarticular para aumentar a concentração de antibióticos no local da infecção);
- Cirurgia (inflamação pós-operatória e traumática, doença inflamatória venosa, cistite e epididimite);
- Ginecologia (ingurgitamento mamário);
- Odontologia (anti-inflamatório e para aumentar a concentração de antibiótico no local da periodontite).

Contato: (11) 5044-7234. lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br
lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

Serrapeptidase enzima proteolítica anti-inflamatória

Serrapetidase benefícios

- **Inflamação crônica**: estudos confirmam as suas propriedades anti-inflamatórias e que tem sido utilizada por esta razão na redução de sinusite crônica e outras condições inflamatórias crônicas e agudas;
- **Lesões traumáticas**: amplamente utilizada na Europa como um suplemento para lesão traumática (como entorses e ligamentos), bem como a inflamação associada com pacientes pós-cirúrgicos;
- **Dor e edema**: aprovada em muitos países como medicamento padrão para inflamação e inchaço;
- **Doença fibrocística da mama**: reduz a dor, inchaço e endurecimento das mamas. Ação relacionada com o fato desta enzima ter ação fibrinolítica, proteolítica e antiedêmica;
- **Síndrome do túnel do carpo**: eficaz na redução dos sintomas associados a esta patologia.

Serrapetidase: 10-60mg/dia.

Serrapetidase contraindicações

Se administrado junto à varfarina, clopidogrel ou aspirina, bem como remédios naturais como alho, óleo de peixe e açafrão pode haver aumento do risco de hemorragias ou hematomas.

Serrapetidase recomendações

A dose utilizada em estudos clínicos com esta enzima varia de 10-60mg por dia. A indicação é para ser administrada com estômago vazio ou pelo menos 2h depois de comer e nenhum alimento dever ser consumido por cerca de meia hora depois da administração.

Serrapetidase

Serrapeptidase LEMMA	**10-60mg**
Excipiente qsp	Uma unidade

Administrar uma dose ao dia.

*** Serrapeptidase LEMMA não necessita de cápsulas gastrorresistentes, pois o ativo é comercializado em grânulos revestidos.**

Recomendação terapêutica para doenças inflamatórias

Serrapeptidase LEMMA	**10- 30mg**
GliSODin®	50 – 250mg
Bifidobacterium breve LEMMA	1 bilhão UFC
Bifidobacterium infantis LEMMA	1 bilhão UFC
Bifidobacterium longum LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus acidophilus LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus crispatus LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus paracasei LEMMA	1 bilhão UFC
Excipiente qsp	Uma unidade

Administrar uma dose, uma a duas vezes ao dia.

Probióticos LEMMA induzem a produção de citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β. Além disso, inibem a inflamação neutrofílica, a geração de TNF-α, citocinas pró-inflamatórias, e proliferação de células CD4+.

Referências consultadas:

Bhagat S, Agarwal M, Roy V. Serratiopeptidase: a systematic review of the existing evidence. Int J Surg. 2013;11(3):209-17.
Edward F. The health Benefits of Serrapeptase. Disponível em: http://wakeup-world.com/2012/10/26/the-health-benefits-of-serrapeptase/.
Esch PM, Gerngross H, Fabian A. Reduction of postoperative swelling. Objective measurement of swelling of the upper ankle joint in treatment with serrapeptase-a prospective study. Fortschr Med 1989;1
Jadav SP, Patel NH, Shah TG, Gajera MV, Trivedi HR, Shah BK. Comparison of anti-inflammatory activity of serratiopeptidase and diclofenac in albino rats. J Pharmacol Pharmacother 2010;1:116e7.
Kee WH, Tan SL, Lee V, Salmon YM. The treatment of breast engorgement with Serrapeptase (Danzen); a randomized double-blind controlled trial. Singapore Med J 1989;30:48e54.
Mazzone A, et al. Evaluation of Serratia peptidase in acute or chronic inflammation of otorhinolaryngology pathogoly: a multicentre, double-blind, randomized trial versus placebo. J Int Med Res.
Panagariya A, Sharma AK. A preliminary trial of serratiopeptidase in patients with carpal tunnel syndrome. J Assoc Physicians India 1999;47:1170e2.
Redferm R. The Miracle Enzyme is Serrapeptase. Naturally Healthy Publications, 2009.
Ross MR, Cho M. Serratiopeptidase: The Miracle Enzyme. Disponível em: http://pds11.egloos.com/pds/200901/22/51/serratiopeptidase.pdf.
Selan L et al. Proteolytic enzymes: a new treatment strategy for prosthetic infections? Antimicrob Agents Chemother. 1993; 37(12):2618-21.
Tsuyama N, Yoshio Oi, Makoto F. Clinical evaluation on anti-swelling drug-A-4700 (Reparil tablet) in orthopaedic field. A comprehensive double blind controlled trial compared with serratiopeptidase and placebo in 20 orthopedic clinics. Rinsho Hyoka (Clin Eval) 1977;5:535e75.
ViswanathaSwamy AHM, Patil PA. Effect of some clinically used proteolytic enzymes on inflammation in rats. Indian J Pharm Sci 2008;70:114e7.

LEMMA

Contato: (11) 5044-7234. lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br
lemma.supply - facebook.com/lemma.supply