DERMAXYL™

INCI NAME: C12-15 Alkyl Benzoate, Tribehenin, Ceramide NG, PEG-10 Rapeseed Sterol, and Palmitoyl Hexapeptide-12

- Restaura a firmeza e contornos faciais após o emagrecimento (era GLP-1 e GIP)
- Preenchimento cosmético para coesão da epiderme à derme
- Lipopeptídeo enriquecido com ceramidas que também fortalece a barreira cutânea

Lipopeptídeo redensificador para a nova demanda da estética pós canetas emagrecedoras

O uso crescente de análogos de GLP-1 e GIP, nas canetas emagrecedoras, tem transformado o cenário do emagrecimento rápido. No entanto, a perda de gordura subcutânea e o afinamento facial resultantes desse processo têm levado a uma nova demanda estética pós canetas emagrecedoras, caracterizado por **flacidez, perda de volume e sulcos acentuados**.

Nesse contexto, **DERMAXYL™**, surge como uma solução eficaz e segura para o **tratamento e a prevenção da flacidez facial**, especialmente em peles afetadas por emagrecimento acelerado. Composto por **Palmitoyl Hexapeptide-12**, o ativo estimula a **síntese de colágeno e glicosaminoglicanos**, reforçando a matriz extracelular e melhorando a **coesão e firmeza da epiderme**.

Estudos in vitro e clínicos demonstram que **DERMAXYL™** contribui para a reparação da função barreira, suavização de rugas e aumento da espessura dérmica – atributos fundamentais para **restaurar o contorno facial**, devolver elasticidade e combater os sinais de colapso cutâneo associados ao emagrecimento.

O que é o colapso cutâneo e por que ele ocorre após o emagrecimento acelerado?

A pele é um órgão elástico que se adapta ao volume do corpo ao longo do tempo. Quando ocorre um emagrecimento rápido — como o provocado pelo uso das canetas emagrecedoras (agonistas GLP-1 e GIP) — há uma **redução abrupta do tecido adiposo subcutâneo**, especialmente na face, descrito por alguns pacientes como a sensação de derretimento da face.

DERMAXYL™ trata e previne os <u>três principais sintomas</u> do colapso cutâneo causados pelo emagrecimento rápido:

1. **Frouxidão das fibras de sustentação**: a perda da gordura da face que age como suporte para os tecidos da derme provoca o "desabamento" da derme com fragilidade para o sistema colágeno-elastina e intensificação dos sulcos.

Estudo (IN VIVO) realizado com 24 voluntárias com idades entre 42 e 66 anos.

Aplicação diária de uma emulsão (colorida oubranca) contendo 2 % de **DERMAXYL™**, por 2 meses.
Avaliação por análise de imagens (profilometria).

Figura 1: Cases de sucesso após 56 dias de uso do **DERMAXYL™** 2% na reversão do colapso cutâneo. Voluntárias com idade média de 62 anos que não fazem reposição hormonal utilizaram a formulação duas vezes ao dia antes da maquiagem ou fotoprotetor. Nota-se reversão importante dos sulcos característicos da perda acentuada de gordura (Fonte: Literatura **DERMAXYL™** - Croda/Sederma)

A pele ao redor dos olhos é uma das primeiras a sofrer os efeitos do colapso cutâneo induzido pelo emagrecimento rápido. A perda de volume subcutâneo e a fragilidade dérmica se traduzem em rugas marcadas, sulcos e flacidez nessa área.

O **DERMAXYL™**, através do peptídeo Palmitoyl Hexapeptide-12, atua como um sinalizador dérmico, promovendo a síntese de colágeno tipo I e III, além de glicosaminoglicanos essenciais à integridade da matriz dérmica.

Em estudos clínicos, observou-se redução de até 36% na profundidade das rugas, com melhora visível da espessura da pele e da coesão entre as camadas cutâneas.

Por isso, a região dos olhos torna-se referência de eficácia, especialmente em peles que passaram por perda de gordura facial, pois demonstra a capacidade de reestruturação dérmica do ativo, mesmo em zonas frágeis e marcadas.

IN VITRO		IN VIVO	
Colágeno Tipo I	**+ 186%**	Profundidade de rugas	**- 36%**
GAG	**+ 179%**	Espessura epiderme	**+ 20%**
Fibronectina	**+ 175%**	Superfície ocupada por sulcos profundos	**- 98%**

2. **Desorganização da matriz extracelular**: estruturas como colágeno, ácido hialurônico e GAGs ficam prejudicadas enfraquecendo a coesão entre a derme e a epiderme. Isso gera sulcos mais marcados e perda de elasticidade.

DERMAXYL™ atua mimetizando os sinais naturais da pele para ativar a **síntese de Colágeno I, GAGs e fibronectina**. Isso promove a **reorganização da arquitetura dérmica**, melhora a espessura da pele e restaura a função barreira — elementos fundamentais na recuperação estética da pele pós-perda da gordura subcutânea.

A musculatura ao redor da boca está **em constante uso** — falamos, sorrimos, mastigamos, engolimos, fazemos expressões. A camada de gordura nessa área já é naturalmente fina — e com a perda rápida de peso provocada por canetas emagrecedoras, ela desaparece quase por completo.

O uso contínuo de **DERMAXYL™** reestrutura a pele, reduzindo gradualmente a profundidade das rugas mesmo em áreas de movimentação constante.

Na região perioral, onde o afinamento dérmico e a tração muscular favorecem o aparecimento de rugas verticais e sulcos profundos, **DERMAXYL™** repara a arquitetura interna da pele, melhora sua espessura e reduz a profundidade das linhas ao redor dos lábios.



Ao redor dos lábios:

Aumento da firmeza: **+ 85%**
Melhora do contorno labial: **+ 80%**
Redução de vincos e linhas: **- 32,8%**

Figura 2: Reversão quase que total da profundidade das rugas periorais em voluntárias que usaram **DERMAXYL™** 2% por 56 dias. (Fonte: Literatura **DERMAXYL™** - Sederma/Croda)

3. **Pele mais fina e opaca**: a redução do tecido subcutâneo de suporte (gordura) e a desorganização matricial enfraquecem a epiderme tornando-a mais susceptível a perda d'água e sensibilidade.



Figura 3: **Melhora imediata da superfície cutânea** após a aplicação de **DERMAXYL™** 2% provando o benefício de devolver a coesão cutânea desde a epiderme, traduzindo em uma barreira cutânea mais homogênea e consequente aumento do teor de água epidermal (Fonte: Literatura **DERMAXYL™** - Sederma/Croda)

É o **único lipopetídeo do mercado** que associa **ceramida NP real**, bioidêntica à presente naturalmente na pele humana. Essa associação melhora a permeação e a entrega da ceramida nas camadas mais profundas da epiderme, onde ela atua reforçando diretamente a função barreira cutânea. **DERMAXYL™** devolve o viço que o emagrecimento apagou.

O quarto mecanismo de reversão do colapso cutâneo é o estímulo dos coxins de gordura da face que servem de apoio para o tecido conjuntivo já descrito. Desta forma, recomendamos a associação do **DERMAXYL™** com **VOLUFILINE™** também da Croda (Sederma).

Consulte a formulação **25011** – Gliplastia Tópica – cosmética inspirada na era GLP-1/GIP com **DERMAXYL™** e **VOLUFILINE™**

Farmacotécnica e como incorporar DERMAXYL™ aos diferentes veículos dermocosméticos:

DERMAXYL™ por ser um Lipopeptideo rico em Ceramida NP possui coloração branca a levemente amarelada e consistência de pasta. Para facilitar a incorporação, recomendamos um rápido aquecimento em banho-maria deste ativo com uma pequena parte do veículo até completa homogeneização. Aguardar o esfriamento para incorporar o restante do veículo.

Temperatura máxima de estabilidade: 85 °C

pH de estabilidade: 3,0 – 9,0

Indicado para emulsões em geral (diferentes reologias), Gel Creme e Séruns (com adição de opacificante)

Dosagem de uso: 2%

Ideias de desenvolvimento:

- Pós procedimento
- Cuidado labial anti-idade
- Área dos olhos, olheiras e linhas finas
- Cuidado para pele fina e madura
- Tratamento pré e pós GLP-1/GIP (canetas emagrecedoras)

Referência:

Literatura original **DERMAXYL™** - Sederma (uma empresa Croda – Beauty)