INCI name: Salicylamide, PEG-8.

Uso: Externo

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

CELULINOL

DESINTOXICANTE E ANTI-INFLAMATÓRIO CUTÂNEO

O Celulinol possui uma associação sinérgica de éster do ácido salicílico (salicilamida) em polioxietileno. Indicado para formulações potentes de uso tópico que auxilia no combate da celulite e da gordura localizada uma vez que age na lipólise e na desintoxicação cutânea. Além disso, o Celulinol favorece a mobilização da gordura localizada, agindo também sobre a estrutura cutânea, fortalecendo as fibras e combatendo a flacidez.
Possui ação anti-inflamatória, descongestionante, adstringente, queratolítico, amaciante da camada queratinizada, absorvedor de radiação ultravioleta, sendo indicado como coadjuvante no tratamento da celulite, paniculoses, lipoescleroses, fibroedemas, adiposidades.

Recomendação de uso

Em géis, cremes e loções, de 3 a 10%.
O Celulinol não é agente irritante nem sensibilizante da pele e mucosas, mesmo em altas concentrações (30 – 40%).

Aplicações

Coadjuvante no tratamento da celulite, paniculoses, lipoescleroses, fibroedemas, adiposidades.

Farmacotécnica

O produto se apresenta líquido e é facilmente adicionado na fase final de formulação à temperatura ambiente dispensando a pré-solubilização.
pH de estabilidade é de 5,5 – 6,5.

Referências Bibliográficas

1. Souza, V.M.; Antunes-Júnior, D.; Ativos dermatológicos; Ed Especial (V1 a V4); Pharmabooks, São Paulo, 2009.

Última atualização: 18/07/2017 BM.