Bifidobacterium adolescentis LEMMA

Eficácia comprovada no tratamento do melasma

A radiação UV induz a formação de espécies reativas de oxigênio (EROS) no tecido cutâneo provocando alterações tais como a peroxidação lipídica, aumento de enzimas que degradam o colágeno, provocando flacidez e rugas além da estimulação da enzima tirosinase, aumentando consideravelmente o risco de hiperpigmentações cutâneas. Estudos científicos demonstram que o consumo de determinados probióticos reduzem a produção de EROS devido suas propriedades antioxidantes e estimulação da integridade estrutural da barreira cutânea. O *Bifidobacterium adolescentis* tem demonstrado ser uma terapia eficaz do melasma devido suas atividades anti-melanogênicas e antioxidantes.

Estudo *in vitro* avaliou a capacidade do *Bifidobacterium adolescentis* em inibir a enzima tirosinase e na redução do teor de melanina nos adipócitos, além disso, foi avaliada a capacidade antioxidante da cepa em células de melanoma B16F10.

Capacidade de inibição da tirosinase do *B. adolescentis*



Redução do teor de melanina do *B. adolescentis*



***Bifidobacterium adolescentis* apresenta forte atividade de inibição da enzima tirosinase, com efeito muito superior ao ácido kójico.**

***Bifidobacterium* adolescentis apresentou efeito inibitório mais potente sobre a síntese de melanina do que a do ácido kójico e o arbutin.**

***Bifidobacterium* adolescentis apresentou forte atividade antioxidante, muito superior quando comparadas à vitamina C e vitamina E, consideradas padrões antioxidantes.**

*** Este ensaio se baseia na medida da capacidade antioxidante de uma determinada substância em sequestrar o radical DPPH.**

Bifidobacterium adolescentis LEMMA no Herpes simples

Estudo avaliou a atividade antiviral do *Bifidobacterium adolescentis* contra vírus *Herpes simplex* tipo 1. Os resultados confirmam que as cepas de *B. adolescentis* apresentam atividade antiviral contra o vírus *Herpes simplex* tipo 1.

Benefícios do *Bifidobacterium adolescentis* LEMMA

1. **Inibição significativa da enzima tirosinase com potente redução do teor de melanina;**
2. **Potente atividade antioxidante;**
3. ***Bifidobacterium adolescentis* LEMMA é uma excelente opção no tratamento de hiperpigmentações cutâneas como o melasma;**
4. **Atividade antiviral contra o vírus Herpes simplex do tipo 1.**

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

Bifidobacterium adolescentis eficácia no tratamento hiperpigmentações cutâneas

ANTIMELASMA E FOTOPROTEÇÃO CUTÂNEA	
Bifidobacterium adolescentis LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus johnsonii LEMMA	1 bilhão UFC
GliSODin®	50mg
Ace 30 (*Blackcurrant* – 30% antocianinas)	50mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose ao dia.

Previne a depleção das células de *Langerhans* epidérmicas após a exposição à radiação ultravioleta, ao mesmo tempo em que limita a produção de IL-10.

GliSODin® previne significativamente a produção de radicais livres, que são um gatilho para síntese descontrolada de melanina e sua eficácia no tratamento do melasma tem sido comprovada em diversos ensaios clínicos.

Potente atividade antioxidante e anti-inflamatória. Além disso, os polifenois evitam vários efeitos cutâneos adversos provocados pela radiação UV.

Estudos clínicos compravam que o hexilresorcinol é 4x mais potente que a hidroquina por possui 4 diferentes mecanismos de ação contra formação da melanina.

Mecanismo clareador potente, eficaz e inovador: inibe duas outras proteínas relacionadas à tirosinase, denominadas TRP-1 e TRP-2 também participam dessa via.

Clareador potente e eficaz	
Synovea® HR (Hexilresorcinol)	0,3%
ActiCinol® (Butilresorcinol)	0,3%
Creme base qsp	30g

Aplicar em toda a face à noite.

ANTI-AGING (INSIDE) DE AÇÃO RÁPIDA	
GliSODin®	50-150mg
Bifidobacterium adolescentis LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus johnsonii LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus plantarum LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus salivarius LEMMA	1 bilhão UFC
Lactobacillus rhamnosus LEMMA	1 bilhão UFC
Streptococcus thermophilus LEMMA	1 bilhão UFC
Bifidobacterium breve LEMMA	1 bilhão UFC
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

* Estudos científicos demonstram que os probióticos quando associados à superóxido dismutase (GliSODin®) tem demonstrado contornar os mecanismos intrínsecos e extrínsecos do envelhecimento através de diferentes mecanismos de ação.

LIFTING E PREENCHIMENTO INSTANTÂNEO	
Fiflow BTX	5%
Kopyeast	0,5 %
Phytodermina Lifting	1%
Dermahyal Vitaplus Factor	1%
Sytenol A	0,3%
Creme base qsp	30g

Aplicar na face duas vezes ao dia.

* Extrato do lisado de *Saccharomyces cerevisiae* que hidrata a pele através do aumento da captação de umidade, além de estimular fibroblastos, a síntese de colágeno, fibras de elastina bem como ácido hialurônico. Phytodermin® compensa quase que completamente o fotoenvelhecimento prematuro e restabelece o balanço fisiológico da pele fotoenvelhecida ou estressada pelas influencias ambientais. Dermahyal é um sistema de liberação do ácido hialurônico *cross-linked* (tecnologia que fornece a durabilidade do ácido ao organismo) associado aos benefícios das vitaminas B1 + B2 + B5 + B6 + B9 + B12, proporcionando intensa hidratação cutânea e efeito anti-aging prolongado. Sytenol, A possui efeito *retinol-like* (ação semelhante aos dos retinoides). Promove aumento da renovação celular, estimula a produção de colágeno, o que proporciona efeito antienvelhecimento exacerbado.

Referências consultadas:

Huang HC, Chang TM. Antioxidative properties and inhibitory effect of Bifidobacterium adolescentis on melanogenesis. World J Microbiol Biotechnol. 2012 Sep; 28 (9):2903-12.

An HM, et al. Antiviral activity of Bifidobacterium adolescentis SPM 0214 against herpes simplex virus type 1. Arch Pharm Res. 2012 Sep; 35(9):1665-71.

Diehl C. Melanocytes and Oxidative Stress. Pigmentary Disorders 2014, 1:4.

Sec¸kin HY, et al. Oxidative stress status in patients with melasma. Cutan Ocul Toxicol. 2014 Sep;33(3):212-7.

Mac-Mary M, et al. "Could a photobiological test be a suitable method to assess the anti-oxidant effect of a nutritional supplement (Glisodin®)?" European Journal of Dermatology, 2007.

Uchida R, Ishikawa S, Tomoda H. Inhibition of tyrosinase activity and melanine pigmentation by 2-hydroxytyrosol. Acta Pharmaceutica Sinica B 2014;4(2):141–145.

Goldberg LD, Crysler C. A single center, pilot, double-blinded, randomized, comparative, prospective clinical study to evaluate improvements in the structure and function of facial skin with tazarotene 0.1% cream alone and in combination with GliSODin(®) Skin Nutrients Advanced Anti-Aging Formula. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014 May 14;7:139-44.

Le Quéré S, et al. The role of superoxide dismutase (SOD) in skin disorders: A review. Nutrafoods (2014) 13:13-27.

Tabart J, et al. Antioxidant and anti-inflammatory activities of Ribes nigrum extracts. Food Chemistry.April 2012, 131(4): 1116–1122.

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234

lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply