Azeco
Cosmeceuticals

Ácido azelaico - grau cosmético

Arquivo de informações sobre cuidados com a pele

Quando **qualidade e confiabilidade** vêm em primeiro lugar

Azepur99®

Ácido azelaico 100% biológico, de grau cosmético e alta pureza, obtido a partir de óleo de girassol altamente refinado de origem europeia, aprovado pelo COSMOS.

Informações do produto

O ácido azelaico é um ácido dicarboxílico saturado de cadeia linear naturalmente presente no centeio, trigo e cevada. Não foi identificado um único mecanismo de ação para explicar os vários efeitos benéficos do ácido azelaico na pele. Na verdade, é bem conhecido na técnica, devido aos resultados de vários trabalhos científicos experimentais precisos, que o ácido azelaico tópico possui propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas, além de ação comedolítica. Ele também inibe competitivamente a tirosinase, uma enzima envolvida na conversão da tirosina em melanina, e pode reduzir a hiperqueratinização epidérmica. Portanto, o Azepur99® é um agente antibacteriano e antiproliferativo que pode ser usado para tratar a pele reduzindo o crescimento de bactérias no folículo, reequilibrando a queratinização. Ele tem aplicações em formulações antienvelhecimento, estimulação do crescimento dos pelos, produtos de redução da hiperpigmentação.

Os produtos à base de Azepur99® de grau cosmético são o padrão da indústria para a qualidade dos produtos cosméticos e a garantia de fornecimento global. Ele é aprovado pelo COSMOS.

	Informações gerais
NOMENCLATURA INCI e identificação química	ÁCIDO AZELAICO ÁCIDO NÃO NONADIÓICO, CAS: 123-99-9
ASPECTO	Pó micronizado branco a esbranquiçado
ORIGEM	Produto 100% biológico obtido a partir de óleo de girassol
PROCESSO DE FABRICAÇÃO	O Azepur99® é obtido pela clivagem oxidativa da dupla ligação da cadeia oleica do triglicerídeo do óleo de girassol, conforme a seguinte reação:  R = H, grupo alquila
PUREZA	mínima 99%
SOLUBILIDADE	Solúvel em glicóis, glicerina e álcoois, facilmente dispersável em ésteres polares graças à sua distribuição única de tamanho de partícula.
PROPRIEDADES COSMÉTICAS	Azepur99® normaliza a microflora da pele. Azepur99® tem efeito anticomedonal ao diminuir a quantidade de hiperqueratinização da pele. Azepur99® diminui a atividade da tirosinase e a síntese de melanina para reduzir a pigmentação geral da pele. Azepur99® induz o efeito de clareamento da pele. Azepur99® reduz a aparência de manchas pigmentadas. Azepur99® é autoconservante Azepur99® tem um excelente perfil de segurança
APLICAÇÕES	O Azepur99® pode ser usado em emulsões de gel e emulsões e microemulsões de baixa e alta viscosidade a/o e o/a
DOSE RECOMENDADA	5-15% em peso

Azeco Cosmeceuticals — sua parceira preferida para a formulação de produtos de cuidados com a pele à base de ácido azelaico

A Azeco Cosmeceuticals é o maior fornecedor mundial de ácido azelaico de grau cosmético. Conquistamos essa distinção ao fornecer níveis de pureza excepcionais (produto único no mercado mundial com essa característica), fornecimento consistentemente confiável e excelente suporte técnico e regulatório.

Nosso ácido azelaico de alta pureza é fabricado e manuseado de acordo com a certificação ISO 9001:2015. Ele é obtido através de um processo contínuo 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso não apenas garante pronta disponibilidade, mas também elimina as inconsistências entre lotes frequentemente encontradas no ácido azelaico de outros fornecedores. O ácido azelaico da Azeco Cosmeceuticals tem origem europeia, 100% biológico, sem óleo de palma e é compatível com a REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals).

Como o Azepur99® age na pele

Quando usado em formulações cosméticas, o ácido azelaico penetra na pele de forma eficaz e estimula a atividade celular. O ácido azelaico é capaz de auxiliar na normalização da microflora da pele. Organismos que se tornaram oportunistas são normalizados ao seu nível normal, incluindo *Propionibacterium acnes*, e isso auxilia na eliminação e prevenção da acne em muitos casos. O modo de ação não foi totalmente elucidado, mas em vários estudos pré-clínicos e clínicos foi demonstrado que o ácido azelaico apresenta três propriedades benéficas principais na pele impura:

1. Ele normaliza a queratinização folicular perturbada que leva à formação de cravos. A redução na contagem de cravos foi demonstrada posteriormente em vários estudos clínicos.
2. O ácido azelaico tem um efeito antibacteriano significativo sobre *Propionibacterium acnes* e *Staphylococcus epidermidis* foliculares (*in vitro*). Este efeito é principalmente bactericida, mas pode ser modificado *in vivo* para bacteriostático.
3. Além disso, o ácido azelaico também revela atividades anti-inflamatórias diretas, reduzindo a produção e liberação de espécies reativas de oxigênio.

O ácido azelaico também é um inibidor eficaz da tirosinase, a enzima envolvida na conversão da tirosina em melanina. Portanto, o Azepur99®, de acordo com sua característica de alta pureza e origem natural, pode ser usado com segurança em produtos cosméticos clareadores/iluminadores tanto para pele asiática quanto caucasiana. A inibição competitiva da tirosinase pelo Azepur99® (veja o esquema abaixo) resulta em uma diminuição da produção de melanina.



O Azepur99® é um agente clareador natural e um iluminador eficaz para a pele. Ele tem a vantagem de tornar a pele mais pálida, naturalmente. Muitas publicações científicas precisas em relação ao mecanismo de ação do ácido azelaico na pele estão disponíveis na literatura. Ao final deste documento, algumas delas são listadas no parágrafo dedic ado às “Referências”.

Ideal para diversos produtos

O Azepur99® é ideal para uso em uma variedade de produtos de cuidados pessoais (também aprovados pelo COSMOS/ECOCERT) para a pele, proporcionando importantes benefícios que os consumidores desejam. Aqui está uma breve visão geral:

Benefícios/reivindicações	Aplicações
Eficaz no tratamento da pele oleosa e impura. Proporciona um efeito de clareamento progressivo para um aspecto mais uniforme Reduz a pigmentação da pele e as irregularidades da cor, como manchas da idade, revelando uma pele mais lisa, brilhante, flexível e com menos irregularidades	Cremes hidratantes, séruns e loções, produtos de limpeza e tônicos para a pele. Produtos para cuidados com a pele masculina.
Atividade clareadora comprovada na pele asiática.	Cremes hidratantes, séruns e loções, produtos de limpeza e tônicos para a pele. Produtos para cuidados com a pele masculina.
Melhora a aparência da pele danificada pelo sol e combate o envelhecimento da pele	Cremes, séruns, loções, produtos de limpeza e tônicos concebidos para reduzir os sinais de envelhecimento. Produtos para descamação da pele. Produtos para cuidados com a pele masculina.
Melhora o desempenho de certos medicamentos tópicos de venda livre, medicamentos ou quase medicamentos e produtos sujeitos a prescrição	Cremes hidratantes para a pele, séruns e loções, Cremes hidratantes para a pele, séruns e loções. Produtos para cuidados com a pele masculina. Combinações para tratamento de acne, combinações para clareamento da pele, combinações de protetor solar. Produtos para cuidados com a pele masculina.

Exemplos de formulações de cuidados com a pele à base de Azepur99®

Preparações antiacne, fórmulas asiáticas e europeias:

SC001 **Antiacne - Fórmula Asiática.** Tripla ação: anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.				
	Nomenclatura INCI	Nome comercial	% em peso	Função
A	Aqua	Água	56,45	Solvente
	Betaine	Betafin BP20 [1]	5,00	Emulsificante
	Glycerine	Pricerine 9083 [2]	2,00	Umectante
	Aqua, Sodium Hydroxyde	Hidróxido de Sódio, solução aquosa 18%	1,50	Neutralizador
B	Azelaic acid	Azepur99®	10	Ingrediente ativo
	Cetearyl Isononanoate	Cetiol SN [4]	5,00	Emoliente
	Cetearyl Alcohol	Lanette O [4]	4,00	Agente corporal
	PEG-20 Glyceryl Stearate	Cutina E24 [4]	4,00	Emulsificante
	Tripelargonin	Matrìlox CP601M [5]	3,00	Emoliente
	Steareth-2	Brij 72 [2]	3,00	Emulsificante
	Steareth-21	Brij 721 [2]	3,00	Emulsificante
	Diethylhexyl Adipate [2]	Crodamol DOA	2,00	Emoliente
C	Phenoxyethanol Sorbitan Caprylate	Nipaguard SCP [3]	1,00	Conservante
D	Parfum		0,15	Fragrância

Fornecedores:

[1] Dupont/Danisco Finnfeeds Oy
[2] Croda Oleochemicals
[3] Clariant/Nipa Preservatives
[4] BASF/Cognis
[5] Matrìca

Especificações do creme:

Aspecto	creme suave
Cor	branca
Odor	característico
pH	4,9 – 5,6
Normalmente:	5,2
Viscosidade Brookfield (S4, 20 rpm, 25°C)	3.500 – 4.400 cPs
Normalmente:	3.850 cPs

Instruções de fabricação:

1. A fase aquosa (Fase A) é preparada combinando os ingredientes. A fase aquosa deve ser alcalina para neutralizar (parcialmente) o ácido azelaico presente na fase oleosa. Ignorar isso inibirá a formação de emulsão. A fase aquosa é aquecida a 70-75 °C.

2. A fase oleosa (Fase B) é feita combinando os ingredientes e aquecendo a 70-75 °C. A fase oleosa deve ser completamente transparente, com uma cor levemente amarelada.

3. A fase oleosa é adicionada à fase aquosa a 70-75 °C enquanto se agita com um misturador planetário. A mistura, ainda instável, é agitada durante 5 minutos (em escala laboratorial). Em seguida, a mistura é homogeneizada usando um misturador rotor-estator de alta velocidade na capacidade máxima. A pré-emulsão é resfriada a 40-45 °C e homogeneizada novamente adicionando o conservante (Fase C). A emulsão obtida é branca e ainda é de baixa viscosidade. Após o resfriamento adicional, a viscosidade continuará a aumentar. A 25 °C adiciona-se a fragrância (Fase D), com agitação constante durante 15 minutos.

4. O pH é ajustado de acordo com as especificações com uma solução aquosa de hidróxido de sódio a 18%. A loção é mantida em quarentena por 5 dias e encaminhada para análise microbiológica. Após 5 dias, os dados analíticos da loção podem ser ajustados às especificações, se necessário. Após o período de quarentena a loção pode ser entregue para confecção ou transferida para armazenamento a granel, desde que satisfaça as especificações.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Azelaic Acid, Betaine, Cetearyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, PEG-20 Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Steareth-2, Steareth-21, Diethylhexyl Adipate, Glycerin, Parfum, Phenoxyethanol, Sorbitan Caprylate.

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

SC002 **Fórmula europeia antiacne** Tripla ação: anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.				
	Nomenclatura INCI	Nome comercial	% em peso	Função
A	Aqua	Água	45,45	Solvente
	Betaine	Betafin BP20 [1]	5,00	Emulsificante
	Glycerine	Pricerine 9083 [2]	5,00	Umectante
	Aqua, Sodium Hydroxyde	Hidróxido de Sódio, solução aquosa 18%	1,50	Neutralizador
B	Azelaic acid	Azepur99®	10	Ingrediente ativo
	Caprylic/Capric Triglyceride	Myritol 318 [4]	12,00	Emoliente
	Cetearyl Alcohol	Lanette O [4]	2,00	Agente corporal
	PEG-20 Glyceryl Stearate	Cutina E24 [4]	3,00	Emulsificante
	Tripelargonin	Matrilox CP601M [5]	3,00	Emoliente
	Glyceryl Stearate, Ceteareth-12, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate	Emulgade SE [2]	10,00	Emulsificante
	Diethylhexyl Adipate [2]	Crodamol DOA	2,00	Emoliente
C	Phenoxyethanol Sorbitan Caprylate	Nipaguard SCP [3]	1,00	Conservante
D	Parfum		0,15	Fragrância

Fornecedores:

[1] Dupont/Danisco Finnfeeds Oy
[2] Croda Oleochemicals
[3] Clariant/Nipa Preservatives
[4] BASF/Cognis
[5] Matrìca

Especificações:

Aspecto	creme suave
Cor	branca
Odor	característico
pH	4,9 – 5,6
Típico:	5,2
Viscosidade Brookfield (S4, 20 rpm, 25°C)	7.200 – 11.400
Normalmente:	8.450 cPs

Instruções de fabricação:

1. A fase aquosa (Fase A) é preparada combinando os ingredientes. A fase aquosa deve ser alcalina para neutralizar (parcialmente) o ácido azelaico presente na fase oleosa. Ignorar isso inibirá a formação de emulsão. A fase aquosa é aquecida a 70-75 °C.

2. A fase oleosa (Fase B) é feita combinando os ingredientes e aquecendo a 70-75 °C. A fase oleosa deve ser completamente transparente, com uma cor levemente amarelada.

3. A fase oleosa é adicionada à fase aquosa a 70-75 °C enquanto se agita com um misturador planetário. A mistura, ainda instável, é agitada durante 5 minutos (em escala laboratorial). Em seguida, a mistura é homogeneizada usando um misturador rotor-estator de alta velocidade
na capacidade máxima. A pré-emulsão é resfriada a 40-45 °C e homogeneizada novamente adicionando o conservante (Fase C). A emulsão obtida é branca e ainda é de baixa viscosidade. Após o resfriamento adicional, a viscosidade continuará a aumentar. A 25 °C adiciona-se a fragrância (Fase D), com agitação constante durante 15 minutos.

4. O pH é ajustado de acordo com as especificações com uma solução aquosa de hidróxido de sódio a 18%. A loção é mantida em quarentena por 5 dias e encaminhada para análise microbiológica. Após 5 dias, os dados analíticos da loção podem ser ajustados às especificações, se necessário. Após o período de quarentena, a loção pode ser entregue para confecção ou transferida para armazenamento a granel, desde que satisfaça as especificações.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Azelaic Acid, Glyceryl Stearate, Betaine, Glycerin, Isopropyl Myristate, PEG-20 Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Diethylhexyl Adipate, Ceteareth-20, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Parfum, Phenoxyethanol, Sorbitan Caprylate.

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

SC003 **Sérum sem óleo para peles com doenças (pele com tendência acneica)** - Tripla ação: anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.

	Nomenclatura INCI	Nome comercial/outro nome	% em peso	Função
A	Aqua	Água	10,00	Solvente
	Propanediol	Propileno glicol	10,00	Umectante
	Heptyl glucoside	Sepiclear G7 [1]	10,00	Emulsificante
	Azelaic acid	**Azepur99®**	10,00	Ingrediente ativo
B	Xylityl sesquicaprylate	Hebeatol plus [2]	0,5	Agente antimicrobiano e hidratante
	Tocopheryl Acetate	Acetato de vitamina E	0,05	Antioxidante, agente antienvelhecimento
C	Phenoxyethanol	-	0,30	Conservante
	Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate	Aristoflex silk [3]	1,00	Modificador de reologia
	Aqua	Água	57,9	Solvente
	Dimethyl Isosorbide (e) Hydroxypinacolone Retinoate	Retinóide granativo [4]	0,10	Agente antienvelhecimento
D	Parfum	-	0,15	Fragrância
	Phenoxyethanol Sorbitan Caprylate	Nipaguard SCP [3]	1,00	Conservante
	Parfum		0,15	Fragrância

Fornecedores:

[1] Evonik

[2] Croda

[3] Clariant

[4] Jan Dekker / IMCD

Especificações:

Aparência	creme suave
Cor	branca
Odor	característico
pH	Não aplicável
Normalmente:	Não aplicável
Viscosidade Brookfield (R4, 50 rpm, 25 °C)	2150 ± 25% mPas
Normalmente:	2150 mPas

Instruções de fabricação:

1. Misture todos os ingredientes da fase A até ficar homogêneo (tempo indicativo 5 minutos), meça o pH da mistura obtida (6,00-7,00)
2. Misture todos os ingredientes da fase B até ficar homogêneo (tempo indicativo 5 minutos), aqueça a 60 °C até obter um fundido transparente e homogêneo.
3. Adicione Azepur99® e acetato de tocoferol à Fase B, mantenha a temperatura e misture até formar um composto homogêneo cremoso branco/bege sem pontos (cerca de 1 hora).
4. Adicione muito lentamente a Fase A à mistura da Fase B+C, tomando o cuidado de incorporar completamente uma fase por vez. Apenas no meio do procedimento é possível aumentar a velocidade de entrada. Misture apenas moderadamente com as pás. Agite durante 5 minutos apenas no final da entrada da Fase A. É obtida uma emulsão fluida. Pare a turbina assim que a mistura engrossar.
5. Adicione a fragrância

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Azelaic Acid, Octyldodecanol, Ethylhexyl Palmitate, Isopropyl Isostearate, Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Tocopheryl Acetate, Butyrospermum Parkii Butter, Magnesium Sulfate, Caprylyl Glycol, Glyceryl Ca- prylate, Ethylhexylglycerin, Parfum

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

Fornecedores:

[1] Seppic
[2] Chemyunion
[3] Clariant
[4] Grant

Especificações:

Aspecto	Gel fluido
Cor	De esbranquiçado a levemente amarelado
Odor	Característico
pH	3,40-3,60
Normalmente:	3,50
Viscosidade Brookfield (R6, 100 rpm, 25 °C)	5000± 25% mPas
Normalmente:	5000 mPas

Instruções de fabricação:

1. Em um aparelho de fusão, aqueça a 60 °C e misture até ficar homogêneo: é obtido um gel fluido transparente amarelado. Resfrie a T <30 °C.
2. Assim que a fase A esfriar, adicione e misture hebeatol e acetato de tocoferol. Tempo indicativo de 10 min, até a transparência.
3. No turboemulsificador, polvilhe o Aristoflex Silk enquanto mexe. Continue até formar um gel homogêneo.
4. Lave, apenas misturando suavemente e possivelmente com uma turbina de força muito baixa, para evitar a incorporação de ar. É obtido um gel amarelo-esbranquiçado.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Azelaic Acid, Propanediol, Heptyl Glucoside, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Xylityl Sesquicaprylate, Hydroxypinacolone Retinoate, Tocopheryl Acetate, Dimethyl Isosorbide Phenoxyethanol, Parfum

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

SC004 **Sérum iluminador sem óleo**. Múltipla ação: iluminação, anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.

	Nomenclatura INCI	Nome comercial/outro nome	% em peso	Função
A	Aqua	Água	10,00	Solvente
	Propanediol	Propileno glicol	10,00	Umectante
	Heptyl glucoside	Sepiclear G7 [1]	10,00	Emulsificante
	Azelaic acid	**Azepur99®**	10,00	Ingrediente ativo
B	Xylityl sesquicaprylate	Hebeatol plus [2]	0,5	Agente antimicrobiano e hidratante
	Tocopheryl Acetate	Acetato de vitamina E	0,05	Agente antienvelhecimento
C	Phenoxyethanol	-	0,30	Conservante
	Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate	Aristoflex silk [3]	1,00	Modificador de reologia
	Aqua	Água	57,9	Solvente
	Water & Hydrolyzed Myrtus communis Leaf Extract	Longevicell [4]	0,10	Antioxidante, agente antienvelhecimento
D	Parfum	-	0,15	Fragrância

Fornecedores:

[1] Seppic

[2] Chemyunion

[3] Clariant

[4] Silab

Especificações:

Aspecto	Gel fluido
Cor	De esbranquiçado a levemente amarelado
Odor	Característico
pH	3,40-3,60
Normalmente:	3,50
Viscosidade Brookfield (R6, 100 rpm, 25 °C)	5000± 25% mPas
Normalmente:	5000 mPas

Instruções de fabricação:

5. Em um aparelho de fusão, aqueça a 60 °C e misture até ficar homogêneo: é obtido um gel fluido transparente amarelado. Resfrie a T <30 °C.
6. Assim que a fase A esfriar, adicione e misture hebeatol e acetato de tocoferol. Tempo indicativo de 10 min, até a transparência.
7. No turboemulsificador, polvilhe o Aristoflex Silk enquanto mexe. Continue até formar um gel homogêneo.
8. Lave, apenas misturando suavemente e possivelmente com uma turbina de força muito baixa, para evitar a incorporação de ar. É obtido um gel amarelo-esbranquiçado.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Azelaic Acid, Propanediol, Heptyl Glucoside, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Xylityl Sesquicaprylate, Hydrolyzed Myrtus Communis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate Phenoxyethanol, Parfum

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

SC005 **Creme iluminador (a/o).** Múltipla ação: iluminação, anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.

	Nomenclatura INCI	Nome comercial/outro nome	% em peso	Função
A	Aqua	Água	66,35	Solvente
	Propanediol	Propileno glicol	3,00	Umectante
	Magnesium sulfate	Sulfato de magnésio hepta-hidratado	0,80	Controle de viscosidade
B	Octyldodecanol	-	5,00	Emoliente, agente de mascaramento.
	Ethylhexyl palmitate	Tegosoft OP [1]	5,00	Emoliente
	Isopropyl isostearate	Crodamol IPIS [2]	4,00	Emoliente
	C12-15 Alkyl benzoate	-	3,00	Emoliente
	PEG-30 Dipolyhydroxystearate	Cithrol DPHS [2]	1,50	Emulsificante
	Butyrospermum parkii butter	-	0,20	Emoliente
	Caprylyl glycol, Glyceryl caprylate, Ethylhexylglycerin	Neofect 403 [3]	1,00	Agente antimicrobiano
C	Tocopheryl Acetate	Acetato de vitamina E	0,05	Agente antienvelhecimento
	Azelaic Acid	**Azepur99®**	10,00	Agente iluminador, ingrediente ativo
D	Parfum	-	0,10	Fragrância
	Water & Hydrolyzed Myrtus communis Leaf Extract	Longevicell [4]	0,10	Antioxidante, agente antienvelhecimento

Fornecedores:

[1] Evonik

[2] Croda

[3] Jan Dekker / IMCD

Especificações:

Aparência	creme suave
Cor	branca
Odor	característico
pH	Não aplicável
Normalmente:	Não aplicável
Viscosidade Brookfield (R4, 50 rpm, 25 °C)	2150 ± 25% mPas
Normalmente:	2150 mPas

Instruções de fabricação:

1. Misture todos os ingredientes da fase A até ficar homogêneo (tempo indicativo 5 minutos), meça o pH da mistura obtida (6,00-7,00).
2. Misture todos os ingredientes da fase B até ficar homogêneo (tempo indicativo 5 minutos), aqueça a 60 °C até obter um fundido transparente e homogêneo.
3. Adicione Azepur99® e acetato de tocoferol à Fase B, mantenha a temperatura e misture até formar um composto homogêneo cremoso branco/bege sem pontos (cerca de 1 hora).
4. Adicione muito lentamente a Fase A à mistura da Fase B+C, tomando o cuidado de incorporar completamente uma fase por vez. Apenas no meio do procedimento é possível aumentar a velocidade de entrada. Misture apenas moderadamente com as pás. Agite durante 5 minutos apenas no final da entrada da Fase A. É obtida uma emulsão fluida. Pare a turbina assim que a mistura engrossar.
5. Adicione a fragrância.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Azelaic Acid, Octyldodecanol, Ethylhexyl Palmitate, Isopropyl Isostearate, Propanediol, C12-15 Alkyl Benzoate, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Tocopheryl Acetate, Butyrospermum Parkii Butter, Magnesium Sulfate, Caprylyl Glycol, Glyceryl Ca- prylate, Ethylhexylglycerin, Parfum

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

SC006 **Organogel iluminador/clareador para pele irregular** Múltipla ação: iluminação, anti-imperfeições, antimarcas residuais, antienvelhecimento.				
	Nomenclatura INCI	Nome comercial/outro nome	% em peso	Função
A	Phosphatidylcholine, Tocopherol, Ascorbyl palmitate	Phospholipon 90G	8.000	Formador de lipossomas, condicionador e hidratante da pele
	Isopropyl myristate	Miristato de isopropila [1]	11,500	Emoliente
B	Propanediol	Propileno glicol	20,000	Umectante
	Azelaic Acid	**Azepur99®**	5,000	Agente iluminador, ingrediente ativo
C	Aqua	Água	54,400	Solvente
	Imidazolydinil Urea	Sepicide CI [2]	0,300	Conservante
	Phenoxyethanol	-	0,800	Conservante

Fornecedores:

[1] Phospholipid GmbH

[2] BASF

[3] Seppic

Especificações:

Aparência	creme suave
Cor	branca
Odor	característico
pH	Não aplicável
Normalmente:	Não aplicável
Viscosidade Brookfield (R5, 30 rpm, 25 °C)	7770 ± 25% mPas
Típico:	7770 mPas

Instruções de fabricação:

1. Misture lentamente todos os ingredientes da Fase A até dissolver completamente. Pode ser aquecido a no máximo 50 °C para acelerar a obtenção da homogeneidade.
2. Misture todos os ingredientes da fase B até ficar homogêneo.
3. Adicione a Fase B à Fase A lavando muito lentamente e aguardando até que a fase final fique homogênea.
4. Misture todos os ingredientes da Fase C até ficar homogêneo. Adicione a Fase obtida à A+B, misturando até ficar homogêneo.

Lista INCI:

Ingredientes: Aqua, Propanediol, Isopropyl Myristate, Phosphatidylcholine, Azelaic Acid, Phenoxyethanol, Imidazolidinyl Urea, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate

Validade: 3 anos após a produção, 12 meses após a abertura. Armazenar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta. Embalagem preferida: tubo, 30 ml.

Teste de eficácia na pele com algumas doenças

A composição europeia antiacne (SC002) foi testada em 8 pacientes que sofriam com cravos fechados infectados. A composição foi aplicada nos afetados duas vezes por dia durante 30 dias. Foi utilizada a seguinte escala visual:

Classificação de observação visual:

0-1 Sem melhora
2-3 Melhora claramente perceptível
4-6 Boa melhora
7-9 Excelente melhora
10 Recuperação completa

Voluntário	Gênero	Idade	Dia	Dia 0	Dia 5	Dia 10	Dia 15	Dia 20	Dia 25	Resultado nº 30
Nº 1	Feminino	15	0	0	2	2	5	6	8	Positivo
Nº 2	Feminino	23	0	0	0	2	5	6	8	Positivo
Nº 3	Feminino	21	0	0	0	1	2	2	1	Negativo
Nº 4	Feminino	18	0	1	3	6	6	8	10	Positivo
Nº 5	Masculino	24	0	0	1	2	2	4	3	Negativo
Nº 6	Masculino	15	0	1	3	4	4	6	9	Positivo
Nº 7	Masculino	16	0	2	5	5	6	8	9	Positivo
Nº 8	Masculino	19	0	0	1	3	4	7	9	Positivo

Os resultados são no mínimo promissores. Em conclusão, o Azepur99® pode ser considerado um ingrediente cosmético funcional que pode ser usado com sucesso em formulações para o tratamento de doenças da pele.

Referências

Evidências científicas disponíveis para a aplicação do ácido azelaico na terapia de doenças da pele e em formulações para iluminação/clareamento da pele.

1. Aodan C. Breathnach, et Alters, Azelaic Acid Therapy in Disorders of skin Pigmentation, Clinics in Dermatology, Volume 7, Issue 2, April–June 1989, Pages 106-119;
2. Aprian,E.F. et Alters, Formulation, characterization and in vitro testing of Azelaic acid ethosome-based cream against Propi-onibacterium acnes for the treatment of acne, J.Adv. Pharm. Technol. Res. (2019), 10, 75-80;
3. Nazzaro-Porro M, Passi S, Picardo M, Breathnach A, Clayton R, Zina G. Beneficial effect of 15% azelaic acid cream on acne vulgaris. Br J DermatolJul;109(1):45-8 (1983);
4. Jaideep Bajaj and Dinesh Sharma, Formulation and evaluation of topical azelaic acid gel, Journal of Chemical and Pharma- ceutical Research, 2015, 7(10):616-620;
5. M.A. Sieber and J.K.E. Hegel, Azelaic Acid: Properties and Mode of Action, Skin Pharmacol Physiol 2014;27(suppl 1):9–17, DOI: 10.1159/000354888;
6. M. C. Young, P.M. Zito, Azelaic Acid in Acne Vulgaris, Journal of the Dermatology Nurses' Association, 10 – 3, 2018;
7. A. K. Mohiuddin, Skin Lightening & Management of Hyperpigmentation, Review Article, Pharmaceutical Sciences & Analyti- cal Research Journal, Volume 2; Issue 2, June 18, 2019;
8. Nazzaro-Porro, M., et alters (1979a) Identification of tyrosinase inhibitors in cultures ai Pityrosporum and their melanocyto- toxic effect. In: Pigment cell 4: Biologic basis of pigmemation (Ed. By S.N.Klaus), p. 234. S. Karger, Basel;
9. C. Couteau and L. Coiffard, Overview of Skin Whitening Agents: Drugs and Cosmetic Products, Cosmetics 2016, 3, 27;
10. E. Burchacka et Alters, New effective azelaic acid liposomal gel formulation of enhanced pharmaceutical bioavailability, Biomedicine & Pharmacotherapy 83 (2016) 771–775;
11. M.D. Detmar et Alters, Effects of azelaic Acid on proliferation and ultrastructure of mouse keratinocytes in vitro, The J. of Invest. Dermatology, Vol. 93, N°1, July 1989;
12. J.P. Ebanks et Alters, Mechanisms Regulating Skin Pigmentation: The Rise and Fall of Complexion Coloration, Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 4066-4087; doi:10.3390/ijms10094066;
13. A. Mastrofrancesco et alters, Azelaic acid modulates the inflammatory response in normal human keratinocytes through PPARgamma activation, Exp Dermatol. 2010 Sep;19(9):813-20.
14. Shin, J.W.; Park, K.C. Current clinical use of depigmenting agents. Dermatol Sin. 2014, 32, 205–210.
15. Nazzaro-Porro M, Passi S (1978) Identification of tyrosinase inhibitors in cultures of Pityrosporum. J Invest Dermatol 71:205– 208.
16. Lowe, N.J.; Rizk, D.; Grimes, P.; Billips, M.; Pincus, S. Azelaic acid 20% cream in the treatment of facial hyperpigmentation in darker-skinned patients. Clin. Ther. 1998, 20, 945–959;
17. Webster, G. Combination azelaic acid therapy for acne vulgaris. J. Am. Acad. Dermatol. 2000, 43, S47–S50;
18. Draelos, Z. Multiple mechanisms of action of azelaic acid: New findings. J. Am. Acad. Dermatol. 2009, 60, AB86;
19. Rossi A.B., Nocera T., Lapalud P., Study sponsored by Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Poster presented at AAD Meeting –Washington DC., March 4-8, 2016;
20. J. Zeichner, New Insights Into Azelaic Acid, Practical Dermatology, March 2013;
21. Quan H, Nguyen, M.D., And Tran P. Bui, B.S., Azelaic Acid: Pharmacokinetic And Pharmacodynamic Properties And Its The- rapeutic Role In Hyperpigmentary Disorders And Acne, Internationa! journ.Ti of Dermatology, Vol, ,M, No, 2, February 1995;
22. P. Lanzafame, Bactericidal activity of some acids towards microorganisms involved in etiopathogenesis of acne, Trends in Medicine, October 2011 Volume 11 Number 4;

Para maiores informações:
Site: www.azeco-cosmeceuticals.com
Ligar: +31 475 20 60 70
E-mail: service@azeco-cosmeceuticals.com

As informações apresentadas aqui são fornecidas gratuitamente e são baseadas em dados técnicos que a Azeco Cosmeceuticals BV acredita serem confiáveis. Elas se destinam ao uso por pessoas com habilidade técnica, por sua conta e risco. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, a Azeco Cosmeceuticals não oferece garantias, expressas ou implícitas, e não assume nenhuma responsabilidade em relação ao uso dessas informações. Nada aqui deve ser considerado uma licença para operar ou uma recomendação para infringir quaisquer patentes ou pedidos de patentes.

Para atendimento técnico e/ou comercial entre em contato com

Azeco Cosmeceuticals BV | Países Baixos
Sra. Annet Verhaegen
service@azeco-cosmeceuticals.com

www.azeco-cosmeceuticals.com