PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

CLORETO DE POTÁSSIO

CAS: 7447-40-7
DCB: 02415
FÓRMULA MOLECULAR: KCl
PESO MOLECULAR: 74.55

INFORMAÇÕES GERAIS: O potássio é um eletrólito essencial para o corpo. Mais de 90% do potássio na dieta é absorvido a partir do trato gastrointestinal.

O potássio é particularmente abundante em vegetais, batatas e frutas. Os sais de potássio são usados para a prevenção e tratamento de depleção de potássio e / ou hipocalemia e tem sido utilizados na prevenção de hipocalemia induzida por diuréticos.

As doses podem ser expressas em termos de mmoles ou mEq de potássio, de massa (mg) de potássio, ou de massa sal de potássio (13.4 mmol = 524 mg = 13.4 mEq).

O tratamento deve ser monitorado pelas estimativas de potássio no plasma devido ao risco de induzir a hipercalemia, especialmente quando há insuficiência renal. O cloreto de potássio é provavelmente o mais comum sal de potássio utilizado; isso porque a alcalose hipoclorémica, que é frequentemente associada com hipocalemia, e podem ser corrigidos pelos íons cloreto da molécula.

Os sais de potássio via oral são mais irritantes do que os sais de sódio; eles devem ser tomados com ou após as refeições com muita água. As preparações líquidas são preferíveis.

O tratamento oral é utilizado para a profilaxia e também é adequado para tratar maioria dos casos de hipocalemia.

INDICAÇÃO: Diurético, repositor de potássio, hipocalemia.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL:
Repositor de potássio 500 --- 2500 mg ao dia.

Doses típicas para a prevenção de hipocalemia pode ser de até 50 mmol por dia e semelhantes doses podem ser adequadas em deficiência leve de potássio. No entanto, podem ser necessárias doses mais elevadas na deficiência grave.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

INTERAÇÕES: Suplementos de potássio devem ser usados com cautela, em pacientes recebendo drogas que aumentam concentrações séricas de potássio. Estes incluem poupadores de potássio, diuréticos, inibidores da ECA, ciclosporinas, e medicamentos que contêm potássio, tais como o potássio e os sais de penicilina.

Da mesma forma, a utilização concomitante de potássio como substituto do sal para aromatizar alimentos devem ser evitadas. Com Antimuscarinicos ocorre o atraso do esvaziamento gástrico e conseqüentemente podem aumentar o risco de efeitos adversos gastrintestinais em pacientes que receberam doses orais de potássio.

EFEITOS ADVERSOS: Os sintomas incluem parestesia das extremidades, fraqueza muscular, a paralisia, arritmia cardíaca, bloqueio cardíaco, parada cardíaca, e confusão.

A toxicidade cardíaca é particularmente preocupante após dose intravenosa. Náuseas, vômitos, diarréia e cólicas abdominais podem ocorrer com os sais orais de potássio. Houve inúmeros relatos de ulceração gastrointestinal, às vezes com hemorragia e perfuração.

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. **Martindale, The Complete Drug Reference**; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

Texto atualizado em: 26/08/2014

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.