PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

CLOTRIMAZOL

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: Clotrimazol; Clotrimazolum; FB-5097; Klotrimatsoli; Klotrimazol; Klotrimazolas; Klotrymazol. 1- (α-2-Chlorotrityl) imidazole.
CAS: 23593-75-1
DCB: 02529
FORMULA MOLECULAR: C22H17ClN2
PESO MOLECULAR: 344.8

INFORMAÇÕES GERAIS: É um antimicótico de amplo espectro, ativo contra dermatófitos saprófitas e leveduras, atuando ainda sobre tricomonas e bactérias. Clotrimazol é um imidazol antifúngico com atividade antimicrobiana semelhante ao cetoconazol. Altera o metabolismo proteico e a síntese de RNA do microrganismo e determina a perda de fósforo e potássio intracelulares.

INDICAÇÃO: Seu uso é indicado para candidíase e para as infecções de pele pitiríase versicolor e dermatofitose. O clotrimazol também pode ser usado ocasionalmente para o alívio de sintomas da infecção protozoária tricomoníase quando outros medicamentos forem contra-indicados.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: É usado topicamente a 1% em cremes, talcos, sprays, loções e soluções para o tratamento de infecções de pele ou para a prevenção de reinfecções; é aplicado de 2 a 3 vezes ao dia por um período de 2 a 4 semanas. A solução a 1% também pode ser aplicada para otite externa fúngica. Doses semelhantes são administradas como creme vaginal de 1, 2, 10% ou 100 mg/óvulo vaginal.

IMPORTANTE: Clotrimazol para uso oral NÃO é recomendado, foi amplamente substituído por outros medicamentos azólicos.

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

Clotrimazol Creme
Clotrimazol.....1 %
Creme ou Loção Cremosa qsp.....30 g

Modo de usar: aplicar 1 a 2 vezes ao dia.

Clotrimazol gotas auriculares
Clotrimazol.....1 %
Polietilenoglicol 400 qsp.....10 ml

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407

Modo de usar: instilar 2 a 3 gotas no conduto auditivo 2 a 3 vezes ao dia, continuando por 14 dias após o desaparecimento da infecção.

Clotrimazol Colírio
Clotrimazol.....1 %
Veículo qsp.....5 ml

Modo de usar: 1 gota a cada hora nos primeiros dias, reduzindo gradativamente até 1 gota a cada 6 vezes ao dia, dependendo da resposta clínica.
Indicação: infecções micóticas dos olhos e anexos oculares.

Clotrimazol Pomada
Clotrimazol.....1 %
Pomada Oftálmica qsp.....3,5 g

Modo de usar: pequena quantidade ao deitar.
Indicação: infecções micóticas dos olhos e anexos oculares.

Clotrimazol Creme Vaginal
Clotrimazol.....1 %
Creme Vaginal qsp.....50 g
Fornecer aplicador vaginal (5 g)

Modo de usar: 1 aplicação ao deitar, durante 7 dias. Também pode ser formulado em óvulos com 100 mg.

EFEITOS ADVERSOS: Reações alérgicas como vermelhidão e coceira na pele podem ocorrer; sensação de queimação em pacientes tratados topicamente também. A pele pode apresentar eritema, pápulas, vesículas, descamação e assim por diante. Há também relatos sobre dermatite de contato. Pode causar sensação de queimação vaginal.

PRECAUÇÕES: Não ingerir.

As preparações intravaginais de clotrimazol podem danificar os preservativos de látex; medidas contraceptivas adicionais são, portanto, necessárias durante a aplicação local.

Gravidez e aleitamento: O uso do clotrimazol para o período de aleitamento é considerado criterioso pela ANVISA, e com risco de categoria C para gestantes. Não é recomendada a administração sem orientação médica.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

INTERAÇÕES: Quando o clotrimazol é usado em combinação com a betametasona pode tornar a pele vulnerável a infecções e aumentar as oportunidades de crescimento das mesmas, o possível mecanismo é através da inibição da inflamação local. Tem efeito antagonista na farmacodinâmica quando usado em combinação com anfotericina B.

FARMACOCINÉTICA: Quando aplicado topicamente, o clotrimazol penetra na epiderme mas há pouca ou nenhuma absorção sistêmica. Foi relatada absorção de 3 a 10% de uma dose após uso vaginal.

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° 60, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. ***Ministério da Saúde***; disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/rdc0060_17_12_2010.pdf

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 5ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2015.

Texto atualizado em 22/01/2024, por Larissa Lopes.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.