PROTEÇÃO 10X MAIOR CONTRA A INFLAMAÇÃO

10X MAIS EFICAZ, DEVIDO SUA AÇÃO PROLONGADA NO ORGANISMO

10X MAIS POTENTE QUE AS CURCUMINAS TRADICIONAIS

Cureit® é uma matriz de cúrcuma 100% natural, altamente biodisponível e eficaz. Seu processo patenteado de obtenção - "*Sandwich Polar Non-Polar*" (PNS) - faz com que possua alta absorção e eficiência. Sua composição natural contribui para potencializar a absorção e retardar a rápida metabolização no organismo, garantindo uma eficácia terapêutica aumentada, segura e sem oferecer riscos toxicológicos. **Cureit®** possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes podendo ser usado no tratamento e prevenção de diversas desordens metabólicas.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- Doenças autoimunes;
- Endometriose;
- Osteoartrite;
- Recuperação muscular;
- Doenças inflamatórias.

MECANISMO DE AÇÃO

As ações do **Cureit®** estão relacionadas ao seu potencial antioxidante, ação anti-inflamatória e analgésica:

• **Ação antioxidante:** atenua os marcadores de estresse oxidativo e aumenta enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase.

• **Ação anti-inflamatória:** bloqueia a ativação de NF-kB aumentada por diferentes estímulos inflamatórios e do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), sendo capaz de suprimir a inflamação através de diversos mecanismos distintos.

Imagem real do ativo.

BIODISPONIBILIDADE

A tecnologia empregada na obtenção do **Cureit®** foi especialmente desenvolvida para garantir uma melhor biodisponibilidade da cúrcuma, sendo caracterizada como eficaz e potencial em função de suas propriedades físico-químicas naturais, contribuindo para a facilidade na absorção a nível intestinal do produto. Através da tecnologia PNS, a biodisponibilidade da curcumina é aumentada em 10 vezes, comprovada por estudo clínico comparativo com a curcumina.



Figura 1: Biodisponibilidade do **Cureit®** versus Biodisponibilidade da Curcumina Padrão (95%)

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Estudo Clínico: Artrite reumatóide

Um estudo randomizado, duplo-cego foi conduzido para determinar a eficácia e segurança da administração oral de duas doses diferentes de uma formulação contendo **Cureit®**, comparado com o placebo, em pacientes com artrite reumatoide ativa. O estudo foi realizado com 36 pacientes randomizados em 3 grupos: Dose Baixa - 250mg de **Cureit®**, Dose Alta - 500mg de **Cureit®** e placebo (500mg de amido alimentar) durante um período de 3 meses, administrando-se uma cápsula duas vezes ao dia, 30 minutos após as refeições. Os resultados do indicam que o uso de **Cureit®** pode proporcionar uma melhora significativa no alívio dos sintomas associados à artrite reumatoide ativa. Os voluntários relataram mudanças/diminuições significativas em seus sintomas clínicos em ambos os grupos: dose baixa e dose alta, diferentemente do grupo placebo.



Figura 2. Resultados após 3 meses.

Contraindicações

Contraindicado para grávidas devido ao efeito estimulante uterino, pessoas com hipersensibilidade à substância, em casos de cálculos biliares, ducto biliar obstruído e icterícia obstrutiva, e mulheres no período de lactação.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

APOIO ANTIOXIDANTE

Cureit® _____ 50mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

MANUTENÇÃO E REPARO DAS ARTICULAÇÕES

Cureit® _____ 75mg

HA Powder® _____ 75mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

APOIO À DOENÇAS AUTOIMUNES

Cureit® _____ 75mg

Vitamina D3 _____ 2.000UI

Vitamina B6 _____ 20mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

POSOLOGIA

25-500mg/dia, via oral.

Referências Bibliográficas

Susan J. Hewlings, Douglas S. Kalman. Curcumin: A Review of Its' Effects on Human Health. Foods 2017, 6, 92; doi:10.3390. Augustine Amalraj, Shintu Jude, Karthik Varma, Joby Jacob, Sreeraj Gopi, S.O. Oluwafemi, Sabu Thomas. Preparation of a novel bioavailable curcuminoid formulation (Cureit™) using Polar-Nonpolar- Sandwich (PNS) technology and its characterization and applications. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017 Jun 1;75:359-367. doi: 10.1016/j.msec.2017.02.068. Augustine Amalraj, Karthik Varma, Joby Jacob, Chandradhara Divya, Ajaikumar B. Kunnumakkara, Sidney J. Stohs, Sreeraj Gopi. A Novel Highly Bioavailable Curcumin Formulation Improves Symptoms and Diagnostic Indicators in Rheumatoid Arthritis Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Two-Dose, Three-Arm, and Parallel-Group Study. J Med Food 00 (0) 2017, 1–9. Ammon, H.P.; Safayhi, H.; Mack, t.; et al. Mechanism of Anti-inflamatory Actions of Curcumin and Boswellic Acids. J Ethnopharmacol, 1993; 38(2-3):113-9.