PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO

CAS: 2438-32-6
DCB: 02839
INDICAÇÕES: Anti-histamínico.

INFORMAÇÕES GERAIS: O maleato de dexclorfeniramina é um composto sintético que antagoniza eficazmente muitos dos efeitos característicos da histamina, possuindo assim, grande valor clínico na prevenção e no alívio de muitas manifestações alérgicas. Sua ação parece depender da competição com a histamina pelos receptores celulares.

PROPRIEDADES: A dexclorfeniramina é um derivado da propilamina, bloqueador competitivo dos receptores H1, antagonizando os efeitos provocados pela histamina. Por não bloquear a liberação do acetacóide, previne, mas não reverte as respostas por ele mediadas, desde que já iniciadas. A ação antimuscarínica produz um efeito secante na mucosa nasal. O fármaco atravessa a barreira hematoencefálica e provoca sedação devido à ocupação de receptores H1 cerebrais, relacionados com o controle dos estados de vigília. Bloqueia também a resposta à acetilcolina mediada pelos resceptores muscarínicos, causando secura da mucosa nasal.

POSOLOGIA: Adultos e crianças maiores de 12 anos: 5 mL, 3 a 4 vezes por dia. Não ultrapassar a dose máxima de 12 mg/dia. Para alguns pacientes, a dose diária máxima é de 6 mg (15 mL).

Crianças de 6 a 12 anos: 2,5 mL, três vezes por dia. Um máximo de 6 mg diários.
Crianças de 2 a 6 anos: 1,25 mL, três vezes por dia. Um máximo de 3 mg (7,5 ml) diários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

PEREIRA OA, **Dicionario de Substancias Farmaceuticas Comerciais**, 4ª edição, Editora Abiquif, Rio de Janeiro 2010.

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.