PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

HIALURONIDASE

SINÔNIMOS/ NOME QUÍMICO: Hialuronidasa; Hialuronidáz; Hialuronidaze; Hiyalüronidaz; Hyaluronidaasi; Hyaluronidas; Hyaluronidasa; Hyaluronidasum.
CAS: 9001-54-1
DCB: 04643

INFORMAÇÕES GERAIS: A hialuronidase é uma enzima geralmente obtida a partir do sêmen e dos testículos de bovinos ou ovinos. Na realidade, o termo hialuronidase é utilizado para caracterizar 3 enzimas diferentes, que atuam em pontos diferentes da molécula de ácido hialurônico, que são a hialuronoglicosidase, hialuronoglicuronosidase e a hialuronato liase.

Possui ação sobre o ácido hialurônico, um mucopolissacarídeo que faz parte do cimento intercelular, despolimerizando-o temporariamente e assim reduz a viscosidade do meio intercelular, torna o tecido mais permeável à dispersão de outras substâncias e promove a reabsorção do excesso de fluidos, mobilizando os edemas e infiltrações.

Reduz o desconforto devido à injeção subcutânea ou intramuscular de fluidos e aumenta a eficácia dos anestésicos locais aumentando a sua disseminação, porém reduz a duração do efeito anestésico e tende a aumentar a incidência de reação sistêmica.

A hialuronidase também tem sido usada para o tratamento de hemorragia vítrea e retinopatia diabética.
A hialuronidase humana recombinante é usada para a preparação de oócitos durante a fertilização *in vitro*.

Devido ao aumento crescente do número de preenchimentos cutâneos com ácido hialurônico, essa enzima ganhou novo destaque. A hialuronidase é comumente utilizada nos casos de excesso de preenchimento cutâneo (*overcorrection*) e/ou quando o depósito é feito no plano incorreto da pele, resultando em nódulos, assimetrias ou efeito Tyndall.

INDICAÇÃO: Fator de difusão enzimático. Facilita a difusão de várias substâncias através da pele e acelera os processos de reparação cutânea, devido a ativação das trocas nutritivas locais, provocadas pelo aumento de difusibilidade dos líquidos e reduz o edema.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL:
Uso tópico: É usada na faixa de 10.000 a 20.000 UTR%, associada a outros princípios ativos como escina e azuleno, no tratamento coadjuvante da celulite, e à heparina, escina e digitoxina, no tratamento das microvarizes, hematomas, contusões, flebites, tromboflebites superficiais e outros processos inflamatórios localizados.

Uso injetável: Como módulo indicativo, pode-se propor a dose de 150 UTR para cada 10 ml de anestésico local, deixando-se ampla liberdade de escolha das doses por parte do médico, pois trata-se de um produto com múltiplas aplicações em várias especialidades com dosagens variadas a exclusivo critério médico, sendo difícil fixar posologias.

Nota: As unidades internacionais e USP são equivalentes. Um internacional (UI) ou unidade USP é equivalente a uma unidade de redução de turbidez (UTR).

SUGESTÕES DE FÓRMULA:

Creme com Hialuronidase e Escina

Hialuronidase.....10.000 UTR%
Escina.....0,2%
Alantoína.....0,5%
Azuleno.....0,02%
Creme de massagem qsp.....100g

Modo de usar: aplicar com massagem e/ou fricção 1 a 2 vezes ao dia.

EFEITOS ADVERSOS: A sensibilidade à hialuronidase ocorre ocasionalmente.
Por causa do perigo de propagação da infecção, a enzima geralmente não deve ser injetada dentro ou ao redor de uma área infectada, se necessário, deve ser associada com antibióticos sistêmicos. Foi sugerido que a presença de malignidade pode ser uma contra-indicação ao uso de hialuronidase, portanto não deve ser aplicada nas proximidades de neoplasias.

Não deve ser administrada por injeção via intravenosa, nem deve ser usada para procedimentos anestésicos em casos de parto prematuro inexplicável.
Hialuronidase não deve ser aplicada diretamente na córnea.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Não deve ser usada para reduzir o inchaço de mordidas ou picadas de abelha, pois a hialuronidase é um dos componentes de seu veneno.

INTERAÇÕES: Algumas medicações, como cortisona, estrógenos, hormônio adrenocorticotrófico, salicilatos e anti-histamínicos, parecem tornar os tecidos parcialmente resistentes à ação enzimática da hialuronidase.

Furosemida, benzodiazepínicos e fenitoína parecem ser incompatíveis com a hialuronidase. Na gestação essa medicação é considerada categoria C (estudos em animais demonstram que o medicamento pode exercer efeitos teratogênicos ou é tóxico para os embriões, mas não há estudos controlados em mulheres).

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 5ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2015.

Postec. Farm Resp.: Dr. Eduardo Sérgio Medeiros Magliano. São Paulo – SP. Apsen, 2021. Bula de remédio.

Hyalozima. Farm Resp.: Dr. Eduardo Sérgio Medeiros Magliano. São Paulo – SP. Apsen, 2021. Bula de remédio.

SALIBA, Ana Flavia Nogueira. Hyaluronidase in cosmiatry: what should we know? ***Surg Cosmet Dermatol***, São Paulo v.7, n.3, p. 197-204, julho/2015.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.5935/scd1984-8773.20157301.

Texto atualizado em 12/04/2021, por Svetlana.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.