Uso: Interno

Fator de correção: Não se aplica **Fator de equivalência:** Não se aplica

HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO

ANTIÁCIDO COM AÇÃO RÁPIDA E NEUTRALIZAÇÃO DO PH GÁSTRICO

Os Antiácidos são utilizados como coadjuvantes no tratamento de úlceras ou gastrites, para alívio de sintomas através da neutralização da acidez estomacal, aumentando o pH no estômago e duodeno.
Os Antiácidos podem ser divididos em três classes: antiácidos coloidais, que são fármacos insolúveis, com propriedades tamponantes; outros antiácidos, que são protetores da mucosa gástrica; e sais e bases alcalinas, que são bases e sais inorgânicos, com propriedades alcalinas, como é o caso do Hidróxido de Magnésio.
O Hidróxido de Magnésio, também chamado de Leite de Magnésia, apresenta-se na forma de suspensão mais ou menos viscosa, contendo de 7 a 8,5g de $Mg(OH)_2$ em 100g. É usado como antiácido, e em dosagens elevadas, possui efeito catártico.

Recomendação de uso
A dosagem indicada para finalidade antiácida varia entre 200 a 600 mg. Para ação laxativa, recomenda-se a utilização de 2,5 a 5g. Indica-se a administração 2 horas antes ou após a utilização de outros fármacos, uma vez que os mesmos podem prejudicar sua absorção.

Aplicações
- ✓ Antiácido;
- ✓ Em dosagens elevadas, usado como laxativo.

Vantagens
- ✓ Elevam pH do conteúdo gástrico;
- ✓ Início de ação rápida.

Mecanismo de ação
O Hidróxido de Magnésio é uma base inorgânica com propriedades alcalinas. Atuam elevando o pH do conteúdo gástrico a 5.

Referências bibliográficas

1. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.
2. KOROLKOVAS, A.; BUCKHALTER, J. H. Química Farmacêutica. 1 ed, Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.

Última atualização: 07/10/2015 AVAO.