PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

IODO QUELATO
(Glicinato de Iodo)

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: Glicinato de Iodo.

CAS: N/A.

DCB: N/A.

FÓRMULA MOLECULAR: $C_2H_4NO_2I$

PESO MOLECULAR: 200,98 g/mol.

INFORMAÇÕES GERAIS: O iodo é considerado um micromineral necessário classificado como essencial. De acordo com a OMS mais de 30% da população mundial sofre de insuficiência da ingestão de iodo. A deficiência de iodo é a principal causa conhecida de dano cerebral "prevenível" e também promove o desenvolvimento do bócio endêmico, uma doença caracterizada pelo aumento difuso da glândula tireoide.

O iodo faz parte da estrutura do T3 e T4, hormônios que aceleram as reações celulares em praticamente todos os órgãos e tecidos do organismo, com aumento do metabolismo basal, consumo de oxigênio e produção de calor.

O iodo quelatado é melhor absorvido pelo organismo, já que estando introduzido na molécula de glicina sua absorção passa a ser por transporte ativo secundário ou cotransporte. Neste tipo de transporte o mineral que está introduzido na molécula de glicina e entrará para dentro da célula por carreadores de proteínas, sendo totalmente absorvido juntamente com os aminoácidos.

INDICAÇÃO: Suplemento nutricional, regular as funções tireoideanas.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: 50 a 100mcg (máximo 150mcg/dia).

PRECAUÇÕES: O uso prolongado pode gerar uma série de efeitos adversos, frequentemente chamados de iodismo, alguns dos quais, incluem a hipersensibilidade. Efeitos adversos incluem gosto metálico, salivação aumentada, rinite aguda, sintomas coriza-símile, inflamação e edema de garganta.

Não é recomendado administrar iodo na gestação a menos que seja necessário. Cautela também é necessária na administração de iodo em crianças. Pacientes com mais de 45 anos ou bócio nodular são especialmente suscetíveis ao hipertireoidismo quando a suplementação de iodo é realizada.

REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 5ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2015.

FERREIRA, Anderson de Oliveira. **Guia Prático da Farmácia Magistral**; ed. 4ª. V.2. Editora Pharmabooks, São Paulo, 2011.

RUIZ, Karina. **Nutracêuticos na pratica: terapias baseadas em evidências**; Editora INNEDITA, 2012.

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

Texto elaborado em 04/06/2019, por Bárbara.
Atualizado em 09/09/2024, por Rafael Ramos.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.