LEMMA

Liporeductyl®

Anticelulite com efeito emagrecedor

O aparecimento da celulite é um processo complexo, com muitas causas de naturezas diversas, como dietética, vascular, endócrina, estilo de vida. A celulite se forma devido a um acúmulo de gordura e retenção de líquidos, geralmente nas coxas e nádegas. Quando as células de gordura aumentam de tamanho, suas membranas tornam-se distorcidas, flexionam e perdem sua forma. A distribuição de gordura irregular e tecido conjuntivo danificado modificam a aparência da pele causando covinhas típicas de "casca de laranja". O fracasso do sistema vascular responsável pela circulação e a drenagem de toxinas resulta em uma perda de fluido no tecido circundante, afetando também os adipócitos. Estes resultam em um excesso de triglicerídeos e aumento de tamanho, preso na teia conectiva. Inicia, portanto, um ciclo negativo. Os extratos anticelulite clássicos são combinados em pró-lipossomas, aumentando sua penetração, com o efeito sinérgico do Glicil-Histidil-Lisina (GHK) no **Liporeductyl®**. O tripeptídeo captura os subprodutos da peroxidação lipídica, melhorando a eficácia dos outros componentes para combater a celulite e prevenir a maturação dos adipócitos.

Mecanismos de ação do Liporeductyl®

Liporeductyl® é um pró-lipossoma contendo uma combinação de ingredientes que não só combatem a celulite, mas que também impede sua formação. **Liporeductyl®** tem efeito lipolítico, atuando na gordura e na ação venotônica, com ativação da microcirculação. É capaz de reduzir e prevenir a formação de celulite, além de proporcionar um efeito de emagrecimento.

Liporeductyl®

Ivy *(Hedera helix)*: extrato rico em Hederina, uma saponina que protege e diminui a permeabilidade de vasos sanguíneos. Ivy ajuda a reabsorver o edema presente na fase inicial de aparecimento da celulite.

Escina: é um componente venotônico e antiedematoso.

Cafeína: bloqueia enzimas responsáveis pela destruição do AMPc, que está relacionado com a quebra de triglicérides. Também possui propriedade vasodilatadora, aumentando o fluxo sanguíneo.

Glicil-Histidil-Lisina (GHK): atua como um "varredor" específico de certos subprodutos da peroxidação lipídica, tais como aldeídos insaturados. A captura destes subprodutos aumenta significativamente a efetividade dos componentes anticelulíticos.

Butcherbroom *(Ruscus aculeatus)*: extrato rico em Rutina, um flavonóide que atua principalmente na microcirculação, diminuindo a permeação capilar.

Carnitina: é um derivado de aminoácido bem conhecido por aumentar a mobilização de triglicérides e também por acelerar sua quebra.

Compostos iodados, como o Tea-Hidroiodite, possuem efetiva propriedade lipolítica, pois estimulam a lipase.

Benefícios do **Liporeductyl®**

- Redução da celulite e melhora do aspecto "casca de laranja";
- Descongestionante e drenante linfático;
- Favorece a oxigenação dos tecidos;
- Hidratante.

Eficácia *In vitro* efeito preventivo: inibição da maturação dos adipócitos

Em cultura, os pré-adipócitos humanos foram estimulados a se diferenciarem em adipócitos, usando uma mistura de agentes diferenciadores que induz um forte acúmulo de gordura dentro das gotículas lipídicas contidas nos pré-adipócitos. As gotas lipídicas foram visualizadas por microscopia de contraste de fase e quantificado por meio de análise de imagem. O número de células por área e o número de adipócitos diferenciados também foram quantificados.



0 µg/ml Liporeductyl® | 10 µg/ml Liporeductyl® | 100 µg/ml Liporeductyl®

Liporeductyl® combate especificamente a maturação de adipócitos. O número de adipócitos diminuiu enquanto o restante das células não foram afetadas. Além disso, foram reduzidos de forma dependente da dose, tanto o número total de gotas lipídicas quanto o seu tamanho.

Eficácia *In vivo*: efeito anticelulite

O estudo foi realizado em 20 mulheres com celulite, com idades entre 18 e 70 anos. Um gel de **Liporeductyl®** 7% foi aplicado em partes específicas do corpo por 60 dias.

- **Medidas instrumentais: Contorno das nádegas e coxas**





15% dos pacientes demonstraram diminuição no contorno das nádegas de 2,0 a 3,0cm enquanto 60%, entre 0,5 e 1,0 cm e 85% das pacientes apresentaram redução do contorno das coxas 0,5 a 1,0 cm.

B. Gordura corporal e água extracelular





50% das pacientes eliminaram entre 0,6 e 1,4 kg de peso e 60% mostra uma diminuição de 0,5 a 1,6 litros de água extracelular.



dia 0 | dia 60

Videocapilaroscopia: As imagens da pele foram tiradas antes e depois do teste. Esta técnica atinge ampliações de 200x de imperfeições da celulite.

Liporeductyl® melhora a microcirculação, reduz a presença de nódulos e como consequência, diminui significativamente o aspecto "casca de laranja"

INCI: Water (Aqua), Glycerin, Lecithin, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus) Root Extract, Tea-Hydroiodide, Carnitine, Butylene Glycol, Escin, Ivy (Hedera Helix) Extract, Tripeptide-1, Maltodextrin, Carrageenan (Chondrus Crispus), Xanthan Gum, Silica, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol.
Livre de parabenos. Solubilidade: Dispersível em água.

SUGESTÃO DE FÓRMULAS

Drenagem e Contorno Corporal (Celulite, Adiposidade abdominal)	
Liporeductyl®	5%
Actigym™	5%
Zymo Cell	4%
Loção qsp	100 ml
Modo de uso: Aplicar nos locais afetados 2x ao dia com movimentos circulares	

Formulação para celulite: efeito lipolítico e venotônico para uma pele mais lisa e sem edema	
Liporeductyl®	7%
Gel base qsp	100ml
Modo de uso: Aplicar nas áreas afetadas 2x ao dia.	

Concentração Usual: 5-10%

LEMMA
Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply
Representante Oficial
LUBRIZOL LIFE SCIENCE
Lipotec™ Active Ingredients