Rua Victorino, 207 • Jardim Mutinga • Barueri – SP • CEP 06.463-290
Av. Casa Verde, 2252 • Casa Verde • São Paulo – SP • CEP 02.520-200
11 3199.7600 farmacia@exatadistricuicao.com.br

NANOMEGA 3 – ÔMEGA 3 MICROENCAPSULADO EM PÓ

COMPOSIÇÃO: ÔMEGA DE ORIGEM VEGETAL MICROENCAPSULADO

Descrição

Produto bioativo natural obtido do óleo da semente de linhaça através do uso de nanotecnologia para promover a encapsulação dos componentes bioativos.

Tais processos permitem elevada estabilidade aos produtos, que através de técnicas e métodos isentos de compostos químicos que contemplam técnicas avançadas de purificação e de alta performance resultam na preservação de todos os componentes bioativos do produto final.

Para garantir a qualidade dos componentes bioativos, Nanomega 3 é praticamente isento de impurezas, como agentes oxidantes, peróxidos e ácidos graxos livres, que possam induzir a decomposição dos produtos bioativos presentes neste produto.

Esses avanços tecnológicos têm permitido a introdução de ômega 3 em vários novos produtos durante os últimos anos. Algumas destas introduções incluem pães, leite, macarrão, ovos e iogurtes.

Propriedades

Os ácidos graxos essenciais merecem a nossa atenção, o que significa que eles não podem ser sintetizados pelo organismo humano, devendo assim ser obtidos através da dieta. Na dieta vegetariana, os ácidos graxos essenciais têm como principal fonte os óleos extraídos de alimentos vegetais.

O óleo de linhaça, derivado da semente de linho (Liniun usitatissimun), é a fonte mais rica de ALA. Por se tratar de um composto natural vegetal (extraído de plantas), o Ômega 3 tem como seu principal constituinte o ALA (ácido alfa linolênico) que se converte no organismo em dois importantes ácidos graxos de cadeia longa: o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA).

Recentes pesquisas indicam que os ácidos graxos ALA, EPA e DHA são nutrientes essenciais para o desensenvolvimento neonatal.

Assim sendo, ALA, EPA e DHA são recomendados para auxiliar na manutenção do bem estar geral podendo diminuir riscos cardiovasculares, prevenir arritmias, riscos de tromboses, além de diminuir taxas de triglicerídeos, evitando problemas correlatos, ou seja, promovendo saúde e bem estar ao homem, e principalmente, para gestantes e lactantes, pois influem no desenvolvimento do cérebro e sistema nervoso da criança.

Ação Farmacológica

Ácidos graxos Ômega 3, como o alfa-linolênico (ALA), são considerados essenciais porque não podem ser sintetizadas no organismo, apesar de serem essenciais para o ciclo de metabolismo humano. Desta forma, ele deve ser suprido através da alimentação.

Dois dos mais importantes ácidos graxos de ômega 3 são o ácido eicosapentaenóico

Aplicação

Uso oral, tópico e alimentício
Nanomega 3 é totalmente de origem vegetal, portanto, indica-se principalmente à pacientes vegetarianos, veganos ou aqueles que são sensíveis ao de origem animal.

Formas de Administração e Posologia

Uso Oral – 1.0 a 3.0 gr ao dia após as primeiras refeições conforme orientação médica
Uso Tópico (Cremes e Pomadas) – 1.0 a 4.0%
Uso Alimentício (Iogurte, Bolacha, Margarinas) – 0.1 – 4.0% Necessário calcular fator de correção sobre o teor de Ômega 3.

Ingestão diária recomendada (EUA)

Em 2002, a "Food and Nutrition Board of the US Institute of Medicine" estabeleceu adequado níveis de ingestão para omega-3 conforme tabela abaixo:

Alimentação Adequada para Omega-3			
Estágio da vida	**Idade**	**Homens (g/dia)**	**Mulheres (g/dia)**
Infantil	0-6 meses	0.5	0.5
Infantil	7-12 meses	0.5	0.5
Criança	1-3 anos	0.7	0.7
Criança	4-8 anos	0.9	0.9
Criança	9-13 anos	1.2	1.0
Adolescentes	14-18 anos	1.6	1.1
Adultos	19-50 anos	1.6	1.1
Gestante	Todas	-	1.4
Lactante	Todas	-	1.3

Interações Medicamentosas e Contraindicações

Não houve relator de interações medicamentosas e contraindicações.

Armazenamento

A temperatura entre 25º a 30ºC, em recipiente perfeitamente fechado, protegido da luz e umidade.

Referências

Fornecedor/Fabricante

-- CONNOR, W.E. Importance of n-3 Fatty Acids in Health and Disease. American Journal of Clinical Nutrition. v.1 n.71 p.171-175, 2000.

-- Dyerberg, J. Linolenate: derived polyunsaturated fatty acids and prevention of atherosclerosis. Nutr.Rev., v.44,n.4, p.125-134, 1986

-- GOYENS P. L. L. ; MENSINK R. P.; Effects of alpha-linolenic acid versus those of EPA/DHA on cardiovascular risk markers in healthy elderly subjects . European journal of clinical nutrition ISSN 0954-3007, 2006, vol. 60, no8, pp. 978-984

-- GRUNDY, S.M. Dietary Fat em: ZIEGLER, E.; FILER, L.J. Present Knowledge in Nutrition. Washington: ILSI, 7ª Ed., p.44-57, 1996.

-- Mantzioris, E.; Cleland, L.G.; Gibson, R.A.; Neumann, M.A.; et al. Biochemical effects of a dietcontaining foods enriched with n-3 fatty acids. Am. J. Clin. Nutr., v.72, n.1, p.42-48, 2000

-- Auestad, N.; Montalto, M.; Hall, R. et al. Visual acuity, erytrocytes fatty acid composition, and growth in term infants fed formulas with long chain polyunsatured fatty acids for one year. Pediatr. Res., v. 41, p. 1-10, 1997.

-- Crawford, M.A. Placental delivery of arachidonic and docosahexaenoic acids: implications for the lipid nutrition of preterm infants. Am. J. Clin. Nutr., v. 71(suppl), p. 275S-84S, 2000.

-- Haag, M. Essential Fatty Acids and the Brain. Can. J. Psychiatry. v. 48, p.195-203, 2003.

-- Makride, M; Neumann, M.; Jeffrey, B.; Lien, E. L.; Gibson, R. A randomized trial of different ratios of linoleic to α-linolenic acid in diet of term infants: effects on visual function and growth. Am. J. Clin. Nutr., v. 71, p. 120-9, 2000.

-- Vegetarian, 2009. The Vegetarian Society of the United Kingdom (site)

-- Whelan, Rust, 2006. Innovative dietary sources of n-3 fatty acids. Annu. Rev. Nutri., 26; 75-103.

-- Lima; Henriques; Santos; Andrade; Carmo. Rev. Soc. Bras. Alim. Nutr. v.28:65-77, 2004.