PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

NIPAGIM (METIL PARABENO)

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: Metil Parabeno; Methyl 4-Hydroxybenzoate.

CAS: 99-76-3.

DCB: 05809.

FÓRMULA MOLECULAR: $C_8H_8O_3$.

PESO MOLECULAR: 152,1 g/mol.

INFORMAÇÕES GERAIS: O metilparabeno, comercialmente conhecido como Nipagim, é o éster metílico do ácido p-hidroxibenzóico, pertencente à classe dos parabenos, amplamente utilizada como conservante antimicrobiano em produtos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios e veterinários. Seu mecanismo de ação antimicrobiana baseia-se na capacidade de inibir o crescimento de fungos e algumas bactérias, principalmente Gram-positivas, sendo mais eficaz em formulações com pH entre 4 e 8, faixa de maior estabilidade e atividade conservante.

Por apresentar atividade limitada contra bactérias Gram-negativas, o metilparabeno é frequentemente associado ao propilparabeno para ampliar o espectro de ação e garantir maior proteção microbiológica. Além disso, é um conservante estável, termorresistente e pouco suscetível à oxidação, características que o tornam ideal para soluções orais, suspensões, xaropes, cremes, loções, géis e pomadas, contribuindo significativamente para a prevenção de contaminação e o aumento da vida útil dos produtos.

INDICAÇÕES: O metilparabeno é indicado como conservante antimicrobiano em formulações aquosas e semissólidas, incluindo xaropes, soluções orais, suspensões, cremes, loções, géis e pomadas. Seu uso garante a estabilidade microbiológica e contribui para a segurança do produto durante o armazenamento e uso pelo paciente, sendo amplamente empregado em medicamentos, cosméticos e produtos de higiene.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: A dosagem usual do metilparabeno varia conforme a forma farmacêutica e a presença de outros conservantes. Em formulações farmacêuticas e cosméticas, a concentração recomendada situa-se entre 0,1% e 0,5%, podendo ser ajustada conforme a necessidade de preservação e a composição da formulação.

EFEITOS ADVERSOS: O metilparabeno é considerado seguro e bem tolerado nas concentrações habitualmente utilizadas, com baixa incidência de reações adversas. Em casos raros, podem ocorrer irritações cutâneas ou reações alérgicas de contato, principalmente em produtos tópicos de uso frequente.

REFERÊNCIAS

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, ***Formulário Médico-Farmacêutico***; 6ª Ed. Editora Atheneu. São Paulo, 2021.

CHEMICAL BOOK. Methylparaben. ***Base de dados.*** Disponível em: https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB0184566_EN.htm. Acesso em: 29 de julho. 2025.

Darbre PD, Harvey PW. **Parabens can enable hallmarks and characteristics of cancer in human breast-derived cells: A review of the literature with updated interpretation and suggested conclusions.** *J Appl Toxicol.* 2014;34(9):925-938. doi:10.1002/jat.3026.

Rowe RC, Sheskey PJ, Quinn ME. ***Handbook of Pharmaceutical Excipients.*** 9th edition. London: Pharmaceutical Press; 2020.

Literatura elaborada em 29/07/2025, por Rafael Ramos.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.