PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

OXIBUTININA HCl

CAS: 1508-65-2.
DCB: 06711
PESO MOLECULAR: 393.9
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{22}H_{31}NO_3$,HCl

INFORMAÇÕES GERAIS: A oxibutinina cloridrato é um antimuscarínico amina terciária com ação semelhante ao da atropina, ele também tem efeitos diretos sobre a musculatura lisa. A oxibutinina além do uso oral é também absorvida após a aplicação na pele, através de um sistema transdérmico. O sistema deve ser aplicado na pele intacta no abdômen, quadril, ou nádegas e substituídas a cada 3 a 4 dias; a reaplicação no mesmo local deve ser evitada durante 7 dias.

No Reino Unido, o cloridrato de oxibutinina está licenciado para distúrbios da bexiga neurogênica em crianças a partir da idade de 5 anos; tanto no Reino Unido e nos EUA é licenciado a partir da idade de 6 anos como uma formulação de libertação modificada
A oxibutinina também é licenciado para o tratamento da enurese noturna em crianças com mais de 5 anos.

Após doses orais de oxibutinina, as concentrações plasmáticas máximas são alcançadas dentro de uma hora.

FARMACOCINÉTICA: A oxibutinina sofre um extenso metabolismo de primeira passagem, principalmente pelo citocromo P450 isoenzima CYP3A4, e sistêmica por via oral.

A oxibutinina e seus metabólitos são excretados na urina e fezes, e possui uma semi-vida de eliminação de 2 a 3 horas. A oxibutinina foi detectada no leite materno. As evidências sugerem que ele pode atravessar a barreira hemato-encefálica.

INDICAÇÃO: Incontinência urinária, tratamento da dor pós-operatoria após cirurgia de próstata, bexiga neurogênica e enurese noturna.

POSOLOGIA: Doses orais usuais de cloridrato de oxibutinina são 5 mg duas ou três vezes por dia. Em pacientes idosos doses mais baixas de 2,5 ou 3 mg duas vezes por dia inicialmente, que pode ser aumentada para 5 mg duas vezes por dia, se necessário.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Em gel transdérmico a dose usual é de 4mg, aplicar 1ml diariamente na região do adômen ao deitar.

INTERAÇÕES: A oxibutinina pode interagir com outras drogas anticolinérgicas, incluindo alguns anti-histamínicos. O efeito no sistema nervoso é aumentado se o paciente estiver em uso de barbitúricos e anticonvulsivantes.

EFEITOS ADVERSOS: Devem se tomar precauções em pacientes com glaucoma, obstrução intestinal, constipação, megacólon, colite ulcerativa grave e miastenia. Não deve ser usado em pacientes com disfunção hepática, hipertireoidismo, problemas coronários, taquicardia, hipertensão e hérnia de hiato, pois apresentam piora com o uso da droga. Não deve ser usado, ainda em gestantes e lactentes.

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

Texto atualizado em: 25/06/2014.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.