PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

MINOXIDIL

DCB: 0590
CAS: 38304-91-5
PESO MOLECULAR: 209.2
FÓRMULA MOLECULAR: $C_9H_{15}N_5O$

INFORMAÇÕES GERAIS: Minoxidil é um agente anti-hipertensivo oral que atua promovendo vasodilatação periférica. Apresenta como efeito secundário uma alta incidência de hipertricose. Usado topicamente, estimula a microcirculaçao em torno do folículo piloso e promove o crescimento capilar. Produz efeito sobre o sistema cardiovascular semelhante ao de hidralazina. Minoxidil é administrado por via oral para o tratamento da hipertensão grave que não responde à terapia padrão.

INDICAÇÕES: O seu uso tópico é indicado para o tratamento da alopecia areata, em cremes e loções a 2 ou 3%, e da calvície, em loções alcoólicas a 1 ou 2%, isoladamente ou em associação a outros princípios ativos. Como o pico de atividade do minoxidil mantém-se por cerca de 1 hora, recomenda-se fazer várias aplicações ao dia, com a finalidade de melhorar a resposta terapêutica. O uso de curativos em alopecia areata pode aumentar a sua absorção e, consequentemente, a sua eficácia. No tratamento da hipertensão minoxidil é dada com um bloqueador beta ou metildopa para diminuir os efeitos de aceleração cardíaca-, e com um diurético, para controlar o edema.

ADMINISTRAÇÃO: Após uma dose única por via oral, o efeito hipotensor máximo ocorre normalmente após 2 a 3 horas, embora os efeitos não podem ocorrer até que após 3-7 dias de tratamento contínuo. A ação pode persistir por até 75 horas.

Uma dose inicial de 5 mg por dia de minoxidil é gradualmente aumentada em intervalos de pelo menos 3 dias a 40 ou 50 mg por dia de acordo com a resposta do paciente, em circunstâncias excepcionais de até 100 mg por dia foi dada. Se um controle mais rápido da pressão arterial é requerido, os ajustes de dosagem podem ser feitos a cada 6 horas com monitorização cuidadosa.

A dose diária pode ser administrada como uma dose única ou em 2 doses divididas. Para crianças de 12 anos de idade ou menos, a dose inicial recomendada é de 200 ug por quilograma de peso corporal por dia, aumentou em passos pf 100 a 200 ug por kg, em intervalos não inferiores a três dias, até que o controle da pressão sanguínea foi obtida ou um máximo de 1 mg por kg ou 50 mg por dia, foi atingido. Doses reduzidas podem ser necessárias em pacientes com função renal comprometida.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

EFEITOS ADVERSOS: Raramente, ode apresentar eritema local, descamação, prurido, hipotensão arterial, náuseas, fadiga, erupção cutânea, cefaléia, retenção hidrossalina com edemas, hipertricose.

INTERAÇÕES: Não pode ser administrado com outros tipos de remédios, como por exemplo, o glicocorticóides, mineralocorticóides, somatotropina e outros.

PRECAUÇÕES: Não utilizar em mucosas ou perto dos olhos. Aconselha-se a lavagem das mãos após cada aplicação.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Kathleen. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 32ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 1999.

BATISTUZZO, J.A.O., ITAYA, M., ETO,Y.. **Formulário Médico-Farmacêutico**; 2ª ed.; São Paulo, Ed. Tecnopress, 2002.

Texto atualizado em: 18/03/2013

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.