# PILOCARPINA HCl

**Nome popular:** Cloridrato de Pilocarpina
**Composição Química:** Concentração de 99,0 – 101,0% de pilocarpina HCl.
**Formula molecular:** $C_{11}H_{16}N_2O_2.ClH$ **Peso molecular:** 244,7203
**CAS:** 54-71-7
**DCB:** 07050
**Fator de equivalência:** 1,0

A Pilocarpina é um agonista dos receptores muscarínicos, subclassificada no grupo de alcaloides colinomiméticos. É obtida das folhas dos arbustos sul-americanos do gênero *Pilocarpus*. Seu efeito terapêutico na redução da pressão intra-ocular foi reconhecido em 1877, fornecendo a base de um tratamento seguro e eficaz do glaucoma, utilizado até hoje.

## Indicações e Ação Farmacológica

A pilocarpina apresenta uma atividade principalmente muscarínica, estimulando o trato gastrintestinal sem efeitos cardiovasculares importantes, contraindo o músculo detrusor da bexiga (aumentando a pressão de esvaziamento e a peristalse ureteral), promove diaforese intensa (transpiração excessiva), aumento da salivação, estimula as glândulas lacrimais, gástricas, pancreáticas e intestinais e as mucosas do aparelho respiratório, produz uma queda rápida da pressão arterial e, principalmente, reduz a pressão intraocular em casos de glaucoma. Em concentrações suficientes, a pilocarpina pode reverter parcial ou totalmente os efeitos oculares da atropina.

O cloridrato de pilocarpina é indicado para o tratamento inicial do glaucoma de ângulo aberto e da xerostomia (ressecamento excessivo provocado pela respiração bucal ou ronco).

Como demostrado no estudo multicêntrico de LEVEQUE, F. G. e colaboradores, doses acima de 2,5mg ao dia se mostraram terapeuticamente suficientes para redução da xerostomia causada pelo tratamento de câncer de cabeça e pescoço com radiação. Neste estudo, 162 pacientes valeram-se de diferentes concentrações de cloridrato de pilocarpina 2,5mg - 10,mg, via oral, no combate da xerostomia consequente ao seu tratamento anticâncer. Os autores descrevem a terapia cloridrato de pilocarpina como tolerável e eficiente, demonstrando ligeiros efeitos colaterais relativos à susceptibilidade dos pacientes e doses mais elevados, como sudorese e dores de cabeça.

## Toxicidade/Contraindicações

A intoxicação por pilocarpina se caracteriza pela exacerbação dos efeitos parassimpatomiméticos. O tratamento para a intoxicação consiste na administração parenteral de atropina.

## Dosagem e Modo de usar

**Glaucoma:** 0,5% - 4,0% em soluções oftalmológicas.

**Xerostomia:** 5 – 10 mg ao dia.

## Referências

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Manual De Orientação Ao Farmacêutico:** Manual De Equivalência Sal/Base. São Paulo, 2016.

GOODMAN GILMAN. **As bases farmacológicas da terapêutica**. 10° edição. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2005.

LEVEQUE, F. G. et al. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Titration Study of Oral Pilocarpine for Treatment of Radiation-Induced Xerostomia in Head and Neck Cancer Patients**, Journal of Clinical Oncology**, Vol 11, No 6 (June), pp. 1124-1131, (1993).