LABORATÓRIOS
ATTIVOS MAGISTTRAIS®

/attivosmagisttrais

POLIFIL®

BASE PRONTA PARA TECNOLOGIAS DE FILMES ORODISPERSÍVEIS

(11) 3995-5130
(11) 98700-1280
mkt@attm.com.br
attivosmagisttrais.com.br

ATTIVOS MAGISTTRAIS • UMA EMPRESA CERTIFICADA • BPF ANVISA • CERTIFICADA PARA VOCÊ

2019 JUBILEE 50 YEARS GRUPO LATINA

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO POLIFIL®**

Aplicações dos Filmes Orodispersíveis

Estima-se que 20% da população possui dificuldades psicológicas e fisiológicas na deglutição de comprimidos ou cápsulas. Isto é particularmente relevante para pediatria, idosos e disfágicos[1].

As formas orodispersíveis (ODx), caracterizadas como formas farmacêuticas destinada a serem administradas na boca em que liberam rapidamente o ativo farmacêutico produzindo uma suspensão fina ou solução destes na saliva, oferecem uma alternativa atraente para a liberação sistêmica de fármacos[1].

Isso ocorre devido a melhor adesão do paciente, facilidade de remoção da forma farmacêutica em emergências, robustez, boa acessibilidade, facilidade de administração. Além disso, evita a possível degradação do fármaco no trato gastrointestinal e no metabolismo de primeira passagem[1].

Os filmes orodispersíveis (ODF) são considerados uma nova forma farmacêutica que proporciona flexibilidade e conforto ao paciente.

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO POLIFIL®**

A eficácia de ativos farmacêuticos administrados por essa via é melhorada pela dissolução na cavidade oral em poucos minutos. A absorção e biodisponibilidade instantânea de ativos se deve ao alto fluxo sanguíneo e permeabilidade da mucosa oral que é 4-1000 vezes maior que a da pele[2].

Em geral, porque o filme orodispersível é uma boa opção?[3]

- Forma farmacêutica elegante e diferenciada;
- Rápida desintegração e dissolução na cavidade oral para ação local ou absorção sistêmica do ativo farmacêutico veiculado;
- Aumento da biodisponibilidade;
- Rápido início de ação;
- Não necessita de água ou mastigação para sua administração, ideal para viagem ou para pacientes com náusea ou vômito;
- Maior aceitabilidade entre pacientes disfágicos, pediátricos, geriátricos, psiquiátricos (sem risco de engasgamento ou sufocamento);
- Aumento da adesão ao tratamento;
- Exatidão da dose;
- Mascaramento de sabor e promoção de sensação bucal agradável;

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO POLIFIL®**

- Redução do efeito de primeira passagem hepática;
- Redução de efeitos adversos;
- Redução da degradação ácida no estômago;
- Disponível em vários tamanhos e formatos, portáteis e flexíveis;
- Apresenta estabilidade;
- Não invasivo;
- Excelente mucoadesão;
- É estável à umidade e temperatura ambiente.

Atualmente a produção dos filmes orodispersíveis não é mais exclusividade de indústrias ou precisa ser utilizado sistemas de produção contínuos. Hoje existem outras técnicas que possibilita a Farmácia de Manipulação disponibilizar os filmes aos pacientes, garantindo qualidade e eficácia da formulação. Além disso, a Attivos Magisttrais possui em seu portifólio a base Polifil® que possibilita ainda mais praticidade na hora da manipulação dos filmes.

A técnica de moldagem foi desenvolvida para a produção de filmes/strips com base na facilidade de aplicação para farmácias de manipulação, conforme destaca-se a seguir.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO POLIFIL®**

Técnica Exclusivamente Magistral

Moldagem
Operação simplificada
Baixo investimento
Maior controle de precisão de dosagem
Perda mínima
Alta adesão à mucosa e melhor absorção
Rápida finalização
Não utiliza manitol

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

BIOLOGIA E **MECANISMOS DE AÇÃO**

A administração dos filmes orodispersíveis é muito simples e o ativo farmacêutico é absorvido com o simples fato de colocar o filme sobre a língua ou abaixo dela.

O filme é instantaneamente molhado pela saliva devido sua composição hidrofílica, se hidrata e dissolve para liberar o ativo para ser absorvido na mucosa bucal[2]

O paciente irá retirar uma unidade de filme da embalagem e com a ajuda da ponta dos dedos colocar o filme orodispersível sobre a língua ou abaixo dela.

↓

Ao entrar em contato com a mucosa, o filme orodispersível se dissolve quase instantaneamente.

↓

Ao se dissolver, o filme orodispersível libera o ativo farmacêutico que será absorvido através das membranas orais até a corrente sanguínea.

↓

Finalmente, o ativo farmacêutico poderá fazer seu efeito terapêutico sistêmico.

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Existem inúmeros ativos farmacêuticos que apresentam eficácia comprovada através da administração de filmes orodispersíveis. Ativos farmacêuticos com eficácia comprovada quando administrados pela via bucal:

- Domperidona 20 a 40mg[4]
- Ondansetrona 4 a 8mg[5]
- Tadalafila 2,5 a 20mg[6]
- Melatonina 3 a 10mg[7]
- Metilcobalamina 1mg[8]
- Vitamina D 1.000 a 50.000UI[9]
- Ibuprofeno 50mg[10]
- Piroxicam 50mg[11]
- Tramadol 50mg[12]
- Bromazepam 1 a 6mg[13]
- Diazepam 2 a 20mg[14]
- Zolpidem 1,75 a 10mg[15]
- Sildenafila 25 a 50mg[16]
- Testosterona 2,5 a 5mg[17]
- Entre outros

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM **FILME ORODISPERSÍVEL IDEAL**

Os filmes orodispersíveis precisam apresentar algumas características principais para que tenham consistência, textura e estabilidade adequadas. A composição da base e a técnica escolhida para produção dos filmes precisa garantir dosagem correta, estabilidade do ativo, sabor agradável, ser resistente, mas também dispersar-se rapidamente após contato com a língua.

A base pronta Polifil® garante essas características e muito mais:



sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PREGNDA

VEJA COMO É FÁCIL A PRODUÇÃO DOS **STRIPS ORAIS COM POLIFIL®** NA TÉCNICA DE MOLDAGEM

Filme Orodispersível - Técnica de Moldagem

Ativo farmacêutico	X mg
Polifil®	**qsp 1 filme**

1. Calcular a quantidade requerida do ingrediente ativo;
2. Calcular a quantidade requerida da base Polifil®;
3. Basta adicionar os ingredientes ativos à base pronta Polifil® previamente hidratada;
4. Verter a mistura sobre os moldes;
5. Garantir que todo conteúdo preparado seja adicionado aos moldes de forma igual para garantir uniformidade de dose;
6. Deixar secar em estufa (o ideal é ter uma estufa que controle a temperatura e que permita o fluxo de ar para que os filmes sequem uniformemente (não é obrigatório, mas permite maior qualidade na secagem dos filmes). O tempo de secagem pode variar de acordo com a umidade do ambiente e da temperatura escolhida para secar os filmes (alguns ativos permitem temperatura elevada e consequentemente o tempo de secagem será menor e vice-versa.
7. Retirar os filmes dos moldes e embalar.

*Os filmes podem ser embalados em sachês de alumínio, cartuchos plásticos ou de alumínio e Rapid Card. Também é possível cortar papel manteiga em um tamanho levemente maior do que o filme e assim envolver uma unidade de filme para evitar que grudem.

Esta é uma sugestão de farmacotécnica resumida – Para ter acesso ao procedimento completo e/ou informações sobre o curso online, favor entrar em contato pelo WhatsApp (11) 98781 0294.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPGNDA

PROPRIEDADES

Polifil® é uma base polimérica desenvolvida para produção de filmes orodispersíveis, com exclusividade pelos Laboratorios Attivos Magisttrais com o apoio da Rx Editora Tecnologia Farmacêutica.

É comercializada pronta para uso.

É solúvel em água, possui excelente capacidade filmógena com rápido tempo de desintegração.

Além disso, Polifil® é um composto totalmente vegetal e sem nenhuma contraindicação.

A base é adequada tanto para uso da técnica de laminação, moldagem ou extrusão.

Fórmula testada com diferentes capacidades de dosagens e excelentes tempo de secagem.

BENEFÍCIOS

- Maior praticidade e agilidade para farmácia de manipulação produzir os filmes.
- Pode ser utilizada para pacientes veganos, celíacos e intolerantes à lactose.
- Suporta boa capacidade de dosagem.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

ESTRATÉGIA DE **MARKETING**

Em relação aos filmes orodispersíveis em geral, a farmácia magistral pode disponibilizar mais uma forma farmacêutica com comprovação científica de eficácia clínica. Hoje os filmes orodispersíveis são amplamente bem aceitos pelo paciente e solicitados pelos prescritores e tê-los na farmácia é mais uma forma de fidelização de seus prescritores e clientes.

Em relação à base Polifil®, está se destaca pela praticidade que fornece às farmácias magistrais, uma vez que é de fácil preparação, rápida secagem, proporcionando assim agilidade na manipulação, além de poder ser utilizada em qualquer técnica de preparação (laminação ou moldagem) e ser natural, podendo ser ingerida por todos os pacientes.

ONDE **ENCONTRAR**

Exclusivamente nas filiais da Attivos Magisttrais: **São Paulo**
Belo Horizonte
Anápolis

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280
desenvolvimento@attm.com.br
sac@attm.com.br

LITERATURA CONSULTADA

1. Cilurzo, F., Musazzi, U. M., Franzé, S., Selmin, F., Minghetti, P. Orodispersible dosage forms: biopharmaceutical improvements and regulatory requirements. Drug Discov Tod. 2018. 23, 251–259.

2. Siddiqui, M. D. N., Garg, G., Sharma, P. K. A Short Review on "A Novel Approach in Oral Fast Dissolving Drug Delivery System and Their Patents". Adv. Biol. Res. (Rennes). 2011. 5, 291–303.

3. Amin, P., Gangurde, A., Alai, P. Oral Film Technology: Challenges and Future Scope for Pharmaceutical Industry. Int. J. Pharm. Pharm. Res. 2015. 3, 183–203.

4. Aboutaleb, A. E., Abdel-Rahman, S. I., Ahmed, M. O., Younis, M. A. Design and evaluation of domperidone sublingual tablets. Int. J. Pharm. Pharm. Sci. 2016. 8, 195–201.

5. Koland, M., Sandeep, V., Charyulu, N. Fast Dissolving Sublingual Films of Ondansetron Hydrochloride: Effect of Additives on in vitro Drug Release and Mucosal Permeation. J Young Pharm. 2010. 2, 216–22.

6. Park, S. I. et al. Comparison of tadalafil pharmacokinetics after administration of a new orodispersible film versus a film-coated tablet. Drug Des. Devel. Ther. 2018. 12, 935–942.

PROPAGANDA

ATTIVOS MAGISTTRAIS®
Av. Juscelino Kubitschek, 1588
Anápolis/GO - CEP 75115-015
Contato: (11) 3995-5130
/attivosmagisttrais
@attivosmagisttrais

(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280
desenvolvimento@attm.com.br
sac@attm.com.br

LITERATURA CONSULTADA

7. Naguib, M., Samarkandi, A. Premedication with melatonin: a double-blind, placebo-controlled comparison with midazolam. Br J Anaesth. 1999. 82, 875–80.

8. Parry-Strong, A., Langdana, F., Haeusler, S., Weatherall, M., J, K. Sublingual vitamin B12 compared to intramuscular injection in patients with type 2 diabetes treated with metformin: a randomised trial. N Z Med J. 2016. 129, 67–75.

9. McCullough, P., Heaney, R. Correction of vitamin D deficiency using sublingually administered vitamin D2 in a Crohn's disease patient with mal-absorption and a new ileostomy. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017. 173, 211–214.

10. Cioli, V. Patent US20060141027A1. Sublingual administration of non-steroidal anti-inflammatory pharmacological substances. 2004.

11. Cilurzo, F., Cupone, I., Minghetti, P., Selmin, F., Montanari, L. Fast dissolving films made of maltodextrins. Eur J Pharm Biopharm. 2008. 70, 895–900.

12. Zhang, H., Zhao, Y., Wang, X., Zhang, Q. Bioavailability of tramadol hydrochloride after administration via different routes in rats. Biopharm Drug Dispos. 2014. 35, 525–31.

PROPAGNDA

ATTIVOS MAGISTTRAIS®
Av. Juscelino Kubitschek, 1588
Anápolis/GO - CEP 75115-015
Contato: (11) 3995-5130
/attivosmagisttrais
@attivosmagisttrais

LITERATURA CONSULTADA

13. Vandoni, G., Oliani, C., Coelho, A. & Zaniboni, H. WO2004105767A1. Pharmaceutical composition based on agonist of benzodiazepine. 2004.

14. Mansur, A. P., Ramires, J., Avakian, S., de Paula, R., Pileggi, F. Comparison of the effects of diazepam, nifedipine, propranolol and a combination of nifedipine and propranolol, by sublingual administration, in patients with hypertensive crisis. Arq Bras Cardiol. 1991. 57, 313–7.

15. Joseph, V., Pergolizzi, R. T., Robert, B., Srinivas, N., Maninder, C. Fast-Acting Sublingual Zolpidem for Middle-of-the-Night Wakefulness. Sleep Disord. 2014.

16. Loprete, L., Leuratti, C., Frangione, V., Radicioni, M. Pharmacokinetics of a Novel Sildenafil Orodispersible Film Administered by the Supralingual and the Sublingual Route to Healthy Men. Clin. Drug Investig. 2018. 38, 765–772.

17. Salehian, B. et al. Pharmacokinetics, bioefficacy, and safety of sublingual testosterone cyclodextrin in hypogonadal men: comparison to testosterone enanthate--a clinical research center study. J Clin Endocrinol Metab. 1995. 80, 3567–75.

PROPAGNDA