PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

PRILOCAÍNA CLORIDRATO

SINÔNIMOS/ NOME QUÍMICO: Astra-1512; Hidrocloruro de prilocaína; L-67; Prilocaïne, chlorhydrate de; Prilocaini hydrochloridum; Prilokaiinihydrokloridi; Prilokain Hidroklorür; Prilokain hydrochlorid; Prilokain-hidroklorid; Prilokainhydroklorid; Prilokaino hidrochloridas; Propitocaine Hydrochloride.
CAS: 1786-81-8
DCB: 07364
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{13}H_{20}N_2O$, HCl
PESO MOLECULAR: 256.8.

INFORMAÇÕES GERAIS: Anestésicos locais produzem sensação, ou perda reversível da função, impedindo ou diminuindo a condução de impulsos nervosos próximos ao local da sua aplicação.

Seu modo de ação é a diminuição da permeabilidade da membrana das células nervosas e íons de sódio, eles também têm um efeito estabilizador de membrana.
A prilocaína é um anestésico local do tipo amida.

Tem uma potência anestésica semelhante à da lidocaína. Contudo, tem um início de ação mais lenta, menor atividade vasodilatadora e um tempo de ação ligeiramente mais longo; isto é também é menos tóxica.

O cloridrato de prilocaína é utilizado para infiltração, anestesia em soluções de 0,5%, 1% e 2%. Uma solução a 1% também é utilizada para promover analgesia e uma solução a 2% é utilizada para anestesia.

A prilocaína é utilizada para anestesia superficial em uma mistura eutética com lidocaína, é aplicada como um creme sob uma forma oclusiva, para produzir anestesia superficial da pele antes de procedimentos que requerem punção com agulha, tratamento de lesões localizadas e enxerto de pele.

Tem sido utilizado de forma semelhante, mas sem a necessidade de oclusão, antes da remoção das verrugas genitais.

INDICAÇÃO: Anestésico.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407

EFEITOS ADVERSOS: Os efeitos adversos aparentes após a anestesia local podem ser causados pelo anestésico ou erros na técnica, resultando o bloqueio do sistema nervoso simpático.

PRECAUÇÕES: Doses devem ser reduzidas em pacientes idosos ou debilitados.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: 2,5%.

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

MORETTO Lauro, MASTELARO, Rosana, coordenadores. **MDCB: Manual das Denominações Comuns Brasileiras**, SINDUSFARMA, (Manuais SINDUSFARMA ; v. 16), São Paulo, 2013.

Texto atualizado em 24/11/2016, por Bárbara.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.