PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

PROCAÍNA HCl

SINÔNIMOS/NOME QUÍMICO: *Allocaine; Ethocaine Hydrochloride; Hidrocloruro de procaína; Novocainum; Procaïne, chlorhydrate de; Procaini hydrochloridum; Syncaine. 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride.*
CAS: 51-05-8
DCB: 07383
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{13}H_{20}N_2O_2,HCl$
PESO MOLECULAR: 272.8.

INFORMAÇÕES GERAIS: O cloridrato de procaína é um anestésico local. É um éster do ácido para-aminobenzóico. Após absorção, a procaína é logo hidrolisada, principalmente na circulação, por uma substância do plasma. Os produtos de hidrólise enzimática são o ácido paraminobenzoico e o dietilaminoetanol.

Devido à sua fraca penetração no muco intacto e membranas, a procaína é praticamente ineficaz para aplicação superficial, e em geral tem sido substituído por lidocaína e outros anestésicos locais. Tem um lento início da ação e uma curta duração.

Constitui-se em um anestésico local utilizado largamente em procedimentos odontológicos, funcionando através do bloqueio da iniciação e condução do impulso nervoso e da diminuição da permeabilidade da membrana axonal pelo bloqueio dos canais de sódio dependentes de voltagem.

INDICAÇÃO: Anestésico tópico.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL: 10 a 20%.

SUGESTÕES DE FÓRMULA: Supositórios e pomadas.

REFERÊNCIAS:
SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

MORETTO Lauro, MASTELARO, Rosana, coordenadores. **MDCB: Manual das Denominações Comuns Brasileiras**, SINDUSFARMA, (Manuais SINDUSFARMA ; v. 16), São Paulo, 2013.

Texto atualizado em 10/10/2018, por Bárbara.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407