REPHYLL

β-Cariofileno lipossomado, altamente biodisponível e estável

Irial Mag

Imagem meramente ilustrativa

Tecnologia indiana

Modo de uso

Interno | Cápsulas

Dose usual

500mg ao dia (pode ser dividido em 2 doses)

Introdução:

A dor crônica afeta entre 20 e 40% da população mundial em algum momento da vida, causando sofrimento, comprometimento funcional, incapacidade progressiva, elevado custo socioeconômico e isolamento social.

REPHYLL® possui uma exclusiva composição de origem natural para auxiliar no gerenciamento da dor, sendo obtido por isolamento do β-Cariofileno, um fitocanabinóide proveniente da piper nigrum, que através de um revolucionário sistema patenteado de última geração, conhecido por ZEAL™ Technology, é capaz de produzir lipossomas em pó altamente estáveis e biodisponíveis. O β-cariofileno é agonista seletivo dos receptores CB2, que são alvos terapêuticos para o manejo da dor de diferentes etiologias e da inflamação, e desta forma, o β-cariofileno poderá contribuir para o alívio da dor.

A ativação do receptor CB2 inibe respostas à dor aguda, inflamatória e neuropática. É importante ressaltar que este agonista seletivo de receptores de canabinóides CB2 não causa efeitos colaterais no sistema nervoso central (SNC), sendo esta, uma característica importante de REPHYLL®, pois, a eficácia das terapias atuais para o gerenciamento da dor é frequentemente limitada por tais efeitos indesejáveis.

Desenvolvido por ZEAL™ Technology

Através da ZEAL™ Technology, as moléculas de β-Cariofileno são lipossomadas em pó, o que garante maior estabilidade e otimiza a sua biodisponibilidade, desta forma, alcançam uma entrega direcionada e seletiva, assegurando a contribuição aprimorada de REPHYLL®.

Adequado para veganos

Livre de GMO

Benefícios

- **Adjuvante no gerenciamento da dor crônica/ inflamatória**
- **Adjuvante no gerenciamento da dor neuropática**
- **Adjuvante no gerenciamento de dores reumáticas**
- **Adjuvante no gerenciamento da dor muscular tardia (DOMS)**
- **Adjuvante no gerenciamento da dor "pós – lesão" em atletas**
- **Ausência de toxicidade**
- **Ausência de efeitos colaterais**
- **Não causa dependência**

SUGESTÕES DE FÓRMULAS
escaneie aqui

linha NUTRI

Este material contém informações técnicas destinadas exclusivamente aos profissionais da àrea da saúde

Mecanismo de ação

Rephyll® é um agonista seletivo dos receptores CB2 periféricos e contribui para a antinocicepção sem efeitos canabinérgicos tradicionais. Desta forma, REPHYLL® é utilizado como adjuvante para o gerenciamento da dor e inflamação.

Estudos comprovam

Preparação e caracterização de β-cariofileno lipossomal (Rephyll®) por tecnologia de tecelagem de nanofibras e seus efeitos na dor muscular de início tardio (DOMS) em humanos: um estudo randomizado, duplo-cego, cruzado e controlado por placebo. Estudo realizado com 20 voluntários do sexo masculino entre 19 e 29 anos por um período até 23 dias, dividido em dois grupos aleatórios com a administração de REPHYLL® 500mg v.s. placebo.



Houve uma melhora estatisticamente significativa na dor para o grupo que utilizou REPHYLL® em comparação ao grupo placebo, demonstrando a excelente contribuição do REPHYLL® no auxílio do alívio da DOMS.



Houve uma melhora estatisticamente significativa da força isométrica no grupo que utilizou REPHYLL®, demonstrando sua contribuição no auxílio do gerenciamento da DOMS a partir do 4° dia.



A partir do 3° dia, foi possível notar que houve um aumento do ângulo do braço relaxado, que indica melhoria na flexibilidade muscular com o uso de REPHYLL®.

CAS-No: *N/A.*

Para consultar nossas referências bibliográficas, solicite a literatura técnica

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br
www.irialmag.com.br

@irialmag
@irialmag