Resvin™

O veículo para pastilha transmucosa bucal mais versátil e completo

www.fagron.com.br

Fagron
personalizing medicine

Resvin™

Resvin™ é o veículo para preparação de pastilhas transmucosas orais, destinadas a dissolver lentamente na boca já que liberam o ativo para absorção nas mucosas bucal e sublingual e na deglutição no trato gastrointestinal. Contribui para o aumento da absorção e a biodisponibilidade de ativos.

Resvin™ foi especialmente desenvolvido para ativos pouco solúveis e com sabor amargo, pois ajuda a aumentar a biodisponibilidade de compostos polifenólicos, como crisina, cúrcuma e *trans*-resveratrol.

Afinal, pela via oral, essas biodisponibilidades são críticas e limitadas pelo extenso metabolismo intestinal e hepático, resultando em baixos níveis plasmáticos.

Por isso, a forma da pastilha bucal, que permite uma liberação lenta e um maior tempo de contato com a mucosa bucal, aumenta a biodisponibilidade e a eficácia da fórmula.

Trans-resveratrol em Resvin™: Elevada permeação

A pastilha bucal de Resvin™ aumenta a biodisponibilidade do *trans*-resveratrol, que na forma oral acaba sendo prejudicada pelo extenso metabolismo intestinal e hepático e sofre sulfatação e conjugação com ácido glicurônico, o que acaba resultando em baixos níveis plasmáticos.

A administração de uma dose oral de 25 mg de *trans*-resveratrol apresenta no sangue níveis inferiores a 5 ng/mL de *trans*-resveratrol livre. Enquanto estudo demonstra que 1 mg de *trans*-resveratrol mantido na mucosa bucal por 1 minuto antes de ser deglutido resulta em pico plasmático de 37 ng/mL após 2 minutos.

Já um estudo de permeação do *trans*-resveratrol em Resvin™ mostra que é possível observar uma absorção de 87,4%.

Tabela 1. Permeação do *trans*-resveratrol em Resvin™



Sugestões de Fórmulas

Trans-resveratrol de alta biodisponibilidade

Trans-resveratrol	50 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Estimulante do apetite

Ciproheptadina	4 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Tratamento de disfunção sexual erétil

Sildenafila (como Citrato)	25 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Antiemético

Ondansetrona	4 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 5 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 2 vezes ao dia.

Tratamento de dor e inflamação

Piroxicam	10 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 7 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Alívio dos sintomas ocasionados pela rinite alérgica

Cetirizina (como cloridrato)	10 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 10 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia

Terapia de modulação hormonal com testosterona para mulheres

Testosterona Fagron Micro	0,25 mg a 5 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Terapia de modulação hormonal com testosterona para homens

Testosterona Fagron Micro	10 mg a 100 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Tratamento da sarcopenia

Oxandrolona	10 mg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Manutenção da saúde cardiovascular e do sistema nervoso

Metilcobalamina	1.000 mcg
Resvin™	qsp 1 pastilha

Aviar tratamento para 60 dias

Posologia: Colocar 1 pastilha bucal próxima à região da bochecha e deixar dissolver, 1 vez ao dia.

Referências Bibliográficas

WALLE, T. et al. High Absorption But Very Low Bioavailability of Oral Resveratrol in Humans. Drug Metabolism and Disposition 32:1377–1382, 2004.
ASENSI, M. et al. Inhibition of cancer growth by resveratrol is related to its low bioavailability. Free Radical Biology & Medicine, Vol. 33, No. 3, pp. 387–398, 2002.
PURATCHIKODY, A. et al. Buccal Drug Delivery: Past, Present and Future – A Review. International Journal of Drug Delivery 3 (2011) 171-174.
BOBADE, N. N. et al. A Review on Buccal Drug Delivery System. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Scien Research 2013; 3(1): 35-40.Int J Pharm Comp., 4,414-420, 2000. WREN, B. G. et al. Pharmacokinetics of estradiol, progesterone, testosterone and dehydroepiandrosterone after transbuccal administration to postmenopausal women. Climacteric. 2003 Jun; 6(2):104-11. LATHEESHJLAL, L. et al. Formulation and Development of Buccal Drug Delivery System containing Curcumin. International Journal of PharmTech Research, Vol. 3, No.1, pp 37-41, 2011. The United States Pharmacopeial Convention. USP Pharmacists' Pharmacopeia. 2nd ed. Rockville: The United States Pharmacopeial Convention, 2008. p.1108-111. ALLEN, L. V. Jr. Sildenafil Citrate 25-mg Sublingual Troches. International Journal of Pharmaceutical Compounding. 3(2); 1999:135. ALLEN, L. V. Jr. Bioidentical Testosterone Replacement Therapy. US Pharmacist. 30(8); 2005:64-65. WALLE, T. et al. Disposition and metabolism of the flavonoid chrysin in normal volunteers. Science Ltd Br J Clin Pharmacol, 51 (2001), 143-146.
FERREIRA, A. O. Guia prático da farmácia magistral. / Anderson de Oliveira Ferreira. - 4 ed., rev. e ampl. - São Paulo: Pharmabooks Editora, 2011. v. 1 e 2.

Este material é uma publicação de
Fagron Brasil Farmacêutica

Juntos,
nós criamos o futuro
da medicina
personalizada.

Fagron Brasil Farmacêutica
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - 27º andar
Edifício Berrini One – 04571-010 São Paulo – Brazil
T +11 2050-2324
www.fagron.com

Contato
contato@fagron.com.br
fagron.com.br

Fagron
personalizing
medicine