RipFACTOR™ é uma combinação única de extratos naturais com efeitos significativos no tecido muscular e na performance esportiva.

RipFACTOR™ apresenta na sua composição o extrato da flor de *Sphaeranthus indicus* e o extrato da casca da *Mangifera indica* (mangueira), padronizados em 7-hidroxi-frulanolida e mangiferina. Atua como um acelerador dos resultados iniciais do treino, e favorece o *cutting* e definição muscular.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

- Praticantes de exercícios físicos de força e explosão;
- Indivíduos na fase de *cutting*;
- Definição muscular;
- Atletas profissionais;
- Indivíduos que estão iniciando a prática de exercícios físicos.

MECANISMO DE AÇÃO

As ações do **RipFACTOR™** estão relacionadas ao metabolismo muscular envolvendo síntese proteica, proliferação celular, gasto de energia e aporte de oxigênio. **RipFACTOR™** atua em:

- **Hipertrofia e aumento de força muscular:** estimula a síntese proteica através da ativação da via de sinalização celular da mTOR e a diferenciação das células satélites;
- **Atenuação do catabolismo muscular:** inibe a atividade do proteassoma 20S;
- **Melhora da capacidade de endurance:** atenuação da atividade da NADPH oxidase, complexo enzimático responsável pela produção de espécies reativas de oxigênio (ROS);
- **Vasodilatação:** aumento da produção de óxido nítrico contribuindo para o aporte de nutrientes e oxigênio.



Figura 1: Mecanismo de ação

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA

Um estudo randomizado, duplo-cego, placebo controlado foi realizado com 40 homens saudáveis, desportistas, entre 18-40 anos de idade. Os voluntários foram suplementados com 650mg/dia de **RipFACTOR™** ou placebo durante 56 dias. Os voluntários suplementados com **RipFACTOR™** tiveram um aumento significativo de 5,58x da força muscular, 2,56x mais repetições e aumento de 4x na circunferência do braço. Os indivíduos também apesentaram uma redução significativa nos níveis de cortisol.



(a) Acelerador Muscular



(b) Resistência Muscular

Figura 2: Efeitos após 56 dias.



(c) Hipertrofia Muscular

Outro estudo randomizado, duplo-cego, placebo controlado foi realizado com 99 homens saudáveis, não treinados, entre 19-29 anos de idade. Os voluntários foram distribuídos em quatro grupos: **RipFACTOR™** - 325 mg/dia; **RipFACTOR™** -650 mg/dia; Placebo I-1 série de exercícios; Placebo II-2 séries de exercícios; durante 56 dias. Ambas as doses de RipFACTOR™, aumentaram a resistência e a força muscular em maior proporção que até mesmo do grupo que treinou a carga de exercícios dobrada. Houve uma redução nos níveis de cortisol nos grupos **RipFACTOR™**, reduzindo a razão cortisol/testosterona.





Figura 3: Efeitos após 56 dias.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

GANHO DE FORÇA MUSCULAR

RipFACTOR™ _____ 325 a 650mg
Excipiente qsp _____ cápsula

Posologia: *Dia de Treino: 1 dose 1h antes do treino.
*Dia de Descanso: 1 dose em jejum junto com o café da manhã.

MELHORA DO DESEMPENHO ESPORTIVO

RipFACTOR™ _____ 325mg
s7™ _____ 50mg
Excipiente qsp _____ cápsula

Posologia: *Dia de Treino: 1 dose 1h antes do treino.
*Dia de Descanso: 1 dose em jejum junto com o café da manhã.

SUPORTE -CUTTING

RipFACTOR™ _____ 650mg
Capsici extrato seco _____ 6mg
Excipiente qsp _____ cápsula

Posologia: *Dia de Treino: 1 dose 1h antes do treino.
*Dia de Descanso: 1 dose em jejum junto com o café da manhã.

POSOLOGIA

325-650mg/dia via oral. Dia de treino: 1 dose 1 hora antes do treino. Dias de descanso: 1 dose em jejum junto com o café da manhã.

Referências Bibliográficas:

Dossiê técnico do fabricante.