IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

Tintura Espinheira Santa

Uso: Externo

Maytenus ilicifolia

Sumário

Introdução	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 4
Ficha técnica	pág. 5
Referência bibliográficas	pág. 7

Indicação: A tintura de espinheira-santa é indicada como fitoterápico tradicional para suporte à saúde do trato gastrointestinal, especialmente em quadros de dispepsia, gastrite, azia, má digestão e desconfortos gástricos associados à hiperacidez. Também apresenta uso complementar na proteção da mucosa gástrica e no alívio de sintomas relacionados a distúrbios gastroduodenais funcionais.

Posologia e modo de usar: A posologia deve ser individualizada conforme a concentração do extrato hidroalcoólico e a finalidade terapêutica. Tradicionalmente, a administração ocorre por via oral, de 10 a 30 gotas diluídas em água, uma a três vezes ao dia, preferencialmente antes das refeições. A duração do uso deve respeitar a resposta clínica e a orientação de profissional habilitado.

Contraindicações: O uso da tintura de espinheira-santa é contraindicado em indivíduos com hipersensibilidade conhecida à espécie vegetal. Não é recomendada para gestantes e lactantes, devido à possibilidade de efeitos sobre a fertilidade e à ausência de dados clínicos conclusivos de segurança. Deve ser evitada em crianças sem orientação profissional.

Advertências: Preparações hidroalcoólicas exigem cautela em indivíduos com restrição ao consumo de álcool, doenças hepáticas ou histórico de alcoolismo. O uso prolongado requer acompanhamento profissional, especialmente em pacientes com histórico de doenças gástricas crônicas ou em uso contínuo de medicamentos gastrointestinais.

Interações medicamentosas: A espinheira-santa pode interferir na absorção de medicamentos administrados por via oral, em razão de sua ação protetora da mucosa gástrica. Recomenda-se cautela na associação com antiácidos, inibidores da bomba de prótons ou antagonistas H_2, devendo a administração ser espaçada quando utilizada concomitantemente.

Reações Adversas: Quando utilizada nas doses tradicionais, a tintura é geralmente bem tolerada. Reações adversas são raras e podem incluir desconforto gastrointestinal leve, náusea ou constipação. Em indivíduos sensíveis, podem ocorrer reações alérgicas.

Introdução

A espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia*), pertencente à família Celastraceae, é uma planta nativa da América do Sul amplamente empregada na medicina tradicional brasileira. As folhas constituem a principal parte utilizada, sendo ricas em compostos bioativos como taninos, flavonoides, triterpenos e alcaloides. A tintura representa uma forma farmacêutica tradicional que permite a extração eficiente desses constituintes, preservando suas propriedades gastroprotetoras.

Mecanismo de Ação

Os efeitos gastroprotetores da espinheira-santa estão associados principalmente à presença de taninos, triterpenos e flavonoides, que contribuem para a redução da secreção ácida gástrica, aumento da produção de muco protetor e proteção da mucosa contra agentes irritantes. Estudos experimentais indicam ainda atividade antiulcerogênica, antioxidante e leve ação anti-inflamatória sobre a mucosa gástrica, favorecendo a integridade do epitélio digestivo.

Ficha técnica

Uso recomendado

Externo

Características do ativo

Aspecto: Líquido de baixa viscosidade

Cor: Castanho a Castanho esverdeado

Odor: Característico

Nome Botânico: *Maytenus ilicifolia*

Parte utilizada: Folha

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO INTERNO. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, enxágue abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte:

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado. Armazenar em temperatura ambiente e proteger contra incidência solar direta.

Lote e validade

Vide embalagem.

Referências bibliográficas

- NEGRI, Myrian Lane Soares; POSSAMAI, João Carlos; NAKASHIMA, Tomoe. Atividade antioxidante das folhas de espinheira-santa-Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss., secas em diferentes temperaturas. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 553-556, 2009.
- DE MORAES JESUS, Wilker Marlon; DA CUNHA, Tarcísio Neves. Estudo das propriedades farmacológicas da espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek) e de duas espécies adulterantes. Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 2, n. 1, p. 20-46, 2012.
- JORGE, R. M. et al. Evaluation of antinociceptive, anti-inflammatory and antiulcerogenic activities of Maytenus ilicifolia. Journal of Ethnopharmacology, v. 94, n. 1, p. 93-100, 2004.
- LEITE, João Paulo V. et al. Constituents from Maytenus ilicifolia leaves and bioguided fractionation for gastroprotective activity. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 21, p. 248-254, 2010.
- DE CARVALHO MEIRELLES, Gabriela et al. Phytochemistry and pharmaceutical technology studies on Monteverdia ilicifolia (Maytenus ilicifolia): A traditionally used medicinal plant. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 32, n. 6, p. 859-870, 2022.

Literatura técnica

Tintura Espinheira Santa

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br