PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

SUCRALFATO

CAS: 54182-58-0.
DCB: 08078
FÓRMULA MOLECULAR: $C_{12}HmAl_{16}OnS_8$.

INFORMAÇÕES GERAIS: É um composto formado pelo octossulfato de sacarose e hidróxido de polialumínio.
É uma droga citoprotetora que no trato gastrointestinal, forma um complexo aderente com proteínas que reveste a mucosa gástrica e possui uma afinidade especial para sítios de úlcera. Inibe a ação da pepsina e absorve sais biliares.
O sucralfato pode ser usado também topicamente em queimaduras e ferimentos, sua ação se dá pela formação de uma barreira física com o meio ambiente e se ligando aos fatores de crescimento dos fibroblastos, impedindo a sua degradação e, deste modo promovendo a cicatrização.
O sucralfato também previne a liberação de citocinas (interleucina 2 e o interferon gama) nas células danificadas, prevenindo assim a inflamação e proporcionando um efeito calmante.

INDICAÇÃO: Antiulceroso, cicatrizante de queimaduras e ferimentos.

FAIXA DE DOSAGEM USUAL:
Como antiulceroso: 2 – 4g /dia.

Cicatrizante: 2 – 25% em cremes, pomadas ou géis.

Sucralfato foi usado no tratamento de úlcera péptica e gastrite crônica. É dada por via oral e deve ser tomado com o estômago vazio antes das refeições e na hora de dormir. A dose habitual é de 1g quatro vezes ao dia, ou 2g duas vezes ao dia, durante 4 a 8 semanas; se necessário a dose pode ser aumentada até o máximo de 8 g por dia.

Se a terapia for de longo prazo o sucralfato pode ser administrado durante um período de 12 semanas. Se for o caso de uma manutenção a dose de 1g duas vezes por dia pode ser dado para prevenir a recorrência de úlceras duodenais.

Para a profilaxia de hemorragia gastrointestinal de úlceras de stress, a dose usual de sucralfato é de 1g seis vezes ao dia; a dose de 8 g por dia não deve ser excedida.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

INTERAÇÕES: Interfere na absorção de drogas como fenitoína, digoxina, teofilina, cimetidina, quinolonas e anticoagulantes orais.

Por interferir com a absorção de outras drogas sugere-se que deve haver um intervalo de 2 horas entre o sucralfato e as outras medicações não antiácidas.

Para antiácidos o intervalo recomendado é de 30 minutos. E um intervalo de uma hora deve decorrer entre o sucralfato e alimentação enteral.

EFEITOS ADVERSOS: A constipação é o efeito adverso mais frequente, embora diarréia, náuseas, vômitos, flatulência, ou desconforto gástrico também podem ocorrer.

Outros efeitos adversos incluem boca seca, tontura, sonolência, dor de cabeça, vertigem, dor nas costas, erupções cutâneas. Reações de hipersensibilidade tais como prurido, edema, urticária, dificuldade respiratória, rinite, laringoespasmo, e inchaço facial também foram relatados.

Em caso de insuficiência renal pode levar ao acumulo de alumínio (neurotoxicidade).

REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

Texto atualizado em: 10/07/2014

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.