PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

LANETTE® N

INCI: *Cetearyl Alcohol (and) Sodium Cetearyl Sulphate.*
CAS: 67762-27-0 / 68955-20-4

INFORMAÇÕES GERAIS: Lanette® N é uma base aniônica auto- emulsionante adequada para a preparação de cremes e loções cosméticas de óleo-em-água proporciona a obtenção de produtos com alta consistência e brilho.

CARACTERÍSTICAS: É um produto de cor branca a amarela clara, com um odor suave característico, e é fornecido em forma de grânulos.
Este produto possui um valor de pH (1%) de 6,5 - 8,0, é um cetearilsulfato de sódio (PM 360) de 8,7-10,0%, e um valor de hidroxila de 187 - 205.

INDICAÇÃO: Auto-emulsionante para a preparação de cremes e loções cosméticas de óleo-em-água.

FAIXA DE CONCENTRAÇÃO USUAL: 5,0 – 12,0%

SUGESTÃO DE FÓRMULA:

Creme Lanette – 100 g

Fase 1

Lanette® N.....24g
Alcool cetilico.....2,5g
Glicerina.....5g
Nipasol®.....0,15g
Cetiol®.....12g

Fase 2

EDTA dissódico.....0, 15g
Nipagim®.....0,2g
Água deionizada.....qsp 100g

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407

Fase 3
Germall® 115.....0,15g
Água deionizada.....qs (solubilizante)

Fase 4
Ácido cítrico solução a 50%.....qs (acidificante)

Preparação: Aquecer separadamente as fases 1 e 2 a 75 – 80°C. Verter lentamente, com agitação vigorosa e constante, a fase 2 sobre a fase 1. Diminuir a velocidade de agitação para lenta e agitar até a mistura alcançar a temperatura ambiente. Adicionar o Germall previamente solubilizado e homegeneizar completamente. Ajustar o pH entre 4,5 e 5,5 com a solução de ácido cítrico.

INCOMPATIBILIDADES: Devido à sua carga negativa é incompatível com ácidos orgânicos fortes. É uma boa opção para estabilizar formulações que contenham hidroquinona.

REFERÊNCIAS:
Informações exclusivas do fabricante.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

Texto atualizado em: 28/08/2014

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.