Uso: Interno

Fator de Correção: Não se aplica

Fator de Equivalência: Não se aplica

LIPASE
ENZIMA

Descrição
A **Lipase** é uma enzima que cliva hidroliticamente um ânion de ácido graxo de um triglicerídeo ou fosfolipídio, ou seja, é responsável pela quebra e absorção de gorduras nos intestinos. A **Lipase** é uma enzima cuja suplementação pode ser benéfica nos casos de indigestão, doença celíaca, fibrose cística e doença de Crohn.

Recomendação de uso
De 100 a 300mg/dia.
Obs.: Recomenda-se o uso de cápsulas com revestimento entérico, para proteger a **Lipase** da destruição pelo ácido estomacal.

Propriedades
Enzima necessária para a absorção e digestão de nutrientes nos intestinos, responsável pela quebra dos lipídeos, principalmente triglicérides, a **Lipase** permite ao corpo absorver alimentos mais facilmente, mantendo nutrientes em níveis adequados. No corpo humano, a **Lipase** é produzida principalmente no pâncreas, mas também é secretada pela boca e pelo estômago. A maior parte das pessoas produz quantidades suficientes de **Lipase** pancreática. O uso de suplemento de **Lipase** pode ser desejável nos casos de indigestão crônica.
Num estudo que envolveu 18 pessoas, suplementos contendo **Lipase** e outras enzimas pancreáticas demonstraram a capacidade de reduzir timpanismo do estômago ou ceco (bloating), gases e sensação de desconforto após refeição rica em gorduras. Como alguns desses sintomas são associados à síndrome de intestino irritável, algumas pessoas com esta condição podem experimentar melhoras com o uso de enzimas pancreáticas.
Estudos sugerem que a **Lipase** pode ser útil nos casos de doença celíaca, uma condição na qual o glúten proveniente da alimentação causa danos ao trato intestinal. Os sintomas incluem dor abdominal, perda de peso e fadiga. Num estudo com 40 crianças com doença celíaca, aquelas que receberam terapia de enzimas pancreáticas (incluindo a **Lipase**) demonstraram ligeiro ganho de peso, se comparados ao grupo que recebeu placebo.

Aplicações
- ✓ Deficiência em enzimas pancreáticas;
- ✓ Indigestão;
- ✓ Fibrose cística;
- ✓ Doença celíaca, doença de Crohn.

Efeitos adversos
Não há relatos de efeitos adversos com o uso da dosagem sugerida acima.

Interações Medicamentosas
A **Lipase** não deve ser tomada concomitantemente a Cloridrato de Betaína ou Ácido Clorídrico, o que poderia destruir a enzima.
Conversar com o médico se o paciente estiver tomando Orlistat, pois este interfere na atividade dos suplementos de **Lipase**, bloqueando sua capacidade de quebrar gorduras.

Referências Bibliográficas

1. Batistuzzo, J. A. O. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo: Tecnopress, 2002.
2. Dicionário Médico Ilustrado Dorland, 28ª edição, pág. 985.
3. National Enzyme Company's Declaration of Enzyme Units, Forsyth, Missouri, EUA.
4. http://www.healthandage.com/html/res/com/ConsSupplements/Lipasecs.html.