USO: Interno

Fator de Correção: De acordo com o teor do laudo.

Fator de Equivalência: Não se aplica.

CAS: 79794-75-5

FM: C22H23CIN2O2

PM: 382,89

DCB: 05416

LORATADINA
ANTI-HISTAMÍNICO

Loratadina propicia alívio dos sintomas associados à rinite alérgica e ao resfriado comum. Propicia também alívio de sinais e sintomas de urticária e outras afecções dermatológicas alérgicas.

Recomendação de uso
Adultos e Crianças 6 a 12 anos: 10 mg 1x/dia, via oral.
Dose usual - Crianças 2 a 5 anos: 5 mg 1 x/dia, via oral (comprimido e xarope).

Aplicações
- ✓ Alívio dos sintomas associados com rinite alérgica tais como: coriza, espirros e prurido nasal, ardor e prurido ocular. Os sinais e sintomas oculares e nasais são rapidamente aliviados após administração oral do produto.
- ✓ Alívio dos sinais e sintomas de urticária e outras afecções dermatológicas alérgicas.

Mecanismo de ação
Loratadina é um anti-histamínico tricíclico potente, de ação prolongada, com atividade seletiva, antagônica, nos receptores H_1 periféricos. **Loratadina** é rapidamente absorvida no tubo digestivo, após a ingestão oral. As concentrações plasmáticas máximas são atingidas em 1 hora, e sua meia vida é de 17 a 24 horas. A **Loratadina** é metabolizada no fígado, de forma intensa, em descarboetoxiloratadina, que é ativo. Sua ligação a proteínas plasmáticas é de 97 a 99%, e a do metabólito ativo é de 73 a 76%.

Contra indicações
Loratadina está contra-indicado em pacientes que tenham demonstrado hipersensibilidade ou idiossincrasia a seus componentes.

Reações adversas
Loratadina não apresenta propriedades sedativas clinicamente significantes quando utilizado na dose recomendada de 10 mg diárias. As reações adversas reportadas comumente incluem fadiga, cefaléia, sonolência, boca seca, transtornos gastrintestinais, tais como náusea e gastrite e também manifestações alérgicas cutâneas (exantema ou rash).

Precauções
A segurança e eficácia de **Loratadina** em crianças abaixo de 2 anos ainda não foi estabelecida.
Pacientes com hepatopatia grave devem iniciar o tratamento com doses baixas de **Loratadina**, uma vez que eles podem ter uma depuração reduzida de **Loratadina**; uma dose inicial de 5 mL (5mg) diários ou de 10 mL (10 mg) em dias alternados é recomendada.
O tratamento com **Loratadina** xarope para pacientes diabéticos deve ser avaliado pelo médico, visto que a quantidade de sacarose presente em 5 mL (5mg) de **Loratadina** xarope é de 3 g.
Não está estabelecido se o uso de **Loratadina** pode acarretar riscos durante a gravidez ou lactação. Portanto, o medicamento só deverá ser utilizado se os benefícios potenciais para a mãe justificarem o risco potencial para o feto.

Considerando que a **Loratadina** é excretada no leite materno e devido ao aumento de risco do uso de anti-histamínicos por crianças, particularmente por recém nascidos e prematuros, deve-se optar ou pela descontinuação da lactação ou pela interrupção do uso do produto.

Referência Bibliográfica

1. Dicionário de especialidades farmacêuticas, 2016.

Ultima atualização: 17/01/2017 BP.