Informe Científico
Hemaline®
Redutor rápido para olheiras
Now for facial
Patches

Hemaline®

Redutor rápido para olheiras

OLHEIRAS

A hiperpigmentação periorbital, também popularmente conhecida como olheiras é uma hipercromia da região periocular observada principalmente em mulheres. As olheiras são caracterizadas pela alteração na coloração da região dos olhos que ocorre devido a um aumento de melanina, ferro, alterações vasculares, stress e insônia.

ALTERAÇÕES VASCULARES X OLHEIRA

A pele presente na região dos olhos é muito sensível e por isso qualquer pequena alteração nesse microambiente pode resultar no aparecimento das olheiras. O principal fator relacionado com a hiperpigmentação é uma frágil microcirculação sanguínea, isto é, ocorrendo lise de pequenos vasos que ocasiona rompimento das células sanguíneas.

As células sanguíneas (eritrócitos) contêm grande quantidade de hemoglobina e ferro. Estas substâncias são liberadas com a quebra do eritrócito e necessitam ser degradas. Quando o mecanismo de limpeza do ferro e da hemoglobina não é efetivo, ocorre à pigmentação violeta-esverdeada causada pela biliverdina, marrom-alaranjada causada pela bilirrubina e ferro, e a cor violeta causada pela hemosiderina. O depósito permanente dessas substâncias resulta na formação das olheiras.

HEMALINE® X OLHEIRA

Hemaline® é um complexo balanceado de ativos desenvolvidos para o tratamento das olheiras. Age de forma direta visando:
- Diminuir a pigmentação local;
- Aumentando a sustentação da pele para que haja uma microcirculação efetiva.

COMPLEXO ATIVO DO HEMALINE®

Hemaline® é composto de quatro substâncias ativas no tratamento das olheiras: N hidroxisuccinamida (NHS), Crisina, Palmioil-Gli-His-Lis (PAL-GHK) e o Palmitoil-Gli-Gln-Pro-Arg (PALQPR).

MECANISMO DE AÇÃO DO HEMALINE®

ANTIBILIRRUBINA E FERRO:

O ativo Crisina é um flavonóide que é comum nas plantas “kingdom”. Esta substância ativa a eliminação local (via cutânea) da bilirrubina (GALIJATOVIC A et al, 2001). As enzimas ativadas pela Crisina são conhecidas como gluconosiltransferase ou UGT, e estão presentes principalmente no fígado, mas também estão presentes em outros órgãos como a pele (presentes nos fibroblastos e queratinócitos) (PHAM MA et al, 1990 VECCHINI et al, 1995).

Estas enzimas são caracterizadas por agir como agentes desintoxicadores, isto é, eliminam compostos resultantes de degradação dos eritrócitos, como, por exemplo, a bilirrubina e outros pigmentos.

O aumento da concentração local destas enzimas potencializa a eliminação dos pigmentos presentes das olheiras. A N-hidroxisuccinamida (NHS) atua na remoção do ferro presente no local de lise dos eritrócitos. Este ativo se liga ao ferro neutralizando-o (VOGEL A, 1978).

MELHORA A ESTRUTURA DA PELE

Os peptídeos conhecidos como Palmitoil-Gli-His-Lis (PAL-GHK) e o Palmitoil-Gli-Gln-Pro-Arg (PAL-QPR) atuam diminuindo a fragilidade da pele ao redor dos olhos para que haja uma microcirculação sanguínea estável (MAQUART et al, 1990). Atuam estimulando a síntese de colágeno e elastina que resulta em aumento na sustentação, tônus, bem como a sua aparência.

Hemaline®

ULTRA NOVIDADE PARA OLHEIRAS

MECANISMO DE AÇÃO

BENEFÍCIOS

- Redutor rápido para olheiras
- Promove a sustentação dérmica

CARACTERÍSTICAS

- Hemaline® é rico em crisina, sequestrador de ferro, que atua no clareamento das olheiras.
- Hemaline® é composto por Polipeptídeos que fortalecem os vasos sanguíneos, prevenindo a lise de pequenos vasos, evitando o surgimento de novas olheiras.

INFORMAÇÃO FARMACOTÉCNICA

- Concentração usual até 2%;
- Solúvel em água;
- O pH final de estabilidade é de 5,5 e 6,0.

Hemaline®

Redutor rápido para olheiras

EFICÁCIA DO HEMALINE®

A eficácia do Hemaline® é comprovada por estudos que demonstram a atividade das substâncias ativas presentes no produto. Esses estudos foram realizados em conceituadas instituições internacionais que respaldam a qualidade e veracidade dos efeitos benéficos oriundos do Hemaline®.

INDICAÇÃO DE APLICAÇÃO

- Patches cosméticos
- Emulsões e géis para o tratamento de olheiras;
- Corretivos;
- Produtos eyes care.

SUGESTÃO DE DOSAGEM

- 2%.

SUGESTÕES DE FORMULAÇÃO

Gel Transparente Anti-Olheiras

Hemaline®	2%
Transkin™	0,1%
Gel	20ml

Gel Creme Anti-Olheiras com Vit. C estabilizada

Hemaline®	2%
Stabyl C®	2%
Transkin™	0,1%
Creme Gel	20ml

Gel Creme Anti-Olheiras FPS 15

Hemaline®	2%
Stabyl UV®	10%
Creme Gel	20ml

Patches Anti-Olheiras "NOVA"

Hemaline®	2%
Transkin™	1%
Excipiente qsp	1 patche

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Galijatovic A, Otake Y, Walle UK, Walle T. Induction of UDPglucuronosyltransferase UGT1A1 by the flavonoid chrysin in Caco-2 cells-- potential role in carcinogen bioinactivation. Pharm Res. 2001 Mar;18(3):374-9.
- Huang YH, Galijatovic A, Nguyen N, Geske D, Beaton D, Green J, Green M, Peters WH, Tukey RH. Identification and functional characterization of UDPglucuronosyltransferases UGT1A8*1, UGT1A8*2 and UGT1A8*3. Pharmacogenetics. 2002 Jun;12(4):287 97.
- Walle T, Otake Y, Galijatovic A, Ritter JK, Walle UK.Induction of UDPglucuronosyltransferase UGT1A1 by the flavonoid chrysin in the human hepatoma cell line hep G2. Drug Metab Dispos. 2000 Sep;28(9):1077-82.
- Galijatovic A, Walle UK, Walle T. Induction of UDP-glucuronosyltransferase by the flavonoids chrysin and quercetin in Caco-2 cells. Pharm Res. 2000 Jan;17(1):21-6.
- Galijatovic A, Otake Y, Walle UK, Walle T. Extensive metabolism of the flavonoid chrysin by human Caco-2 and Hep G2 cells. Xenobiotica. 1999 Dec;29(12):1241- 56.
- Walle UK, Galijatovic A, Walle T. Transport of the flavonoid chrysin and its conjugated metabolites by the human intestinal cell line Caco-2. Biochem Pharmacol. 1999 Aug 1;58(3):431-8.
- Pham MA, Magdalou J, Siest G, Lenoir MC, Bernard BA, Jamoulle JC, Shroot B. Reconstituted epidermis: a novel model for the study of drug metabolism in human epidermis. J Invest Dermatol. 1990 Jun;94(6):749-52.
- Pham MA, Magdalou J, Totis M, Fournel-Gigleux S, Siest G, Hammock BD. Characterization of distinct forms of cytochromes P-450, epoxide metabolizing enzymes and UDP-glucuronosyltransferases in rat skin. Biochem Pharmacol.
1989 Jul 1;38(13):2187-94.
- Vecchini F, Mace K, Magdalou J, Mahe Y, Bernard BA, Shroot B. Constitutive and inducible expression of drug metabolizing enzymes in cultured human keratinocytes. Br J Dermatol. 1995 Jan;132(1):14-21.
- Vogel A, Raines E, Kariya B, Rivest MJ, Ross R. Coordinate control of 3T3 cell proliferation by platelet-derived growth factor and plasma components. Proc Natl Acad Sci U S A. 1978 Jun;75(6):2810-4.
- Maquart FX, Bellon G, Pasco S, Monboisse JC.Matrikines in the regulation of extracellular matrix degradation. Biochimie. 2005 Mar-Apr;87(3-4):353-60.
- Maquart FX, Simeon A, Pasco S, Monboisse JC. [Regulation of cell activity by the extracellular matrix: the concept of matrikines]J Soc Biol. 1999;193(4-5):423-8.
- Maquart FX, Bellon G, Gillery P, Wegrowski Y, Borel JP. Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by a triterpene extracted from Centella asiatica. Connect Tissue Res. 1990;24(2):107-20.

LABORATÓRIOS ATTIVOS MAGISTTRAIS®

MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL.
*Utilização da marca e do logotipo Hemaline® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.
Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o setor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas foram elaboradas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes, estando o Grupo LATTM eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magisttrais ou produtos finais. Lembrando que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações, técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser atingido sejam observadas, não cabendo ao Grupo LATTM nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade do Grupo LATTM, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 3995 5133. *Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes de Grupo LATTM.