Theophyllisilane C®

Contorno e firmeza corporal com alta atividade lipolítica com vetorização do silanol

EXSYMOL MONACO

BIOTEC

09/2020

Theophyllisilane C®

Teofilina e ácido algínico vetorizados pelo Silanol

INCI Name: *Methylsilanol Carboxymethyl Theophylline Alginate.*

- Contorno corporal (lipolítico, anticelulite)
- Firmeza corporal e facial
- Bolsas sob os olhos (inchaço)
- Hidratação corporal e facial

ORIGEM

Theophyllisilane C® é um Silanol obtido por condensação de um derivado de silício sobre a teofilina e o ácido algínico. O derivado de silício e a teofilina são obtidos por síntese, não sendo utilizado nenhum derivado de origem animal. O ácido algínico é obtido após a extração de algas marrons, nenhum derivado de origem animal. Todos os Silanois são dotados de atividades biológicas específicas. **Theophyllisilane C®** foi especialmente desenvolvido para promover lipólise.

Theophyllisilane C® tem uma atividade lipolítica notável. Esta atividade está diretamente ligada ao conteúdo de silício; o teor de glicerol liberado aumenta com o teor de silício.

Após o tratamento do tecido adiposo com **Theophyllisilane C®**, a concentração cíclica intracelular de cAMP aumenta significativamente.

A atividade lipolítica obtida com **Theophyllisilane C®**, comparada com os resultados obtidos com inibidores da fosfodiesterase, pode não estar apenas ligada a esse aumento da concentração de cAMP.

A hipótese de uma ação estimulante no cAMP é avançada. Isso pode ser devido ao silício. A atividade lipolítica pode ser a resposta a uma ativação do sistema de membrana levando à formação de adenilato ciclase. Assim como à síntese de cAMP que ativa, por uma série de reações, a lipase hormonossensível.

cAMP e Lipólise



ATIVIDADE DE EMAGRECIMENTO

Theophyllisilane C® e **Algisium C®** foram testados quanto à produção de glicerol devido à sua atividade na adenilato ciclase promovendo lipólise.

Estudo *in vitro* (**EXSYMOL**) demonstrou que a atividade lipolítica induzida por **Theophyllisilane C®** foi maior que a atividade lipolítica de **Algisium C®** e **Teofilina**.

Essa atividade de emagrecimento acompanha a regeneração do tecido conjuntivo circundante, levando a uma melhor microcirculação que normaliza as trocas celulares e melhora o aspecto da pele.

RESULTADOS DE THEOPHYLLISILANE C® E ALGISIUM C® PARA PRODUÇÃO DE GLICEROL



ESBOÇO SIMPLIFICADO DOS MECANISMOS DE LIPÓLISE



TESTE CLÍNICO: ATIVIDADE DO THEOPHYLLISILANE C® EM SOBRECARGAS LIPÍDICAS

25 voluntários com diferentes tipos de celulite foram selecionados para este estudo. Após duas aplicações por dia durante 30 dias, os centímetros perdidos foram medidos para cintura, quadris, coxas e joelhos. Os resultados avaliados na perda de centímetros estão resumidos nos gráficos abaixo:

Resultados:
centímetros perdidos em torno da cintura

Resultados: centímetros perdidos em torno dos quadris



Resultados: centímetros perdidos em torno das coxas



Resultados: centímetros perdidos ao redor dos joelhos



THEOPHYLLISILANE C® APRESENTA EFEITOS NOTÁVEIS EM:

- Lipólise nos adipócitos, o que confirma os resultados da experiência em adipócitos *in vitro*.
- A troficidade e degeneração dos proteoglicanos ou mucopolissacarídeos ácidos nas fibras elásticas e no colágeno.
- Na permeabilidade tecidual e, portanto, na reabsorção do edema local.

EFEITOS DA TEOFILINA NA LIPASE LIPOPROTEÍNA

Theophyllisilane C® é obtido a partir da teofilina. De fato, este composto inibe as fosfodiesterases e aumenta a concentração de cAMP nas células. A aplicação cosmética dessa atividade farmacológica é a lipólise dependente de cAMP. No que diz respeito à sua atividade no metabolismo dos ácidos graxos, a teofilina inibe a lipoproteína lipase (LPL). A inibição da LPL pela teofilina foi estudada *in vitro*. O gráfico à esquerda mostra o nível de atividade da lipoproteína lipase, dependendo da concentração de teofilina (**Theophyllisilane C®** é obtido a partir de 0,87% de teofilina).

Como outros compostos da mesma família (derivados de cafeína e teofilina), os resultados mostram que a teofilina inibe a atividade da LPL de maneira dependente da dose.



ESPECIFICAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

INCI Name:	*Methylsilanol Carboxymethyl Theophylline Alginate.*
Aparência:	Líquido límpido a opalescente
Cor:	Incolor a amarelo claro
Odor:	Característico
Concentração Usual:	3 a 6%
pH:	4,5 a 6,5

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Comen Eduardo Saccab, 215 - Sala 408
CEP 04601-070 - Brooklin Paulista - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2457 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br