# SUPOBASE® L15

## Supositórios e Óvulos: Tecnologia Tradicional com Aplicações Modernas

BIOTEC

Literatura

# **Supositórios e Óvulos:** Tecnologia Tradicional com Aplicações Modernas

Apesar de muitos considerarem a via retal ou vaginal como alternativa, o uso de supositórios e óvulos tem ganhado espaço novamente na prática clínica, especialmente em contextos em que se busca:

- Evitar o metabolismo hepático de primeira passagem;
- Melhorar a biodisponibilidade de ativos lipofílicos;
- Promover ação local com rápida absorção;
- Facilitar o uso em pacientes com restrições gastrointestinais ou dificuldade de deglutição.

Além disso, há um crescente interesse da área ginecológica e funcional na prescrição de óvulos personalizados, que atuam tanto em tratamentos clássicos, como candidíase e vaginose, quanto em cuidados de saúde íntima, reposição da microbiota vaginal e regeneração da mucosa.

A Supobase® L15 surge como uma solução farmacotécnica segura, moderna e eficaz para atender a essa demanda, unindo naturalidade, estabilidade e facilidade de manipulação em uma única base.

## SUPOBASE® L15 - BASE FARMACOTÉCNICA VERSÁTIL E ESTÁVEL

Natural de triglicerídeos de ácidos graxos, Supobase® L15 foi desenvolvida para substituir a manteiga de cacau com melhor desempenho farmacotécnico e sensorial.

**POR QUE UTILIZAR SUPOBASE® L15?**

- Origem natural: derivada de óleos vegetais (coco, babaçu, palma e soja);
- Estável à oxidação: baixo índice de iodo;
- Versátil: indicada para supositórios, óvulos, *wax melts* e fórmulas *stick*;
- Excelente liberação de ativos: controlada por seu índice de hidroxila;
- Não precisa de refrigeração.

| INDICAÇÃO | FÓRMULA SUGERIDA |
|---|---|
| Candidíase | Clotrimazol 500 mg + Nistatina 100.000 UI + Supobase® L15 qsp. 5 g. |
| Hidratação Vaginal | Hyaxel® 5% + Supobase® L15 40% + Polygreen Coconut Oil qsp. 5 g. |
| Hemorroidas | Acetato de Hidrocortisona 5 mg/g + Lidocaína 20 mg/g + Supobase® L15 qsp. 3 g. |
| Saúde Vaginal | Lactobacillus acidophilus 1 bilhão + Supobase® L15 qsp. 5 g. |
| Prisão de Ventre | Glicerina 1 g + Supobase® L15 qsp. 5 g. |
| Higiene Íntima com Ácido Bórico | Ácido Bórico 600 mg + Supobase® L15 qsp. 5 g. |

**FARMACOTÉCNICA:**

- Aquecer a base entre 45 e 50 °C;
- Incorporar o ativo;
- Verter nas forminhas;
- Deixar resfriar à temperatura ambiente até solidificar.

**INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESSENCIAIS:**

- Evite o uso de tinturas em alta concentração (acima de 10%);
- Para incorporar tinturas à Supobase® L15, adicione 1% de Lecigel® pó sobre a tintura, aguarde 15 minutos e misture. Em seguida, incorpore o gel formado à base;
- Para melhorar a maciez de formulações que apresentam fragilidade ou tendência à quebra, recomenda-se a adição de até 10% de Polygreen Coconut Oil ou Agreen Cotton Seed Oil;
- Não utilize refrigeração artificial. O resfriamento deve ser realizado em temperatura ambiente, para garantir a integridade da base;
- A Supobase® L15 não deve ser utilizada concomitantemente com preservativos de látex, especialmente em formulações de uso vaginal, pois compostos oleosos/lipofílicos, como glicerídeos e óleos vegetais, podem degradar o látex natural, causando perda de elasticidade e risco de ruptura.

| PARÂMETRO | VALOR |
|---|---|
| INCI Name | *Glyceryl Stearate (and) Glyceryl Palmitate (and) Glyceryl Laurate (and) Glyceryl Myristate* |
| Aspecto (25 °C) | Massa cerosa |
| Cor | Branca a levemente amarelada |
| Índice de Acidez | 0,0 – 0,5 mg KOH/g |
| Índice de Hidroxila | 20 – 30 mg KOH/g |
| Índice de Iodo | 0 – 2 g I/100 g |
| Índice de Saponificação | 225 – 240 mg KOH/g |
| Ponto de Solidificação | 30,5 – 32,5 °C |
| Ponto de Fusão (Aberto) | 34 – 36 °C |
| Índice de Peróxido | 0 – 3 mEq/kg |
| Solubilidade em Tolueno | Límpida a incolor |

## ATIVOS COMUMENTE MANIPULADOS EM ÓVULOS E SUPOSITÓRIOS:

| ÓVULOS VAGINAIS | |
|---|---|
| **ANTIFÚNGICOS E ANTIBACTERIANOS** | • Clotrimazol – Candidíase Vaginal<br>• Nistatina – Candidíase Recorrente<br>• Ácido Bórico – Vaginose Bacteriana e Infecções Fúngicas Resistentes |
| **REGENERADORES E HIDRATANTES** | • Hyaxel® (Ácido Hialurônico) – Hidratação e Regeneração da Mucosa<br>• Ácido Lático – Reequilíbrio do pH Vaginal<br>• Vitamina E (Acetato de Tocoferol) – Ação Antioxidante e Regenerador |
| **PROBIÓTICOS** | • *Lactobacillus acidophilus* – Recolonização da Flora Vaginal<br>*Lactobacillus crispatus* - Manutenção da Saúde Vaginal, Preservando o Equilíbrio das Populações Bacterianas da Flora Vaginal e o pH Adequado<br>• *Lactobacillus gasseri* - Melhorar o Ambiente Vaginal |
| **HORMÔNIOS** | • Estriol – Atrofia Vaginal (Com Prescrição) |

| SUPOSITÓRIOS RETAIS | |
|---|---|
| **ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANALGÉSICOS** | • Diclofenaco Sódico – Dor e Inflamação<br>• Dipirona – Dor e Febre (Uso Pediátrico)<br>• Paracetamol – Uso Pediátrico e em Pacientes Com Náuseas |
| **ANESTÉSICOS E CORTICOIDES** | • Lidocaína – Alívio da Dor Local (Hemorroidas)<br>• Acetato de Hidrocortisona – Inflamações Anais |
| **VASOCONSTRITORES E CICATRIZANTES** | • Subgalato de Bismuto – Cicatrização de Lesões<br>• Hamamélis – Ação Adstringente Natural |

BIOTEC

@biotecmagistral
biotecmagistral
+55 (11) 3047-2447

www.biotecdermo.com.br
info@biotecdermo.com.br
0800 770 6160