Revisão 1
Emissão: 02/01/2012

XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

Estimula A Lipólise

1

2

Promove a Redução de Medidas

3

Confere Ação Anti-celulite Intensa

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL | EXSYMOL

XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

Estudo da atividade do XANTALGOSIL C® sobre a lipodistrofia localizada

Os indivíduos selecionados não apresentam sobrecargas ponderadas e sim formação de celulite em diversas partes do corpo (quadril, coxas, joelho e braços).

Gel de Carbopol com 6% de XANTALGOSIL C®

9 pacientes durante 30 dias.
15 pacientes durante 60 dias.

2 aplicações por dia sem massagem.



Redução Volumétrica das Zonas Observadas

	T_0	$T_{30\ dias}$	$T_{60\ dias}$
Cintura	Variação	-3,5 cm	-5,5 cm
Coxas	Variação	-2,5 cm	-5 cm
Quadril	Variação	-3,5 cm	-5,5 cm
Joelhos	Variação	-0,8 cm	-1,5 cm

Efeitos do Tratamento:

- ! Redução do Aspecto de "Casca de Laranja"
- ! Pele Mais Firme
- ! Redução dos Estados Inflamatórios
- ! Melhora na Micro-Circulação

Conclusão:

O XANTALGOSIL C® é muito eficaz sobre todos os tipos de lipodistrofia, mesmo aquelas sobre regiões mais esclerosadas. Os excelentes resultados obtidos são provenientes da ação sinérgica da base xântica com a molécula do silício biologicamente ativo sobre o AMP cíclico. A ação reestruturante do silício é também conjugada a ativação da lipólise pelo AMP cíclico.

Estudo realizado na Faculdade de Ginecologia de Bordeaux na França sob a supervisão do Dr. Levrier

XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

Definição:

O XANTALGOSIL C® é um silanol (silício biologicamente ativo). Os silanóis são derivados de silício orgânico, hidrossolúveis, com várias funções hidroxílicas e obtidos por um processo original e patenteado através da reação com vários radicais, especialmente selecionados para conferir uma ação específica ao composto.

Os silanóis possuem atividades biológicas particulares e algumas propriedades são maximizadas pela natureza dos radicais. No caso do XANTALGOSIL C® os principais radicais são acefilina e ácido algínico.

I.N.C.I.:
Acefylline Methylsilanol Mannuronate

C.A.S.:
162030-43-5

Usos

- **CORPO**
  Ação Lipolítica & Anti-Celulite
- **CORPO E ROSTO**
  Firmeza da Pele
- **CONTORNO DOS OLHOS**
  Ação Anti-bolsas & Inchaço

Ação Lipolítica:

O XANTALGOSIL C® possui uma excelente ação lipolítica. Esta atividade está diretamente ligada a presença da molécula de silício biologicamente ativo.

Após a aplicação do XANTALGOSIL C® no tecido adiposo observou-se um aumento significativo do AMP cíclico intracelular. O resultado da atividade lipolítica com o XANTALGOSIL C® é superior a dos outros inibidores da fosfodiestearase, não podendo portanto ser relacionada somente com o aumento da concentração de AMPc.



AMPc e Lipólise

A hipótese de ação estimulante do AMPc está bastante evoluida e pode ser devido ao silício. A atividade lipolítica poderia ser a resposta para uma ativação do sistema membranário, conduzindo a formação de adenilato ciclase, a qual ativa então a síntese de AMPc por uma série de reações, hormônio sensitivas a lipase.

Esquema Ilustrativo do Mecanismo da Lipólise



XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

Atividade Anti-celulite

O XANTALGOSIL C® e o Algisium C® foram testados para verificar sua atividade sobre a adenilato ciclase, promovendo assim a lipólise. Estudos in vitro comprovam que a atividade lipolítica induzida pelo XANTALGOSIL C® é superior ao Algisium C® e ao uso de outra xantina bastante conhecida, a teofilina.

O XANTALGOSIL C® possui ainda uma ação regeneradora do tecido conjuntivo, melhorando a micro-circulação sanguinea e a aparência da pele.

Resultados sobre a Produção de Glicerol Livre



Produção de glicerol do tecido adiposo humano com XANTALGOSIL C® significativo +/- S.E.M.

Testes clínicos:
atividade do XANTALGOSIL C® na sobrecarga lipídica

Protocolo: 25 voluntárias com diferentes índices de celulite e adiposidades foram selecionadas para este estudo. Após a aplicação diária de um produto 2x ao dia durante 30 dias, foram medidos os centímetros perdidos na cintura, quadris, coxas e joelhos.

Os resultados avaliados na redução de medidas estão resumidos nos gráficos abaixo:



Ação da acefilina sobre a lipoproteína lipase

XANTALGOSIL C® é obtido a partir da acefilina. Este componente é bastante conhecido por sua ação inibitória sobre a fosfodiesterase e aumento da concentração de AMPc nas células. A aplicação cosmética desta atividade farmacológica é a lipólise AMPc-dependente. A respeito desta atividade sobre o metabolismo dos ácidos graxos, a acefilina inibe a lipoproteína lípase (LPL). A inibição da LPL pela acefilina foi estudada in vitro. O gráfico demonstra o nível da atividade da lipoproteína lípase dependendo da concentração da acefilina.

Assim como os outros componentes da mesma família (cafeína e teofilina), os resultados demonstram que a acefilina inibe a atividade da LPL de uma maneira dose-dependente.



Atividade da Lipoproteína Lípase

XANTALGOSIL C® possui uma ação notável sobre :

+ Lipólise nos adipócitos, confirmando assim os resultados obtidos pelos estudos in vitro.
+ Troficidade e degeneração dos proteoglicanos e mucopolissacarídios ácidos nas fibras elásticas e colagênicas.
+ Permeabilidade tissular e conseqüentemente a reabsorção dos edemas.

XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

Condições de Uso

Ativo destinado a fabricação industrial de produtos cosméticos, tais como, emulsões, cremes, loções, géis e soluções.

A estabilidade do XANTALGOSIL C® e sua atividade, estão relacionadas ao seu pH, que deve ser respeitado. Produtos acabados formulados com XANTALGOSIL C®, devem ter um pH compreendido entre 3,5 a 6,5.

XANTALGOSIL C® não deve ser exposto a temperaturas inferiores a 0°C. Apresenta precipitações quando associado a álcoois concentrados.

Especificações

Aparência	: líquido lev. opalescente
Cor	: Incolor lev. amarelada
p.H 100%	: 4.5 - 6.5
% de Conservantes	: 0.13 - 0.19
Microbiologia - Germes	: < 100 p/ml
Microbiologia - Leveduras	: < 1 p/ml
Microbiologia - Fungos	: < 1 p/ml
% Silício	: 0.90 -1.10
% de Acefylline	: 0.75 - 0.95

Miscível em água em temperatura ambiente.

Toxicidade

XANTALGOSIL C® não é tóxico ou irritante. Genotoxicidade negativa (SOS Chromotest Kit).

Apresenta perfeita tolerância: irritação ocular, testes de toxicidade agudo e subagudo, testes de fototoxicidade.

Produzido por:
EXSYMOL S.A.M.
4 avenue du Prince Héréditaire Albert - MC 98000 MONACO
Tél: +377 92 05 66 77 - Fax: +377 92 05 25 02
e-mail: exsymol@esxymol.com - site: www.exsymol.com

XANTALGOSIL C®

Acefylline Methylsilanol Mannuronate

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL

EXSYMOL

AQIA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
Fábrica: R. Rosa Mafei, 563 - Bonsucesso Cep: 07177-110 - Guarulhos/SP - Tel.: 55 11 2436 3133
Escritório: Av. Vereador José Diniz, 3651 - 7° andar
Cep: 04603-003 - Campo Belo - São Paulo/SP
Tel.: 55 11 5094 9911
WWW.AQIA.NET