CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 100%

ANESTÉSICO LOCAL

Grau: Farmacêutico (X) Alimentício ( ) Cosmético( ) Reagente P.A. ( )

Uso: Interno ( ) Externo (X)

PM:300,8g/mol **FM:** $C_{15}H_{25}CLN_2O_2$

Introdução

Os anestésicos locais entraram em uso clínico há mais de 100 anos para o controle da dor, atualmente continuam sendo importantes para anestesia local e regional, devido suas ações cardíacas antiarrítmicas. O uso primário das drogas anestésica locais é para o bloqueio de nervos locais ou regionais, a exemplo de procedimentos odontológicos e cirurgias oculares. Alguns anestésicos locais em baixas concentrações possuem propriedade vasodilatadora, o que aumenta sua absorção sistêmica. Por isso a indústria farmacêutica investe em preparações que minimizem esse efeito através da adição de um vasoconstritor.

Propriedades

O **Cloridrato de Tetracaína (CT)**, é um anestésico local de longa duração, com alta eficácia a partir de uma baixa dose terapêutica. Ele causa o bloqueio do impulso nervoso culminando na interrupção temporal da sensação em partes específicas do corpo.



Fórmula estrutural do **cloridrato de tetracaína,** adaptada de: farmacopeia brasileira 6° edição, 2019.

Mecanismo de ação

O **Cloridrato de Tetracaína** age bloqueado os canais de sódio nas membranas das células nervosas, impedindo a condução de impulsos nervosos, e assim, proporcionando anestesia local.

Geralmente o início da ação anestésica é rápida, iniciando após alguns minutos depois da aplicação, com uma duração de 1 a 3 horas, a depender da concentração e local de aplicação.

Indicações

O Cloridrato de Tetracaína devido seus efeitos, é indicado para uso tópico e oftálmico, atuando como anestésico local.

Posologia

De acordo com a FDA (Food and Drug Admnistration), o **Cloridrato de Tetracaína** pode ser utilizado na concentração de 0,5% para soluções oftálmicas. Aplicado em procedimentos que requerem um anestésico oftálmico de ação rápida e de curta duração.

Segundo o Manual de Anestesia Local, desenvolvido por Melamed e colaboradores, o **Cloridrato de Tetracaína** pode ser utilizado em aplicações tópicas numa concentração de 2%.

Precaução

- Não recomendado uso durante a gravidez e lactação.
- Não utilizar o produto em casos de: alergia à anestésico tipo éster, ácido para-aminobenzóico ou seus derivados e infecção no local de aplicação.
- Avaliar os riscos e benefícios em casos de: paciente idoso ou debilitado; doença hepática; deficiência de colinesterase; miastenia grave; choque agudo; diminuição da condução cardíaca; infecção na pele; doença cardíaca; hipertireoidismo ou outra doença endócrina; durante o trabalho de parto (mudanças na contratilidade uterina).

Referências Bibliográficas

1. BRUNTON, L., et al; The Pharmacological Basis of Therapeutics. Goodman & Gilman's 13th edition, 2017.
2. CAETANO, N., et al; BPR - Guia de Remédios, 13° edição. Porto Alegre: Artmed, 2016.
3. HU, Shipeng., et al; Effect of Tetracaine on Dynamic Reorganization of Lipid Membranes. Elsevier, 2020.
4. FDA – Food and Drugs Administration. Clinical Review, 2016.
5. FOZZARD, H., et al; The Sodium Channel as Target for Local Anesthetic Drugs. Frontiers in Pharmacology, vol.2, artigo 68, 2011.
6. MALAMED, S., et al. Manual de Anestesia Local. Elsevier, 6° Edición, 2013.
7. SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA. Tutorial de Anestesia da Semana - Farmacologia dos Anestésicos Locais.

Atualizações: 14/06/2024 PLS