BEAUTIFIQUÉ

INCI Name: Linoleic acid

É extraído da uva Chardonnay, cultivada na região de Bourgogne, na França. É obtido através de um exclusivo processo de hidrólise enzimática que confere proteção e integridade aos seus componentes. Dessa forma, existe a garantia que o **Beautifiqué®** irá agir na pele, restaurando o conteúdo lipídico, estimulando a síntese de colágeno e reduzindo o estresse oxidativo.

COMPOSIÇÃO FITOQUÍMICA

- 70% de Ácido Linoleico;
- 12% de Ácido Oleico;
- 18% de Tocoferol e Tocotrienol;

PRINCIPAIS PROPRIEDADES

- Ação anti-inflamatória nas patologias da pele;
- Restaura a barreira cutânea;
- Restaura e previne a deficiência de cerâmidas;
- Ação anti-acne e antimicrobiana;
- Auxilia na cicatrização de feridas pós cirurgia plástica;
- Previne e trata estrias;
- Previne e trata rugas;
- Auxilia nos processos de nutrição da pele retardando o envelhecimento cutâneo;
- Aumenta a permeação e a potência de outros ingredientes na pele;

Concentração usual: 4,00-100%

A deficiência de colágeno está associada a diminuição da espessura do fio capilar, com a desidratação e perda de elasticidade da pele, culminando em flacidez e aparecimento de rugas e estrias. O **Beautifiqué®**, devido aos seus componentes, aumenta a síntese de pró colágeno, o que promove o aumento da espessura e a melhora da firmeza da pele, tratando e prevenindo o aparecimento de rugas e estrias.

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DOS ÔMEGAS NA PELE

Um estudo publicado no Jornal Of Lipid Research avaliou os efeitos dos ômegas em peles danificadas pela radiação UV e pelo envelhecimento intrínseco, através de sua aplicação tópica (KIM et al., 2006).

RESULTADOS:

Foi comprovado que a aplicação tópica de ômegas aumenta os níveis de pró colágeno de maneira significativa, quando comparada com o tratamento placebo, a aplicação tópica gerou aumento da marcação de pró colágeno por toda a derme, bem como um aumento na densidade da matriz extracelular, como evidenciado na figura 1.

De acordo com análises por Western Blot, a aplicação tópica de ômegas gerou aumento de 218 ±39% na expressão de pró colágeno, como também evidenciado aumento na quantidade de fibras de colágeno (KIM et al., 2006).

A aplicação tópica de ômegas promove aumento da síntese de MEC (matriz extracelular), através do estímulo de diversos componentes relacionados, como os fatores de crescimento TGF β1, TGF-β2 e TGF-β3. Além de aumentar a síntese de colágeno, o **Beautifiqué®** promove a síntese de todos os componentes da MEC (matriz extracelular), auxiliando na prevenção e tratamento de rugas e estriais.

Devido ao aumento de TGF β1, β2 e β3, **Beautifiqué®** atua na cicatrização de feridas pós cirurgia plástica. O TGF regula a proliferação, diferenciação e migração celular. A migração celular é um evento limitante na cicatrização de feridas cutâneas. Na pele sem ferimentos, as células são nutridas pelo plasma. Quando há a presença de algum ferimento as células residentes se deparam com o soro pela primeira vez, como na cicatrização de ferimentos (BANDYOPADHYAY et al., 2006).

O **Beautifiqué®** consiste em uma combinação exclusiva de tocotrienóis e tocoferóis, o que possibilita uma ação antioxidante muito mais potente na pele. O tocotrienol e o tocoferol

possuem função de proteção da pele, especialmente na prevenção do estresse oxidativo, responsável pelo envelhecimento (KAMAL-ELDIN et al., 1996).

SUGESTÃO DE FÓRMULAS

GLOW FOR EYES (PARA OLHEIRAS)	
BEAUTIFIQUÉ®	5,00%
FULL WHITE®	1,00%
KAWAII KIREI®	0,50%
VEGELIGHT®	3,00%
LUMINECENSE®	5,00%
BIOPÉROLAS LA VIE EST BELLE	0,50%
CREME BASE	Q.S.P 30 g

COLLAGEN BOOSTER	
BEAUTIFIQUÉ®	20,00%
CREME	Q.S.P 30 g

Modo de usar: Aplicar nas áreas afetadas conforme orienta ção médica.

RENEW SKIN	
BEAUTIFIQUÉ®	20%
ÓLEO DE JOJOBA	Q.S.P

Modo de usar: Aplicar nas áreas afetadas 2 a 3 vezes ao dia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KAMAL-Eldin A, Appelqvist LA. The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols. Department of Food Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden. Jul-31(7):671-701, 1996.

KIM D, et al. (2006) Fungal heme oxygenases: Functional expression and characterization of Hmx1 from Saccharomyces cerevisiae and CaHmx1 from Candida albicans. Biochemistry 45(49):14772-80.