LABORATÓRIOS
ATTIVOS MAGISTTRAIS®

STABYL® C
Stabilized pure Vitamin C
by Attivos Magisttrais

/attivosmagisttrais

ATTIVOS MAGISTTRAIS
UMA EMPRESA CERTIFICADA
BPF
ANVISA
CERTIFICADA PARA VOCÊ

2019 JUBILEE
50 ANOS
GRUPO LATTM

PELE MAIS JOVEM, SAUDÁVEL E LUMINOSA

(11) 3995-5130
(11) 98700-1280
mkt@attm.com.br
attivosmagisttrais.com.br

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO STABYL® C**

A única Vitamina C estabilizada com liberação lenta e duradoura[1]

Estudo avaliou a eficácia e estabilidade de uma nova forma tópica de aplicação de vitamina C. Devido à dificuldade de obter um cosmético estável e sem os problemas da oxidação do ácido ascórbico, foi desenvolvido um composto que apresenta estabilidade em cosméticos, atividade sobre a pele e liberação lenta para manutenção do efeito do ácido ascórbico. Foi proposto então avaliar a molécula de ácido ascórbico 2-glucosideo (2-O-α-D-glucopiranosil-L-ascorbato).

Foi mensurado o teor de absorção cutânea de um creme contendo 2% de Stabyl® C, além disso foi realizada a quantificação da síntese de melanina e avaliada a estabilidade da formulação proposta.

Resultados:

Stabyl® C foi detectado na urina dos voluntários após 26horas da aplicação do creme. Uma vez que, no grupo placebo não foi detectado a presença de vitamina C na urina durante todo o teste e no grupo que aplicou outro tipo de vitamina C houve pico de concentração seguida de queda após a remoção do creme, pode-se afirmar que após a aplicação de Stabyl® C, a vitamina C ainda continua agindo na pele por um longo período. Figura 1;

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPAGNDA

DADOS CIENTÍFICOS **DOS BENEFÍCIOS DO STABYL® C**



- Stabyl® C manteve a redução da síntese de melanina por até 30 horas, sendo que as demais fórmulas testadas demostraram essa capacidade por no máximo 20 horas;
- Stabyl® C demonstrou capacidade de proteger células submetidas à radiação UV;
- Após a irradiação, a quantidade intracelular de lipídeos peroxidados e produção de radicais de hidrogênio foram significantemente menores no grupo de utilizou Stabyl® C, do que nos demais grupos;
- As formulações contendo Stabyl® C foram consideradas estáveis.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPAGNDA

/attivosmagisttrais

BIOLOGIA E **MECANISMOS DE AÇÃO**

A vitamina C é o antioxidante mais abundante da pele. Ao contrário das plantas e de alguns animais, os seres humanos são incapazes de sintetizar a vitamina C devido à ausência da enzima L-glucono-gama lactona oxidase. Apesar das altas doses de suplementação oral, apenas uma pequena fração de vitamina C estará biologicamente disponível e ativa na pele.

Portanto a aplicação tópica, no caso de cosmecêuticos é uma ótima alternativa para entregar à pele a quantidade de vitamina C necessária e eficaz.

A vitamina C está disponível em várias formas ativas. Entretanto, a maioria delas como, ácido 3-ascórbico, ácido L-ascórbico, são altamente instáveis e hidrofílicos o que dificulta sua penetração na pele.

Outros estudos utilizando formas lipofílicas da vitamina C não foram capazes de aumentar os níveis de ácido L-ascórbico na pele.

O desafio consiste em desenvolver uma formulação estável e encontrar o método de administração transepidérmica mais eficiente para as formas esterificadas de vitamina C para maximizar a concentração da forma ativa na pele.

PROPAGNDA

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

BIOLOGIA E **MECANISMOS DE AÇÃO**

O Stabyl® C, (ácido ascórbico 2-glucosideo) foi desenvolvido justamente para suprir as duas maiores dificuldades citadas anteriormente: ser estável e aumentar a concentração da forma ativa de vitamina C na pele.

O Stabyl® C, quando aplicado sobre a pele entra em contato com a enzima alfa-glicosidase, libera o ácido L-ascórbico ativo, puro e de forma lenta a ponto de ser detectata na pele por até 8 dias.

Uma vez que a vitamina C esteja presente na pele auxilia na síntese de colágeno através dos fibroblastos, o que garante uma pele mais firme e flexível. Além disso, devido a potente capacidade antioxidante do Stabyl® C reduz os danos causados pelos radicais livres provenientes do estresse oxidativo causado pela exposição aos raios UV, luz azul e luz visível.

Outra atuação da Vitamina C na pele está relacionada à atividade em enzimas e queratinócitos epidérmicos. Inibem a atividade da tirosinase e a formação de melanina e por isso está presente em cosméticos para tratamento de melasma [1,2].

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Creme Noturno com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	0,1%	Vitamina C Estabilizada
Frulix Amora	3%	Hidratante
Ah3®	4%	Tensor
Gel creme	qsp 30g	Veículo

Aplica no rosto à noite, após a limpeza da pele.

Lifiting de Ação Instantânea com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	0,5%	Vitamina C Estabilizada
Stabyl® F	0,5%	Antioxidante
Ah3®	4%	Tensor
Vitamina E	3%	Antioxidante
Gel creme	qsp 30g	Veículo

Aplicar no rosto à noite, após a limpeza da pele.

Filtro Solar FPS23 Tensor com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	1%	Vitamina C Estabilizada
Frulix Acerola	3%	Antioxidante
Ah3®	4%	Tensor
Stabyl® UV	10%	Filtro solar microencapsulado
Sylvagel NS	qsp 30g	Veículo

Aplicar no rosto pela manhã e reaplicar quando necessário.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Creme Hidratante com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	0,1%	Vitamina C Estabilizada
Ah3®	4%	Tensor
Ácido Hialurônico	3%	Textura e hidratação
Creme base	qsp 30g	Veículo

Aplicar no rosto pela manhã e à noite após a limpeza.

Creme para Área dos Olhos com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	0,5%	Vitamina C Estabilizada
Hemaline®	1%	Clareador
Vitamina E	3%	Antioxidante
Creme base	qsp 15g	Veículo

Aplicar na região dos olhos 2 vezes ao dia.

Filtro Solar FPS23 Despigmentante com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	2%	Vitamina C Estabilizada
Frulix Framboesa	3%	Tensor
Stabyl® UV	10%	Filtro solar estabilizado
Sylvagel NS	qsp 30g	Veículo

Aplicar no rosto pela manhã e reaplicar quando necessário.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPAGNDA

SUGESTÃO DE **FÓRMULAS**

Serum para Área dos Olhos com Stabyl® C

Ingrediente	Quantidade	Função
Stabyl® C	2%	Vitamina C Estabilizada
Stabyl® F	0,5%	Antioxidante
Hemaline®	1%	Clareador
Vitamina E	1%	Antioxidante
Serum	qsp 15g	Veículo

Aplicar na região dos olhos 2 vezes ao dia.

INFORMAÇÕES **FARMACOTÉCNICAS**

- O pH de estabilidade é entre 5 e 7;
- Possibilita fornecer maior validade devido à alta estabilidade da vitamina C;
- Não necessita conservação em geladeira;
- Solúvel em água;
- Não forma cristais;
- Rápido preparo.

PROPRIEDADES

É a forma natural, sem aditivações sintéticas do ácido L-ascórbico, naturalmente estabilizada e comercializada no Brasil pela Attivos Magisttrais.

O fato de ser estabilizada é uma grande vantagem do Stabyl® C, pois evita a oxidação que ocorre naturalmente da vitamina C quando a molécula não é protegida.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

BENEFÍCIOS[1,3]

- A única vitamina C pura estabilizada;
- Ação prolongada por até 8 dias;
- Fácil incorporação em qualquer fórmula: altamente solúvel;
- Permite fórmulas com altas concentrações (20%) sem cristalizar;
- Possui eficácia, mesmo se for utilizada em baixa dosagem (0,1%) ;
- Alternativa para pacientes com sensibilidade a hidroquinona e ácido retinoico e pode ser utilizada durante o dia;
- Efetiva no clareamento da pele e tratamento do melasma;
- Potencializa até 8x as associações como por exemplo, com Stabyl® F e AH3®;
- Melhor custo benefício.

CONTRAINDICAÇÕES

Stabyl® C é seguro devido a alta estabilidade. É comercializado desde 2005 e não apresentou nenhuma reação adversa na literatura.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

ESTRATÉGIA DE **MARKETING**

Stabyl® C é a única Vitamina C capaz de garantir adesão do paciente ao tratamento ,devido sua ação prolongada por até 8 dias e estabilidade contra altas temperaturas, íons metálicos, fotosensibilidade e outros mecanismos de degradação ,não necessitando de conservação em geladeira pelo paciente . A sua farmácia irá fidelizar o prescritor quando apresentar a ele as vantagens do Stabyl® C e o selo de autenticidade .

ONDE **ENCONTRAR**

Exclusivamente nas principais Farmácias de Manipulação.

sac@attm.com.br
desenvolvimento@attm.com.br
(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280

PROPGNDA

(11) 3995-5130 | (11) 98700-1280
desenvolvimento@attm.com.br
sac@attm.com.br

LITERATURA CONSULTADA

1. Kumano Y, Sakamoto T, Egawa M, Iwai I, Tanaka M, Yamamoto I. In Vitro and In Vivo Prolonged Biological Activities of Novel Vitamin C Derivative, 2-O-α-DGlucopyranosyl-L-Ascorbic Acid Stabyl C, in Cosmetic Fields. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 1998. 44:345-359.

2. Al-Niaimi F, Chiang NYZ. Topical Vitamin C and the Skin: Mechanisms of Action and Clinical Applications. J Clin Aesthet Dermatol. 2017 Jul;10(7):14-17.

3. Departamento Técnico Attivos Magisttrais.

PROPAGANDA

ATTIVOS MAGISTTRAIS®
Av. Juscelino Kubitschek, 1588
Anápolis/GO - CEP 75115-015
Contato: (11) 3995-5130
/attivosmagisttrais
@attivosmagisttrais