# *Bifidobacterium lactis* LEMMA

## *Bifidobacterium animalis subespécie lactis*

## Eficaz nas desordens gastrointestinais

Distúrbios gastrointestinais funcionais com sua alta prevalência e influência importante na qualidade de custos de vida e saúde dos pacientes representam um grande problema. A sua etiopatogenia é multifatorial e distúrbios em uma composição da microbiota intestinal bem como micro-organismos patogênicos específicos parecem ter um papel crucial.

A microbiota intestinal saudável forma uma barreira contra os micro-organismos invasores, potencializando os mecanismos de defesa do hospedeiro contra os patógenos, melhorando a imunidade intestinal pela aderência à mucosa e estimulando as respostas imunes locais. Além disso, ela também compete por combustíveis intraluminais, prevenindo o estabelecimento das bactérias patogênicas.

Quando benéfica ajuda a digerir os alimentos e a fermentar carboidratos que permaneçam mal absorvidos ou resistentes à digestão, além de ajudar a converter as fibras da dieta e a produzir ácidos graxos de cadeia curta (AGCC - butirato, propionato, acetato e lactato) e proteínas, que são parcialmente absorvidos e utilizados pelo hospedeiro.

Atualmente se reconhece que os AGCC exercem papel fundamental na fisiologia normal do cólon, no qual constituem a principal fonte de energia para os enterócitos e colonócitos, estimulam a proliferação celular do epitélio, o fluxo sanguíneo visceral e intensificam a absorção de sódio e água, ajudando a reduzir a carga osmótica de carboidrato acumulado.

### *Bifidobacterium animalis* subespécie *lactis*

A cepa *Bifidobacterium animalis* pode ser obtida a partir de dois substratos, animal e lácteo. O substrato animal recebe a nomenclatura *Bifidobacterium animalis* subespécie *animalis, enquanto o* substrato lácteo recebe a nomenclatura *Bifidobacterium animalis* subespécie *lactis*, conhecido internacionalmente pela nomenclatura "*Bifidobacterium lactis*". Atualmente no mercado internacional esta sendo abolida a obtenção do *B. animalis* a partir de substrato animal, e por apresentarem as mesmas aplicações clínicas, a LEMMA comercializa apenas a cepa *Bifidobacterium animalis* subespécie *lactis*.

### Tratamento constipação

Estudo avaliou o efeito do *Bifidobacterium animalis* com 1248 pacientes com constipação e desconforto gastrointestinal. Em apenas duas semanas de tratamento os pacientes apresentaram significativo aumento da frequência de defecação e redução considerável do desconforto gastrointestinal.

### Tratamento eczema infantil

Crianças com eczema apresentam níveis mais baixos de AGCC quando comparados às crianças não alérgicas. Estudos demonstram que a suplementação de probióticos no primeiro ano de vida aumenta significativamente a produção de AGCC, reduzindo consideravelmente o risco de desenvolvimento de eczemas.

### Prevenção do risco de infecções em crianças

Crianças de até dois anos que receberam *Bifidobacterium animalis* sub. *lactis* apresentaram menores taxas de infecções respiratórias quando comparado ao grupo placebo.

### Aplicações clínicas do *B. animalis* sub. *lactis*

- Tratamento *H. pylori*;
- Doenças inflamatórias;
- Artrite;
- Intolerância à lactose;
- Aumento da imunidade.

LEMMA

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234

lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

# *Bifidobacterium animalis sub. lactis LEMMA*

| Probióticos para constipação | |
|---|---|
| ***Bifidobacterium animalis sub. lactis LEMMA*** | **1 bilhão UFC** |
| *Lactobacillus reuteri LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Bacillus coagulans (L. sporogenes) LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Lactobacillus acidophilus LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Lactobacillus paracasei LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Bifidobacterium bifidum LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Bifidobacterium longum LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

| Probióticos para aumento da imunidade infantil | |
|---|---|
| ***Bifidobacterium animalis sub. lactis LEMMA*** | 300 milhões UFC |
| *Lactobacillus helveticus LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Lactobacillus plantarum LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Bacillus coagulans (L. sporogenes) LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Lactobacillus jhonsoni LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Bacillus clausii LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Bifidobacterium infantis LEMMA* | 300 milhões UFC |
| *Bifidobacterium longum LEMMA* | 300 milhões UFC |
| GliSODin® | 25mg |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

| Probióticos para erradicação do *H. pylori* | |
|---|---|
| ***Bifidobacterium animalis sub. lactis LEMMA*** | **1 bilhão UFC** |
| *Lactobacillus acidophilus LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Bacillus clausii* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| *Lactobacillus delbruekii (sub. L. bulgaricus) LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Bifidobacterium longum* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| *Streptococcus thermophilus* LEMMA | 1 bilhão UFC |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose duas vezes ao dia, durante a antibioticoterapia.

Estudo avaliou a associação de certas cepas probióticas na terapia tripla com claritromicina + amoxicilina + lanzoprazol como terapia de erradicação do *H. pylori*. O estudo demonstrou que a associação desses dois probióticos apresenta capacidade de aumentar a taxa de erradicação do *H. pylori* em associação à terapia tripla, além de reduzir os efeitos adversos desse tratamento.

| Probióticos para prevenção do eczema | |
|---|---|
| ***Bifidobacterium animalis sub. lactis LEMMA*** | **1 bilhão UFC** |
| *Bifidobacterium bifidum LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| *Lacococcus lactis LEMMA* | 1 bilhão UFC |
| GliSODin® | 50 mg |
| Excipiente qsp | Uma unidade |

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.




**Referências consultadas:**

Milani C, et al. Comparative Genomics of Bifidobacterium animalis subsp. lactis Reveals a Strict Monophyletic Bifidobacterial Taxon. Appl Environ Microbiol. 2015 Jul;79(14):4304-15.

Agrawal A, Whorwell PJ. Irritable bowel syndrome: diagnosis and management. BMJ. 2006 Feb 4;332(7536):280-3.

Eskesen D, et al. Effect of the probiotic strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12®, on defecation frequency in healthy subjects with low defecation frequency and abdominal discomfort: a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Br J Nutr. 2015 Nov 28;114(10):1638-46.

Indrio F, et al. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of colic, regurgitation, and functional constipation: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr. 2014 Mar;168(3):228-33.

Jayasimhan S, et al. Efficacy of microbial cell preparation in improving chronic constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr. 2013 Dec;32(6):928-34.

Kim HK, et al. Probiotic supplementation influences faecal short chain fatty acids in infants at high risk for eczema. Benef Microbes. 2015 Dec;6(6):783-90.

Lehtoranta L, Pitkäranta A, Korpela R. Probiotics in respiratory virus infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2014;33:1289–302.

Merenstein DJ, et al. Safety of Bifidobacterium animalis subsp. Lactis (B. lactis) strain BB-12-supplemented yogurt in healthy adults on antibiotics: a phase I safety study. Gut Microbes. 2015;6(1):66-77.

Orel R. Effectiveness of L. reuteri for prevention and treatment of functional gastrointestinal disorders in infants, children and adolescents (Review). Zdrav Vestn 2013;82 supl 1: I-83–93.

Taipale TJ, et al. Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 in reducing the risk of infections in early childhood. Pediatr Res. 2016 Jan;79(1-1):65-9.



LEMMA

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin – São Paulo/SP – CEP 04602-001. Contato: (11) 5044-7234

lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br lemma.supply - facebook.com/lemma.supply