MATERIAL TÉCNICO

Modulex

SOVITÁ

MAIS ENERGIA NA VIDA

Identificação

Grau: Farmacêutico ( ) Alimentício (x) Cosmético ( ) Reagente P.A. ( )

Uso: Interno (x) Externo ( )

Especificação Técnica / Denominação Botânica: Mistura única de fitoquímicos naturais da cana-de-açúcar.

Equivalência: Não aplicável.

Correção:
Teor: Não aplicável.
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável.
Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da **especificação** e da **prescrição.**

Fórmula Molecular: Não aplicável

Peso Molecular: Não aplicável

DCB: Não aplicável.

CAS: Não aplicável.

INCI: *Saccharum officinarum*

Sinonímia: Não aplicável.

Aparência Física: Pó fino marrom claro.

Composição: Mistura de fitoquímicos naturais da cana-de-açúcar.

Valor Nutricional (100g)		
Valor Energético	195 kcal – 814 KJ	9%
Carboidrato	46,5g	15%
Açúcares	7,5g	-
Proteína	0,4g	0,5%
Gordura total	0g	0%
Saturada	0g	0%
Sódio	51mg	2%
Não tem quantidades significativas de fibras alimentares.		
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.		

Modulex™ é usado em dosagem baixa, portanto não confere quantidade significativa de calorias, açúcares e sódio.

SOVITÁ

Características Especiais

- Certificado de Halal
- Certificado de Kosher
- Certificado de GRAS
- Produto de origem natural
- Produto livre de glúten
- Produto livre de lactose

Aplicações

Propriedades:

- A imediata identidade do sabor;
- O desenvolvimento rápido da completa sensação de sabor;
- A sensação bucal aceitável;
- Menor efeito residual (*lingering effect*);
- Uma curta sensação "*aftertaste*";
- A não existência de sensações desagradáveis.

- **Indicações:**
  - Intensifica a sensação de dulçor nos produtos;
  - Aumentar a aceitação de produtos.

Vias de Administração / Posologia ou Concentração: 0,1% - 0,2% do produto final.
Para formulações líquidas como xarope, shot, drink, gel, spray e shake levar em consideração o volume final da fórmula (pó + líquido).

Exemplo:
Sachê de 3g de BCAA para diluição em 100 mL de água (Considerar total 103g)
Dose: 105mg (0,1%) até 210 mg (0,2%) de Modulex™.

Dose: 105mg (0,1%) até 210 mg (0,2%) de Modulex™.

	MODULEX 0,1%		MODULEX 0,2 %	
	1 UNIDADE	30 UNIDADES	1 UNIDADE	30 UNIDADES
GOMA (5 g)	5 mg (0,005g)	150 mg (0,15g)	10 mg (0,01g)	300 mg (0,3g)
SHOT (10 mL)	10 mg (0,01g)	300 mg (0,3g)	20 mg (0,02g)	600 mg (0,6g)
GEL (30 g)	30 mg (0,03g)	900 mg (0,9g)	60 mg (0,06g)	1800 mg (1,8g)
PIRULITO (15 g)	15 mg (0,015g)	450 mg (0,45g)	30 mg (0,03g)	900 mg (0,9g)
SPRAY (100 mL)	100 mg (0,1g)	3000 mg (3g)	200 mg (0,2g)	6000 mg (6g)
XAROPE (100 mL)	100 mg (0,1g)	3000 mg (3g)	200 mg (0,2g)	6000 mg (6g)
SACHÊ (10 g diluído em 100mL de água)	110 mg (0,11g)	3300 mg (3,3g)	220 mg (0,22g)	6600 mg (6,6g)
SACHÊ (30 g diluído em 100mL de água)	130 mg (0,13g)	3900 mg (3,9g)	260 mg (0,26g)	7800 mg (7,8g)

Observações Gerais: Não aplicável.

Farmacologia

Mecanismo de Ação:

A farmácia de manipulação promove tratamentos cada vez mais personalizados. Essa constante inovação do setor magistral busca maior adesão do paciente e mais personalização de acordo com o tratamento e preferências pessoais de cada indivíduo.

Uma suplementação pode ter maior adesão quando a forma utilizada é um gel, chocolate ou um shake por exemplo. Além disso, uma forma farmacêutica mais atrativa e fácil de ser administrada pode ser a solução para aumentar a adesão de crianças e idosos ao tratamento.

Flavorizar, edulcorar e colorir uma preparação farmacêutica para administração oral é fator preponderante à adesão terapêutica pelo paciente. Portanto, o farmacêutico tem como desafio, desenvolver técnicas e recursos para realizar a combinação harmônica dos ativos, flavorizantes (aromas), edulcorantes e corantes.

O Modulex™ possui uma mistura única de fitoquímicos naturais da cana-de-açúcar que auxiliam na modulação e intensificação de sabor. É capaz de mascarar o sabor residual de adoçantes de alta intensidade, adstringência e notas metálicas. Potencializa o sabor de açúcar e a percepção de sal nos produtos, podendo ser usado na indústria farmacêutica e alimentícia.

Modulex™ é um grande aliado para as farmácias de manipulação para formulações em sachê, shot, spray, goma, chiclete, shake, drink, gel, bala dura, pirulito e xarope.

Modulex intensifica a sensação de dulçor nos produtos, confere corpo aos produtos em que será aplicado. Reduz a adstringência/metálico (característicos de edulcorantes e outros ativos), aumentando a aceitação em geral de produtos contendo edulcorantes. Não confere sabor doce na dosagem aplicada, podendo ser usado também em formulações salgadas.
Adoçantes de alta intensidade proporcionam um sabor doce intenso. Apesar disso, não conseguem imitar o perfil exato do sabor do açúcar e o dulçor permanece por mais tempo.



Note: Sugar (sucrose) at a 3% solution, others equivalent sweetness to 3% sucrose solution.
Source: Morita Kagaku Kogyo, adapted

Modulex™ potencializa o sabor do açúcar já existente e reduz o sabor residual dos adoçantes. O paladar é percebido e a mensagem enviada ao cérebro. A sacarose/sódio liga-se ao receptor do paladar, enviando uma mensagem ao cérebro para reconhecer o sabor doce ou salgado.

O Modulex ™ prepara todas as células receptoras do paladar para aumentar a percepção de doçura ou salinidade no cérebro.



Teste de sabor

- A maioria dos produtos testados com Modulex™ foram os preferidos.
- Todos os produtos testados mostraram uma redução nas notas metálicas / adstringentes.
- Os produtos com Modulex™ mostraram uma redução no sabor residual dos adoçantes, melhora do corpo e arredondamento.



Efeitos Adversos: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

Contraindicações / Precauções: Por possuir uma dosagem baixa, Modulex™ não possui restrições de uso, podendo ser usado por indivíduos diabéticos e hipertensos.

Referências Científicas

Não aplicável.

Farmacotécnica

Estabilidade (produto final): Produto Higroscópico, estável durante tratamento térmico.

pH Estabilidade (produto final): Resistente a toda faixa de pH.

Solubilidade: Solúvel em água.

Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Pode ser utilizado em sachê, shot, spray, goma, chiclete, shake, drink, gel, bala dura, pirulito e xarope.

Orientações Farmacotécnicas: Recomendamos testar as formulações para definição da melhor concentração de Modulex™ de acordo com a composição da fórmula. Cada ativo possui uma característica diferente que pode alterar o produto final.

Compatibilidades (para veículos): Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Mix de vitaminas e minerais; Pool de aminoácidos (Pool de aminoácidos essenciais, BCAA, aminoácidos isolados); Proteínas (WPI, WPC, Proteína do arroz e ervilha); Fitoterápicos; Adoçantes.

Incompatibilidades: Não encontrado nas referências bibliográficas pesquisadas.

Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Armazene bem fechado sob condições frescas e secas em uma área de armazenamento aprovada. Evite a exposição à luz.

Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos conservar o produto final em **condições frescas e secas, longe da exposição da luz**, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, sistema conservante e condições do produto.

Formulações

Uso Oral

Sachê com Silimarina	
Silimarina	420mg
Ácido cítrico	100mg
Lecitina de soja	0,1g
Taumatina	0,01g
Esteviosídio	0,02g
Flavorizante	0,3g
Polídextrose	3,0g
Modulex™	0,05g
Posologia: 1 sachê por dia	

Referências Bibliográficas

. Dossiê Técnico do Fabricante.