PREBIOGUT

O equilíbrio perfeito para seu dia-a-dia

As fibras alimentares podem ser classificadas em fibras solúveis e fibras insolúveis, de acordo com a solubilidade de seus componentes em água. As fibras solúveis são responsáveis pelo aumento da viscosidade do conteúdo intestinal e redução do colesterol. As fibras insolúveis aumentam o volume do bolo fecal, reduzem o tempo de trânsito intestinal e tornam a eliminação fecal mais fácil. As fibras não digeríveis têm sido associadas ao aumento na biodisponibilidade dos minerais. De acordo com o tipo de fibra, tem-se aumento na absorção de minerais como ferro, cálcio, magnésio e zinco. Com a maior fermentação bacteriana no intestino decorrente da suplementação de fibras, ocorre o aumento da acidez no cólon, que conduz a maiores índices de aproveitamento absortivo destes minerais.
Quanto mais o prebiótico conduz à fermentação, mais elevará a acidez colônica e maior será a influência positiva sobre a absorção dos minerais.
PREBIOGUT possui uma excelente combinação de fibras solúveis e insolúveis, essenciais para o bom funcionamento do organismo em geral e para a manutenção da saúde intestinal. São elas: **PREBIOGUT**

Beet Fiber - Fibra dietética 100% natural, produzida na Suécia a partir da beterraba branca. Fibra insolúvel (49%) com uma parte solúvel (24%). Possui parede celular diferenciada, com alta capacidade de absorção e retenção de água; dessa forma, promove plenitude gástrica e sensação de saciedade.
Sua parte insolúvel promove normalização do trânsito intestinal e aumento do volume fecal.

Fiber AG® - Fibra solúvel de fermentação lenta sem efeitos indesejáveis como a distensão abdominal. É prebiótica e promove saciedade, por possuir ação gelificante, retardando a passagem do alimento pelo trato gastrointestinal.

Polidextrose - Possui propriedades prebióticas e é uma fonte de fibras solúveis. Possui baixo índice glicêmico e valor calórico, sendo apropriada para produtos dietéticos e para controle de peso;
Vitaminas e minerais quelatos - oferece todos os nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo e manutenção da saúde, os quais muitas vezes não são adquiridos por meio da alimentação.

De uma forma mais rápida e eficiente, as vitaminas e os minerais são totalmente absorvidos devido às estruturas quelatas dos minerais, ajustando os níveis metabólicos e melhorando a qualidade de vida.
Composição:
Cálcio 180 mg, Cobre230 mcg, Ferro 3,00 mg, Fósforo 79 mg, Iodo 23 mcg, Magnésio 58 mg, Manganês 0,17mg, Potássio 13 mg, Selênio 18 mcg, Zinco 1 mg, Vitamina A 99 mcg, Vitamina B1 0,13 mg, Vitamina B2 0,2 mg, Vitamina B3 1,8 mg, Vitamina B5 0,50 mg, Vitamina B6 0,40 mg, Vitamina B9 33 mcg, Vitamina B12 0,17mcg, Vitamina C 5 mg, Vitamina D
Vitamina E 1,65 mg, Vitamina H 2,5mcg.

PREBIOGUT possui sabor neutro, dessa forma pode ser adicionada a diversos tipos de refeições ou até mesmo ser tomada apenas diluída em água. Possui ótima solubilidade e pode ser ingerida diariamente.

BENEFÍCIOS:

- 3 tipos de fibras (solúveis e insolúveis);
- Fibras de alta qualidade e que não provocam efeitos adversos;
- Não contém adoçantes artificiais;
- Não contém açúcar;
- Não contém glúten;
- Não contém lactose;
- Fonte de Cálcio, Magnésio e diversos outros minerais.

AÇÕES CLINICAMENTE COMPROVADAS

Diabetes
Reduz picos de glicemia e insulina na corrente sanguínea.

Melhora Perfil Lipídico
Reduz os níveis de colesterol total e/ou LDL.

Trânsito Intestinal
Promove diminuição no tempo de trânsito intestinal e aumento do volume fecal, sem apresentar efeitos adversos indesejados, como distensões abdominais e efeito laxativo.

Efeito Prebiótico
Promove a regularidade do trânsito intestinal, reduz a constipação e proporciona bem-estar geral.

Perda de Peso
Reduz IMC e percentual de gordura.

Índice Glicêmico
Redução nos níveis de glicose sanguíneos, devido à diminuição no metabolismo de carboidratos.

Saciedade
Prolonga a saciedade por mais tempo pelo retardo no esvaziamento gástrico.

PREBIOGUT

O equilíbrio perfeito para seu dia-a-dia

AÇÕES CLINICAMENTE COMPROVADAS

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 15 g (1 colher de sopa)		%VD (*)
Valor energético (kcal/kJ)	45 / 190	1000 mg
Carboidratos (g)	14	2%
Proteínas (g)	0	5%
Gorduras totais, dos quais (g):	0	**
Gorduras Saturadas	0	**
Gorduras Trans	0	**
Fibra Alimentar (g)	6	24%
Sódio (mg)	0	**
Cálcio (mg)	180	18%
Magnésio (mg)	17	2%

Não contém quantidade significativa de Proteínas, Gorduras totais, Gorduras Saturadas, Gordura Trans e Sódio."
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores diários não estabelecidos.

Modo de Uso: Diluir 15g (1 colher de sopa cheia) em 200 mL de água. Tomar duas vezes ao dia.

IMPORTANTE: O CONSUMO DE FIBRAS DEVE SER ACOMPANHADO DE INGESTÃO ABUNDANTE DE ÁGUA.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, M.L.F. Fibras alimentares. **Rev Nutr PUCCAMP** Vol. 2. P. 88-97. 1989.

BAXTER, Y.C. Fibras como prebióticos no metabolismo lipídico e absorção de minerais. **Informativo da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral**. 2001.

DIAS, G. T. M. Granulados Bioclásticos . Algas Calcárias. **Brazilian Journal of Geophyscs**. vol. 18. 2000.

BABIKER, R.; MERGHANI, T. H.; ELMUSHARAF, K.; BADI, R. M.; LANG, F.; SAEED, A. Effects of gum Arabic ingestion on body mass index and body fat percentage in healthy adult females: two-arm randomized, placebo controlled, double-blind trial. **Nutrition Journal.** Vol. 11. P. 111. 2012.

LECLÈRE, C. J.; CHAMP, M.; BOILLOT, J.; GUILLE, G.; LACANNU, G.; MOLIS, C.; BORNET, F.; KREMPF, M.; DELORT-LAVAL, J.; GALMICHE, J. P. Role of viscous guar gums in lowering the glycemic response after a solid meal. **Am. J. Clin. Nutr.** Vol. 59. P. 914-921. 1994.

MOHAMED, R. E.; GADOUR, M. O.; ADAM, I. The lowering effect of Gum Arabic on hyperlipidemia in Sudanese patients. **Frontiers in Physiology**. Vol. 6, Article 160. 2015.

ONISHI, T.; UMEMURA, S.; YANAGAWA, M.; MATSUMURA, M.; SASAKI, Y.; OGASAWARA, T.; OOSHIMA, T.Remineralization effects of gum arabic on caries-like enamel lesions. **Arch. Oral. Biol**. Vol. 53. P. 257–260. 2008.

SHARMA, R.D.; Hypocholesterolaemic effect of gum acacia in men. **Nutr. Res**. p.1321–1326. 1985

BARBRO HAGANDER, M. D.; NILS-GEORG ASP, M. D.; SUAD EFENDIC, M. D.; PETER NILSSON-EHLE, M. D.; BENGT SCHERSTEN, M. D. Dietary fiber decreases fasting blood glucose levels and plasma LDL concentration in noninsulin-dependent diabetes mellitus patients. **Am. J. Cli. Nutr**. Vol. 47. P. 852-858. 1988.

CHERBUT, C.; SALVADOR, V.; BARRY, J. L.; DOULAY, F.; DELORT-LAVAL, J. Dietary fibre effects on intestinal transit in man: involvement of their physicochemical and fermentative properties. **Food Hydrocolloids,** Vol. 5 no. 1/2 pp. 15-22, 1991.

GIACOSA, A.; SUKKAR, S. G.; FRASCIO, F.; FERRO, M. Sugar beet fibre: a clinical study in constipated patients. **The Royal Society of Chemistry**, 1990.

HANSON, C. F.; FRANKOS, V. H.; THOMPSON, W. O. Bioavailability of oxalic acid from spinach, sugar beet fibre and a solution of sodium oxalate consumed by female volunteers. **Fd. Chem. Toxic.** Vol. 27, No. 3. Pp. 181-184, 1989.

ISRAELSSON, B.; JÄRNBLAD, G.; PERSSON, K. Serum cholesterol reduced with Fibrex® - a sugar-beet fibre preparation. **Scandinavian Journal of Nutrition.** Vol. 37 p. 146-149. 1993.

QUIROGA, A. L. B. Fibras, como definir? **Aditivos Ingredientes; Especial Funcionais Nutracêuticos**. Ed. 140. 2017.

APPARENZA
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

Av 7 de setembro 4941 - Batel, Curitiba / PR

(41)-30744040