Sea3Alg™ seaweed complex

- BLEND DE ALGAS MARRONS
- DIMINUI A ABSORÇÃO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDIOS

A maior fonte de glicose sanguínea é proveniente de carboidratos da alimentação, que são hidrolisados pelas enzimas α-amilase e α-glucosidase e, então, são absorvidos no intestino delgado. A alteração dos níveis de glicose sanguínea é uma característica importante em pacientes com síndrome metabolica.

SEA 3 ALG®

Sea 3 Alg®, e um exclusivo blend de algas marrons altamente concentrado, composto por Sacharina japônica, Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus, rico em substâncias capazes de atuar diretamente no perfil glicêmico e lipídico, com aproximadamente 80% de inibição das enzimas alfa-amilase e alfa-glucosidase e outros componentes presentes em sua composição como fucoidan, L-fucose, ácido algínico e íons sulfato.

MECANISMO DE AÇÃO

Sea 3 Alg® inibe 3 enzimas fundamentais do processo de digestão de carboidratos e lipídios:

- **Alfa-amilase**
- **Alfa-glucosidase**
- **Lipase**

O carboidrato da alimentação começa a ser degradado logo após a sua ingestão, pela alfa-amilase presente na saliva, que e capaz de degradar até 30% dos carboidratos. Este processo é estagnado, em contato com o pH ácido do meio estomacal que é capaz de inibir a ação desta enzima. Após o esvaziamento gástrico, a alfa-amilase pancreática é secretada e produz a degradação do carboidrato restante em oligossacarídeos (cerca de 70%).

As fibras alimentares de algas marrons contêm compostos concentrados denominados alginatos que aumentam a sensação de saciedade.

PORQUE PRESCREVER SEA 3 ALG®:

- **Exclusivo blend de algas marrons (*Sacharina japônica*, *Ascophyllum nodosum* e *Fucus vesiculosus*)**
- **Ativos altamente concentrados**
- **Atua no perfil glicêmico e lipídico**
- **Estudos comprovando a capacidade inibitória das enzimas digestivas**
- **Controle de diabetes e obesidade**
- **Atua na resistência insulínica**
- **Efeito sacietogênico**
- **Auxilia no gerenciamento de peso**

ESTUDOS CLÍNICOS

Um estudo avaliou a atividade inibitória de *Ascophyllum nodosum* e *Fucus vesiculosus* sobre a lipase pancreática. Os resultados demonstram que estas algas são capazes de inibir a atividade desta enzima, o que as tornam uma opção terapêutica interessante para o controle dos níveis lipídicos.

A Sacharina japônica também se mostrou eficaz no controle dos níveis lipídicos. Verificou-se também, em outros estudos, as atividades inibitórias destas algas sobre a atividade da alfa-amilase e alfa-glucosidase, o que os tornam interessantes para o controle de diabetes.

exata

Exata, Empresa Sócio Colaboradora da Anfarmag

(11) 3199-7600 comercial@exatadistribuicao.com.br

www.exatadistribuicao.com.br @exatadistribuicao_ Exata Distribuição

Sea3Alg™ seaweed complex

- BLEND DE ALGAS MARRONS
- DIMINUI A ABSORÇÃO DE CARBOIDRATOS E LIPÍDIOS

DOSE RECOMENDADA

300mg ao dia, 30 minutos antes das refeições.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

GERENCIAMENTO DE PESO

Sea 3 Alg®.....150mg
Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, meia hora antes do almoço e jantar.

SÍNDROME METABÓLICA E CONTROLE DA GLICEMIA

Sea 3 Alg®.....150mg
Cissus quadrangulares.....300mg
Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, meia hora antes do almoço e jantar.

REDUTOR DA ABSORÇÃO DE GORDURA E CARBOIDRATOS

Sea 3 Alg®.....150mg
BIO CG®.....150mg
Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, meia hora antes do almoço e jantar.

COMPOSTO EMAGRECEDOR NATURAL

Sea 3 Alg®.....150mg
Adipogen®.....300mg
Prolipium®.....250mg
Indisteem®.....400mg
Tomar 1 dose antes das principais refeições.

TRATAMENTO DE RESISTÊNCIA INSULÍNICA

Sea 3 Alg®.....150mg
KPF®.....300mg
Innoslim®.....200mg
Tomar 1 dose antes das principais refeições.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS

1.CHATER, P.I. et al. The role of seaweed bioactives in the controlo f digestion : implication for obesity treatments. The Royal Societ of Chemistry .2015; 6(11): 3420-7.
2.FITTON, J.H.; STRINGER, D.N; KARPINIEC, S.S. Therapies from fucoidan: an update Marine Drugs. 2015: 13:5920-5946.
3.HUANG, L. et al. Hypolipideic effect of fucoidan fron Laminaria japônica in hyperlipidemic rats. Pharmaceutical Biology, 2010; 48(4): 422-426.
4.KIM. K.T. RIOUX L.E: TURGEON, S.L. Alpha-amylase and alpha-glucosidase inhibition is differentially modulated by fucoidan obtained fron fucus vesiculosus and ascoplyllum nodosum. Phytochemistry, 2014.98 (2014)27-33.
5.L.I. B. et al.Fucoidan: structure and bioactivity. Molecures. 2008: 13:1671-1695.
6.PARK. J.; YEOM. M.; HAHM, D.H. Fucoidan improves sérum lipid levels and atherosclerosis through hepatic SREBP-2-mediated regulation . JournalofPharmacologicalSciences. 2016; 131(2): 84-92.
7.PEREIRA, R. A relação entre Dislipidemia e Diabetes Mellitu: tipo 2. CadernosUniFOA. 2011: 17:89-94.
8.SHAN. X .et al. In vitro and In vivo hypoglycemic effects o brown algal fucoidans. International Journal of Biologicc Macromolecules. 2016:82:249-55.
9.TYSOE. C et al. Potent Humara -Amylase Inhibition by the BDefensin- like Protein Helianthamide. ACS Cent Sci. 2016:2(3):154-16.

exata

Exata, Empresa Sócio Colaboradora da Anfarmag
(11) 3199-7600 comercial@exatadistribuicao.com.br
www.exatadistribuicao.com.br @exatadistribuicao_ Exata Distribuição