MARACUJA

Nome científico: *Passiflora alata* Dryand*; Passiflora edulis* Sims*.*

Sinonímia Científica: N/A

Nome popular: *Passiflora alata* D.: Maracujá doce, maracujá de refresco, maracujá grande, maracujá alado, maracujá guaço e maracujá de comer.

Passiflora edulis S.: Maracujá ácido, maracujá azedo, maracujá peroba.

Família: Passifloraceae.

Parte Utilizada: Folhas.

Composição Química: Alcaloides: harmana, harmalina, harmol, rarmalol. Flavonoides: aspergina, vitexina, saponarretina, apigenina, orientina. Glicosídeos cianogênicos: passiflorina, ginocardina. Fração de esteroides: sitosterol, estigmasterol. Saponina, gomas, taninos, pigmentos, pectinas, serotonina, resinas, ácido licânico e ácido parinário.

Formula molecular: N/A **Peso molecular:** N/A

CAS: N/A

DCB: N/A

DCI: N/A

O termo do maracujá é usado para muitas das 400 espécies do gênero Passiflora, que são primariamente plantas videiras trepadeiras, todas elas originadas da América tropical. Deste total, cerca de 150 são relatadas como nativas da região Centro-Norte do Brasil que é o seu maior dentro de dispersão, sendo utilizadas como ornamento, alimento e medicamento. Das 150 espécies, mais de 60 produzem frutos que podem ser aproveitados como alimentos na forma de doces, licores e refrescos, sendo que *Passiflora edulis* e *Passiflora alata* estão entre as mais importantes comercialmente.

Indicações e Ação Farmacológica

É indicado em casos de dores de cabeça de origem nervosa, ansiedade, perturbações nervosa da menopausa, insônia, taquicardia nervosa, doenças espasmódicas e nevralgias.

Devido aos alcaloides e flavonóides, age como depressor inespecífico do sistema nervoso central, resultando em uma ação sedativa, tranquilizante e antiespasmódica da musculatura lisa.

Também tem atividade cardiovascular devido ao fato de diminuir por instantes a pressão arterial e ativa a respiração, deprimindo a porção matriz da medula.

A passiflorina é similar a morfina e é um medicamento de grande valor terapêutico como sedativo e que apesar de narcótico, não deprime o sistema nervoso central. E também possui efeitos analgésicos o que justifica o seu emprego nas nevralgias.

Toxicidade/Contraindicações

É contraindicado em pessoas de hipotensão. Deve-se controlar o uso das folhas na forma de chá, pois existem riscos de intoxicação cianídrica consequente ao uso de doses exageradas.

Não há relatos de risco durante a gestação/lactação.

Dosagem e Modo de Usar

-Extrato fluido: 10 a 20 gotas/dose, duas vezes ao dia. (1g = 40 gotas). Não consumir mais do que 1g/dia.

-Extrato seco: 200 a 500 mg/dia.

-Folhas (infusão): 50 a 200 ml/dia.

-Pó: 0,25 a 1 g, três vezes ao dia.

-Tintura: 5 a 20 gotas, três a quatro vezes ao dia, diluídos em meio copo d'água.

-TM: 10 a 40 gotas, três a quatro vezes ao dia, diluídos em meio copo d'água.

-Óleo de maracujá (semente): Indicado nas dosagens de 0,5 a 100%. É utilizado em cremes, loções, óleos e shampoos, com as propriedades de hidratação, reestruturação da pele, regulação das atividades das glândulas sebáceas e proporciona volume e leveza aos cabelos.

Referências Bibliográficas

ALONSO J. **Tratado de Fitofármacos y Neutracéuticos**, 1°ed, Argentina, 2004.

ÁVILA, L. C. **Índice terapêutico fitoterápico – ITF**. 2 ed. Petrópolis, RJ, 2013

SILVA, Flávia Matos; et al. Enxertia de mesa de *Passiflora edulis* Simsf. flavicarpa Deg. sobre *Passiflora alata* Curtis em ambiente de nebulização intermitente. **Rev. Bras. Frutic**., Jaboticabal – SP, v. 27, n. 1, p. 98-101, 2005.

TESKE, M.; TRENTINI, A. M.M. **Herbarium compêndio de fitoterapia**. 3 ed. Curitiba, 1997.