Beracare Triple A

INCI NAME: *copaifera officinalis* (balsam copaiba) resin *carapa guianensis* seed oil euterpe oleraceae pulp oil

NºCAS: 8001-61-4 352458-32-3

Introdução
Aproximadamente 90% da população sofre de acne em algum momento de sua vida. Embora associado mais frequentemente com as mudanças hormonais durante a adolescência, pode persistir na fase adulta dependendo do caso.
São três as causas principais da acne e geralmente todas as três se encontram presentes: pele oleosa, onde a secreção sebácea tipicamente aumenta durante a puberdade e estágios no ciclo menstrual; infecção bacteriana causada pela bactéria anaeróbica *Propionibacterium acnes*; hiperqueratose da parede folicular que conduz a um espessamento da parede do folículo piloso e fechamento do orifício.

Descrição
TRIPLE A é um sistema multifuncional desenvolvido para melhorar o aspecto da pele oleosa propensa à acne, formado pelos princípios ativos de três plantas amazônicas:

1. ***Copaiba;***
2. ***Andiroba;***
3. ***Açaí.***

A efetividade deste produto é obtida através do sinergismo entre diferentes constituintes naturais.
Composição:
1) Betacariofileno obtido da *Copaiba*
Betacariofileno (sesquiterpeno) é um germicida natural obtido do óleo essencial da Copaíba, excelente para prevenção de infecções e inflamações.

2) Terpeno e ácidos graxos essenciais obtidos da Andiroba
Normalmente a deficiência em ácidos graxos causa espessamento da epiderme devido à proliferação celular, e também aumenta a perda de água transepidérmica (TEWL).
Os ácidos graxos obtidos da *Andiroba* promovem regeneração da epiderme mantendo a umidade natural da pele.
A ação antiinflamatória e efeito calmante são promovidos pela ação do componente terpênico – limonóide contido na fração insaponificável do produto.

3) Flavonóides (antocianinas) obtidos do Açaí
As antocianinas ou flavonóides são potentes antioxidantes naturais que promovem proteção contra danos do meio ambiente a pele, pois promovem ação contra os radicais livres durante o processo de inflamação. Em conjunto com os ácidos graxos e fitosteróis, promovem benefícios à pele tais como hidratação e regeneração.

Eficácia:

1. **EFETIVIDADE NA PELE OLEOSA PROPENSA A ACNE (*in vivo*)**

A efetividade do **BERACARE TRIPLE A** foi avaliada, em voluntários com pele oleosa propensa a acne, através da aplicação de uma formulação cosmética com 1,5% de Beracare Triple A em ingredientes não-comedogênicos e neutros.

OPÇÃO FÊNIX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA.
Rua Presidente Bernardes, 95 Freguesia do Ó 02757-000 São Paulo-SP Brasil
Telefone/Fax: +55 11 39 22 26 00 suporteaocliente@opcaofenix.com.br

Digitalizado com CamScanner

Os resultados foram observados após um tratamento de 56 dias (aprox. 8 semanas).

Princípio do estudo:

- Avaliação do efeito quando aplicado na acne tipo lesão (comedão);
- Avaliação do efeito anti-seborréico;
- Avaliação da efetividade cosmética e tolerância do ingrediente ativo e da formulação

Avaliação do produto nos tipos de lesões da acne (comedões)
Protocolo do estudo I

- Avaliação da atividade nas lesões retencionais e inflamatórias, antes e depois. do tratamento;
- 20 voluntários adultos de ambos os sexos foram selecionados com pele oleosa ou mista propensa à acne;
- O número de elementos retencionais (comedões, cistos e etc...) foram. contados na face dos voluntários no primeiro dia (D0).
- Os voluntários trataram a área (o lado direito da face) aplicando a formulação com 1,5% de **BERACARE TRIPLE A** duas vezes ao dia durante 8 semanas (56 dias).

Resultados:
Atividade comedolítica:

- Redução de 30% dos comedões após 4 semanas (D28);
- Redução de 72% o número de comedões após 8 semanas (D56);

Avaliação da atividade anti-seborréica
Protocolo do estudo II

- 10 voluntários de ambos os sexos foram selecionados;
- Foi medido o raio da superfície lipídica da pele usando um SEBUMETER na pele dos voluntários, na testa;
- A testa foi dividida com uma linha em dois lados;

Digitalizado com CamScanner

- O lado direito da testa foi usado como área de controle na qual não foi efetuada aplicação;
- O lado esquerdo da testa foi a área tratada com o creme que continha 1,5% de **BERACARE TRIPLE A** duas vezes ao dia durante 6 semanas (42 dias)

Resultados obtidos:

- Após 6 semanas (42 dias) foi concluído que **BERACARE TRIPLE A** regulou a atividade seborréica, reduzindo em aproximadamente 65% a evolução da quantidade de sebo, tornando consequentemente a pele dos voluntários menos oleosa.

Avaliação da efetividade cosmética e tolerância do ingrediente ativo e da formulação

Protocolo do estudo III

Os mesmos voluntários que participaram do painel dermatológico fizeram a avaliação cosmética do produto e depois responderam a um questionário;

Os pontos avaliados foram:

- Efeito adstringente;
- Efeito hidratante;
- Pele menos oleosa,
- Controle do efeito "matt",
- Limpeza da pele.

Resultados - efetividade cosmética:



OPÇÃO FÊNIX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA.
Rua Presidente Bernardes, 95 Freguesia do Ó 02757-000 São Paulo-SP Brasil
Telefone/Fax: +55 11 39 22 26 00 suporteaocliente@opcaofenix.com.br

Digitalizado com CamScanner

EFETIVIDADE COSMÉTICA	% DE APROVAÇÃO
Efeito de limpeza	90% dos voluntários aprovaram o efeito de limpeza
Redução de oleosidade	95% dos voluntários aprovaram a redução de oleosidade
Efeito hidratante	90% dos voluntários aprovaram o efeito de hidratação
Efeito adstringente	85% dos voluntários aprovaram o efeito de adstringência
Controle do efeito "matt"	95% dos voluntários aprovaram o controle do efeito "matt"

Ação contra *Propionibacterium acnes*
(MIC – Minimum Inhibitory Concentration)

Propionibacterium acnes é uma bactéria anaeróbica encontrada mais frequentemente em pessoas com a pele oleosa propensa a acne.
Quantitativamente é encontrada em folículo polissebáceo.
Foi avaliada a Concentração Mínima Inibitória – (MIC-Minimum Inhibitory Concentration) do **BERACARE TRIPLE A** contra ***Propionibacterium acnes.***

Metodologia:

INCQS (65.3210.009 – rev.01) – Fundação Oswaldo Cruz. Manual da Qualidade.
Método da verificação da Capacidade Inibitória de cosméticos, medicamentos não estéreis, matérias-primas e correlatos. 1999.
FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 4ed. São Paulo: Atheneu,1988

Resultado:
Foi observado que **BERACARE TRIPLE A** apresenta eficiência bactericida quando utilizado na concentração a partir de 1,5%.

Conclusões:

- Após 8 semanas **BERACARE TRIPLE A** reduziu o número de comedões efetivamente em 72%.
- Após 6 semanas **BERACARE TRIPLE A** regula a atividade seborréica reduzindo efetivamente em 65% (aproximadamente) a produção de sebo.
- Após 8 semanas de uso foi comprovado pelos voluntários de que a pele tornou-se menos oleosa regulando o efeito "matt", deixando a pele mais limpa, sedosa e hidratada.

Tolerância:
Ensaios de segurança

1. **Estudo clínico de compatibilidade cutânea:**

- Irritação dérmica primária
- Irritação dérmica acumulada
- Sensibilização dérmica

Resultados:
Não foram observadas **irritações potenciais**
Não foram observadas **sensibilizações potenciais**

2. **Avaliação dermatológica do potencial foto-irritante e fotosensibilizante tópico**

Digitalizado com CamScanner

- Foto-irritação primária e acumulada
- Fotosensibilização

Resultados:
Não foram observados **potenciais de foto-irritação**
Não foram observados **potenciais de fotosensibilização (fotoalergia)**

Informações Técnicas:

Aparência	líquido
Cor	amarelo esverdeado
Densidade	0.885 – 0.935
Índice de refração	1.478 – 1.498
pH	3 a 9

Solubilidade

SOLUBILIDADE	
Propileno glicol	**Insolúvel**
Álcool	**Insolúvel**
Glicerina	**Insolúvel**
Óleo vegetal	**Solúvel**
Óleo mineral	**Solúvel**
PPG-15 Stearyl ether	**Solúvel**
PPG-2 Hydroxyethyl cocamide	**Solúvel**
PPG-2 Hydroxyethyl stearamide	**Solúvel**
Palmitato de octila	**Solúvel**
Triglicérides do Ác. Cáprico / Caprílico	**Solúvel**
Palmitato de isopropila	**Solúvel**
Bechidroils	**Solúvel**

Indicação:
- Tratamentos coadjuvantes da acne grau I e II,
- Controle da oleosidade cutânea.

Aplicação:

- É um produto de fácil manipulação, podendo ser aplicado em formulações destinadas ao tratamento de pele oleosa e mista e pele propensa a acne.

- Não comedogênico, pode ser aplicado em produtos hipoalergênicos.

- Pode ser veiculado em cremes e loções (A/O e O/A), tônicos e produtos espumantes (sabonete líquido, sabonete barra, shower gel, espuma de limpeza.)

- Não é necessária aplicação conjunta de filtro solar.

Concentração Usual:
A partir de 1.5%.

OPÇÃO FÊNIX DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA.
Rua Presidente Bernardes, 95 Freguesia do Ó 02757-000 São Paulo-SP Brasil
Telefone/Fax: +55 11 39 22 26 00 suporteaocliente@opcaofenix.com.br

Digitalizado com CamScanner

Armazenamento:

BERACARE TRIPLE A é estável até 18 meses quando estocado em local fresco, seco, e bem ventilado.
Protegido da luz, de preferência sob temperatura ambiente, em embalagens originais e lacradas (com nitrogênio injetado na superfície).

Sugestões De Fórmulas:

Gel-creme Antiacne Antioleosidade
TRIPLE A.....3.0%
Spheron L-1500.....2.0%
Gel-creme qsp.....30g

Spheron L-1500: Silica que absorve a oleosidade, promovendo o controle imediato do efeito mate.

Gel-creme Antiacne adsorvedor de oleosidade
TRIPLE A.....1.50
Argila branca da Amazônia.....2.50
Gel-creme qsp.....30g

Argila Branca da Amazônia: Apresenta ação calmante, secativa e adsorvedora da oleosidade, auxiliando na normalização cutânea.

Referências Bibliográficas:

- Viglioglia y Rubin – Cosmiatria II. 2ª edition, 1991.
- Peyrefitte, G.; Martini, M.C.; Chivot, M. " Cahiers D'Esthétique – Cosmétique". Andrei, 1996.
- National Health Council: Resolution 196/96 of the Ministry of Health. Official diary, Oct.16, 1996.
- Sampaio e Col. Dermatology. Fourthy edition, Medicals Arts, 1998.
- Basketter, reynolds & York: Predicitive testing in Contact Dermatitis: Irritant Dermatitis. Elsevier Science Inc, 1997.
- Kligman, A.M.; Wooding, W.M. A method for the measurement and Evaluation of Irritants of Human Skin. J. Invest Dermatol. 49:78-94, 1967.
- Maibach, H.I.; Epstein, W.L. Predicitive Patch testing for Sensitization and irritation. Am. Perf. And Cosm.80:55-56.1965.
- Maibach, H.I.; Marzulli, F.N. Dermatotoxicology. Fifth Edition. Taylor and Francis Publishers, 1996.
- Jackson, E.M.; Goldner, R. irritant Contact Dermatitis. Marcel Dekker, INC, 1990.
- Walker, A.P.; Basketter, D.A.; Baverel, M. e col. Test Guidelines for the Assessment of
- Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients in Man. Food and Chemical Toxicology. 35: 1099-1106, 1997.
- Rietschel R.L, Towler, J.F.J. Fisher's Contact Dermatitis. Fifth Edition. Lizriwot Williams & Williams.
- Cosmetics & Toiletries magazine. Vol.119, no. 3/March 2004.
- Basile A.C.; Sertié J.A.; Freitas P.C.; Zanini A.C. – J Ethnopharmacol, 22:1, 1988Jan, 101-9.
- HAMMER et al – Journal of Ethnopharmacology, 40:53 – 75. 1993; P.
- GRENARD et al – Pharmacopés Tradicionalles en Guyane, Orstom, Paris, pp. 289-290. 1987.

Digitalizado com CamScanner