

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1)
Screeners

Acknowledgements

Translation of this document was performed by Suaad Sayed Moussa, MD, Professor of Psychiatry, Kasr Alaini Medical School – Cairo University; and Muhammad Nashaat, MSc, Assistant Lecturer of Psychiatry, Kasr Alaini Medical School – Cairo University.

مقياس التقرير الذاتى المسحى لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين (النسخة الاولى) (ايه اس آر اس -فى
(١.١)

هل تعيش مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين؟

الاسئلة ادناه يمكن ان تساعدك على معرفة ذلك

كثير من الراشدين يعيشون اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين ولا يدركون ذلك . لماذا ؟ لأن أعراضه غالبا ما يتم اعتبارها خطأ ضغط حياتية.

إذا كنت قد شعرت بهذا النوع من الاحباط أغلب حياتك ،قد يكون لديك اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين وهى حالة يمكن أن ييساعدك الطبيب فى تشخيصها وعلاجها

الاستبيان التالى يمكن استخدامه كنقطة انطلاق لمساعدتك على التعرف على علامات/ أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين .
ولكن ليس المقصود أن يحل محل استشارة طبيب (اخصائى رعاية صحية مدرب) . (فالوصول الى التشخيص الدقيق يتم فقط من خلال التقييم السريري . وبغض النظر عن نتائج الاستبيان ، إذا كان لديك مخاوف بشأن تشخيصو علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين ، يرجى مناقشة مخاوفك مع طبيبك.

مقياس التقرير الذاتى المسحى لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين (النسخة الاولى) يستهدف الاشخاص من الفئة العمرية 18 سنة وما فوقها

مقياس التقرير الذاتى المسحى لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة للراشدين منظمة الصحة العالمية 2

من المقابلة التشخيصية الدولية المركبة لمنظمة الصحة العالمية

النسخة الأولى (ايه اس ار اس- فى 1,1)

التاريخ:

ضع علامة فى المربع الذى يمثل أفضل وصف لكيف كان شعورك وحالك على مدى الـ ٦ اشهر الماضية يرجى اعطاء الاستبيان بعد ملئه الى طبيبك (اخصائى الرعاية الصحية الخاص بك) خلال زيارتك القادمة لمناقشة النتائج	ابدا	نادرا	احيانا	كثيرا	كثيرا جدا
1 - الى اى مدى تواجه مشكلة فى اختتام التفاصيل النهائية لمشروع ، بمجرد انجاز أجزاءه التى بها تحدى؟ 2 - الى اى مدى لديك صعوبة فى ترتيب الاشياء عندما يكون عليك مهمة تتطلب تنظيم ؟ 3 - الى اى مدى لديك مشاكل فى تذكر المواعيد أو الالتزامات ؟ 4 - عندما يكون لديك مهمة تتطلب الكثير من التفكير ، الى أى مدى تتجنب أو تأخر البدء فيها؟ 5 - الى أى مدى ما تتأملل أو تتلوى يديك أو قدميك عندما يكون عليك الجلوس لفترة طويلة ؟ 6 - الى اى مدى تشعر بنشاط مفرط و انك مضطر أن تفعل أشياء ، كما لو كنت مدفوع بواسطة محرك ؟					

إجمع عدد العلامات التى تظهر فى المنطقة المظلمة بلون غامق ،أربع (4) علامات أو أكثر تشير إلي أن الأعراض قد تكون متسقة مع إضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة للراشدين وقد يكون من المفيد أن تتحدث مع طبيبك(مقدم الرعاية الصحية) من أجل تقييم إكلينيكي.

قيمة الفحص المسحي للراشدين الذين يعانون من اضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة ADHD

تشير البحوث إلي أن أعراض اضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة يمكن أن تستمر لدى الراشدين, ويكون لها تأثير دال علي العلاقات , والعمل ,وحتى السلامة الشخصية للمرضي الذين قد يعانون من و لأن هذا الإضطراب غالبا ما يساء فهمه , فإن كثير ممن يعانون من هذا الاضطراب لا يحصلون علي العلاج المناسب ونتيجة لذلك , قد لا يستفيدون من كامل إمكانياتهم جزء من المشكلة يمكن أن يكون صعوبة تشخيص المرض وخاصة في الراشدين .

وقد تم وضع مقياس التقرير الذاتي المسحي لاضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة للراشدين (النسخة الأولى) مقياس (ASRS V1.1) ونظام تصحيحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجموعة العمل لاضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة لدي الراشدين , ويتكون الفريق من الأطباء النفسيين والباحثين :

لينارد أدلر , MD

أستاذ مشارك في طب النفس والأعصاب

جامعة نيويورك – كلية الطب

رونالد كيسلر , Ph D

أستاذ قسم سياسة الرعاية الصحية

كلية الطب بجامعة هارفارد

توماس سبنسر , MD

أستاذ مشارك في الطب النفسي

كلية الطب بجامعة هارفارد

كم تخصص للرعاية الصحية , يمكنك استخدام مقياس التقرير الذاتي المسحي لاضطراب نقص الإنتباه و فرط الحركة للراشدين ايها سار ١.١ (ASRSV1.1) كأداة مسحية لاضطراب لدي المرضي الراشدين . الدلائل المكتسبة من خلال هذا المسح قد تشير إلي الحاجة إلي فحص إكلينيكي أكثر تعمقا مع طبيب مختص .

الأسئلة في المقياس ايه اس ار- اس في ١.١ (ASRS V1.1) تتفق مع معايير الدليل التشخيصي والإحصائي الرابع دي اس ام ٤ (-DSM)

(IV) , ومظاهر أعراض اضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة ADHD لدي الراشدين , ويعكس محتوى الإستبيان أيضا الأهمية التي يضعها دي اس ام ٤ علي الأعراض والإختلال , والتاريخ الإكلينيكي للوصول إلي التشخيص الصحيح .

الإجابة علي المقياس المسحي تستغرق أقل من 5 دقائق ويمكن أن توفر معلومات تكميلية تعد حاسمة لعملية التشخيص .

المراجع :

1. شفاينزر ي.ب , كيمنز ت.ك , كاتس س.ا
اضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة . العيادات الطبية لشمال أمريكا

2001: 85 (3) 11-10 , 757 – 777

2. باركلي ر. ا , إضطراب نقص الإنتباه وفرط الحركة كتيب للتشخيص والعلاج (النسخة الثانية) 1998

3. بيدرمان ج , فارون س.ف , سبنسرت , ويلنر ت ,
نورمان د , لابي ك . ا , وآخرون . أنماط الإعتلال المشترك للإضطرابات النفسية والإدراك والأداء النفس
إجتماعي . في الراشدين الذين يعانون من إضطراب نقص الإنتباه و فرط الحركة ,المجلة
الأمريكية للطب النفسي 1993:150:1792-1798

4. الجمعية الأمريكية للطب النفسي الدليل التشخيصي والإحصائي للإضطرابات العقلية
(الطبعة الرابعة مراجعة النص) . واشنطن , DC. 2000:85-93 .

تمت الترجمة بواسطة:

أ.د/ سعاد سيد موسى

استاذ الطب النفسي

كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة

د/ محمد نشأت

مدرس مساعد الطب النفسي

كلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة

Translated by:

Suaad Sayed Moussa

Professor of Psychiatry, MD

Kasr Alaini School of Medicine

Cairo University

Muhammad Nashaat

Assistant Lecturer of Psychiatry, MSc

Kasr Alaini School of Medicine

Cairo University