

Problemas de Aproximación a las soluciones de sistemas de ecuaciones no lineales.

- (1) El sistema no lineal:

$$\left. \begin{aligned} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 &= 0, \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 &= 0, \end{aligned} \right\}$$

se puede transformar en un problema de punto fijo:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= g_1(x_1, x_2) = \frac{x_1^2 + x_2^2 + 8}{10}, \\ x_2 &= g_2(x_1, x_2) = \frac{x_1x_2^2 + x_1 + 8}{10}. \end{aligned} \right\}$$

- a) Demostrar que la función $\mathbf{G} = (g_1, g_2)^\top$ tiene un único punto fijo en el dominio:

$$\mathbf{D} = \{(x_1, x_2)^\top \mid 0 \leq x_1, x_2 \leq 1.5\}.$$

- b) Aplicar la iteración del método del punto fijo para aproximar la solución aproximada del sistema no lineal con una tolerancia de 10^{-5} en la norma $\|\cdot\|_2$.
c) ¿Mejora la convergencia aplicar la aceleración de Gauss-Seidel?

- (2) Demostrar que las funciones $\mathbf{G} : \mathbf{D} \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tiene un único punto fijo en el dominio correspondiente \mathbf{D} . Aplicar la iteración del punto fijo para hallar dicho punto fijo con una tolerancia de 10^{-5} en la norma $\|\cdot\|_2$.

- a)

$$\mathbf{G}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{\cos(x_2x_3) + 0.5}{3}, \frac{1}{25} \sqrt{x_1^2 + 0.3125} - 0.03, -\frac{1}{20} e^{-x_1x_2} - \frac{10\pi - 3}{6} \right)^\top,$$

en el dominio

$$\mathbf{D} = \{(x_1, x_2, x_3)^\top, \mid -1 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3\}.$$

- b)

$$\mathbf{G}(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{3} \cos(x_2x_3) + \frac{1}{6}, -\frac{1}{9} \sqrt{x_1^2 + \sin(x_3) + 1.06} - 0.1, -\frac{1}{20} e^{-x_1x_2} - \frac{10\pi - 3}{6} \right)^\top,$$

en el dominio

$$\mathbf{D} = \{(x_1, x_2, x_3)^\top, \mid -1 \leq x_i \leq 1, i = 1, 2, 3\}.$$

- (3) Usar el método de Newton-Raphson con $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ para calcular una aproximación de los sistemas siguientes no lineales con una tolerancia de 10^{-6} usando la norma $\|\cdot\|_2$:

- a)

$$\left. \begin{aligned} \sin(4\pi x_1x_2) - 2x_2 - x_1 &= 0, \\ \left(\frac{4\pi-1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 &= 0. \end{aligned} \right\}$$

- b)

$$\left. \begin{aligned} 5x_1^2 - x_2^2 &= 0, \\ x_2 - 0.25(\sin(x_1) + \cos(x_2)) &= 0. \end{aligned} \right\}$$

- c)

$$\left. \begin{aligned} 10x_1 - 2x_2^2 + x_2 - 2x_3 - 5 &= 0, \\ 8x_2^2 + 4x_3^2 - 9 &= 0, \\ 8x_2x_3 + 4 &= 0. \end{aligned} \right\}$$

- (4) El siguiente sistema no lineal:

$$\left. \begin{aligned} 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} &= 0, \\ x_1^2 - 625x_2^2 - \frac{1}{4} &= 0, \\ e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi-3}{3} &= 0, \end{aligned} \right\}$$

tiene una matriz jacobiana singular en la solución. Es decir, el determinante de la matriz jacobiana en la solución vale 0. Aplicar el método de Newton-Raphson con $\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1, -1)^\top$ para hallar una solución aproximada con una tolerancia de 10^{-5} . Observar la lentitud de la convergencia.

- (5) Usar el método del gradiente descendente con una tolerancia de 0.05 usando la norma $\|\cdot\|_2$ para hallar una aproximación de los sistemas no lineales siguientes:

a)

$$\left. \begin{aligned} 3x_1^2 - x_2^2 &= 0, \\ 3x_1x_2^2 - x_1^3 - 1 &= 0. \end{aligned} \right\}$$

b)

$$\left. \begin{aligned} \sin(4\pi x_1x_2) - 2x_2 - x_1 &= 0, \\ \left(\frac{4\pi-1}{4\pi}\right)(e^{2x_1} - e) + 4ex_2^2 - 2ex_1 &= 0. \end{aligned} \right\}$$

- (6) Usar el método del gradiente descendente con una tolerancia de 0.005 usando la norma $\|\cdot\|_2$ para hallar el mínimo de las funciones siguientes:

a) $g(x_1, x_2) = \cos(x_1 + x_2) + \sin(x_1) + \cos(x_2).$

b) $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1 - 2.5x_2 - x_3 + 2.$