

texnap — provider eval

Score each output against the image above it. Scores are kept in this browser, so you can close and come back.

Provider	Exact	Close	Wrong	Unscored	API errors	Median latency
Google (Gemini)	2/3	1	0	0	0	1994 ms

Screenshot 2026-09-26 at 19.39.46.png

Source

Démonstration. (à développer en exercice.)

- $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } \emptyset = f^{-1}(\emptyset).$
- Soit $f^{-1}(A') \in f^{-1}(\mathcal{F}')$, on a $(f^{-1}(A'))^c \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } (f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c) \text{ où } A'^c \in \mathcal{F}' \text{ car } A' \in \mathcal{F}' \text{ et } \mathcal{F}' \text{ est une tribu.}$
- En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}')$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$.

Rendered

Démonstration. (à développer en exercice.)

- $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } \emptyset = f^{-1}(\emptyset).$
- Soit $f^{-1}(A') \in f^{-1}(\mathcal{F}')$, on a $(f^{-1}(A'))^c \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } (f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c) \text{ où } A'^c \in \mathcal{F}' \text{ car } A' \in \mathcal{F}' \text{ et } \mathcal{F}' \text{ est une tribu.}$
- En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}')$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$.

LaTeX

```
\textit{Démonstration. (à développer en exercice.)}

\begin{itemize}
  \item $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ car $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$.
  \item Soit $f^{-1}(A') \in f^{-1}(\mathcal{F}'), on a $(f^{-1}(A'))^c \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ car $(f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c)$ où $A'^c \in \mathcal{F}'$ car $A' \in \mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}'$ est une tribu.
  \item En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}'), alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}').
\end{itemize}
```

Via Google (Gemini) - 3.0s

Copy LaTeX

Google (Gemini) 2799 ms

ExactCloseWrong

Démonstration. (à développer en exercice.)

- $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } \emptyset = f^{-1}(\emptyset).$
- Soit $f^{-1}(A') \in f^{-1}(\mathcal{F}')$, on a $(f^{-1}(A'))^c \in f^{-1}(\mathcal{F}') \text{ car } (f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c) \text{ où } A'^c \in \mathcal{F}' \text{ car } A' \in \mathcal{F}' \text{ et } \mathcal{F}' \text{ est une tribu.}$
- En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}')$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$.


```
\textit{Démonstration. (à développer en exercice.)}

\begin{itemize}
  \item $\emptyset \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ car $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$.
  \item Soit $f^{-1}(A') \in f^{-1}(\mathcal{F}'), on a $(f^{-1}(A'))^c \in f^{-1}(\mathcal{F}')$ car $(f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c)$ où $A'^c \in \mathcal{F}'$ car $A' \in \mathcal{F}'$ et $\mathcal{F}'$ est une tribu.
  \item En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}'), alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}').
\end{itemize}
```

$\in f^{-1}(\mathcal{F}')$ car $(f^{-1}(A'))^c = f^{-1}(A'^c)$ où $A'^c \in \mathcal{F}'$ car $A' \in \mathcal{F}$ et $\mathcal{F}'$ est une tribu.

En raisonnement de même, montrer que si $(f^{-1}(A'_i))_{i \in \mathbb{N}}$ est une famille d'éléments de $f^{-1}(\mathcal{F}')$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} f^{-1}(A'_i) \in f^{-1}(\mathcal{F}')$.

Screenshot 2026-09-27 at 14.06.50.png



Google (Gemini) 1944 ms

Exact


Close

Wrong

$$\forall a \in U, \forall \varepsilon > 0, \exists x \in D \text{ tel que } \|x - a\| < \varepsilon,$$

$\forall a \in U, \forall \varepsilon > 0, \exists x \in D \text{ tel que } \|x - a\| < \varepsilon,$

Screenshot 2026-09-27 at 14.08.08.png



Google (Gemini) 1994 ms

Exact

Close

Wrong

Posons : $r = R - \|x - a\| > 0$. Soit maintenant $y \in B(x, r)$. Alors,

$$\|y - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < r + \|x - a\| = R.$$

Posons : $r = R - \|x - a\| > 0$. Soit maintenant $y \in B(x, r)$. Alors,

$$\|y - a\| \leq \|y - x\| + \|x - a\| < r + \|x - a\| = R.$$