

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית בנושא הרזולטנט

אליסף לרר

ת.ז. 308376458

מנחה : אלעד פארן

תוכן העניינים :

1.....	הקדמה
2.....	מטריצת סילבסטר
6.....	משפט הרזולטנט
14.....	תוצאות ממשפט הרזולטנט
19.....	בבליוגרפיה

הקדמה

במבניים אלגבריים לומדים שבהינתן שני פולינומים ע"י האלגוריתם של אוקלידס ניתן למצוא את המחלק המשותף המירבי שלהם, ע"י המחלק המשותף המירבי ניתן למצוא את השורשים המשותפים של שני הפולינומים. בעבודה זו נרצה להוכיח דרך נוספת לדעת האם לשני פולינומים יש מחלק שורשים משותפים בדרך פשוטה יותר ללא צורך להשתמש באלגוריתם של אוקלידס, אמנם לא נקבל מהם השורשים, אבל בדרך הרבה יותר פשוטה נוכל לדעת האם יש שורשים. ובנוסף (לא בעבודה זו) בדרך שבה נוכיח בעבודה זו ניתן להרחיב לפולינומים בכמה משתנים, כלומר ניתן לדעת האם לשני פולינומים בכמה משתנים יש שורשים משותפים. ונציין שהאלגוריתם של אוקלידס טוב רק לפולינומים במשתנה יחיד ולא בכמה משתנים. תחילה נזכיר בקצרה את הגדרת הדטרמיננטה לפי תמורות, ונגדיר את מטריצת סילבסטר, ובהמשך נגדיר את הרזולטנט ונוכיח את משפט הרזולטנט (פרק 2) שהוא החלק העיקרי של העבודה. את המשפט עצמו מתי לשני פולינומים יש שורשים משותפים נוכיח בפרק 3, וכן נוכיח עוד כמה תוצאות מעניינות שנובעות מידי ממשפט הרזולטנט.

פרק 1.

מטריצת סילבסטר

פרק זה הוא פרק קצר שבו נזכיר בקצרה את הגדרת הדטרמיננטה לפי תמורות ומטריצת סילבסטר של שני פולינומים, ובסוף הפרק נגדיר את הרזולטנט.

הגדרות אלו ילוו אותנו לאורך כל העבודה פעמים במשפטים עצמם ופעמים בהוכחות של המשפטים.

הגדרה 1.1 הגדרת הדטרמיננטה לפי תמורות^[1]

תהי $A = (\alpha_{i,j})$ מטריצה מגודל $n \times n$

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha_{1,\sigma(1)} \alpha_{2,\sigma(2)} \cdots \alpha_{n,\sigma(n)}.$$

הסכום הוא על $n!$ התמורות σ של המספרים $\{1, 2, \dots, n\}$, ו- $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ אם התמורה זוגית, ו- $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ אם התמורה אי-זוגית.

נעבור לדוגמא:

תהי מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

נחשב את $\det(A)$ לפי הגדרה 1.1.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in S_3$$
 נבחר לדוגמא את תמורת הזהות S_3

תמורת הזהות היא זוגית ולכן $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$, ובסה"כ מתמורת הזהות נקבל את המכפלה $2 \cdot 2 \cdot 3$.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_3$$
 נבחר תמורה נוספת S_3 , ע"י פירוק לחילופים נקבל את $\operatorname{sgn}(\sigma)$,

$$(132) = (13)(21).$$

קבלנו $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ ולכן בסה"כ מתמורה זו נקבל את המכפלה $1 \cdot 4 \cdot 5$.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \in S_3$$
 תמורה נוספת לדוגמא S_3 , זהו חילוף ולכן $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$ ובסה"כ מתמורה זו נקבל את המכפלה $-3 \cdot 4 \cdot 3$.

ולאחר חישוב כל התמורות האחרות נקבל

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_3} \operatorname{sgn}(\sigma) \alpha_{1,\sigma(1)} \alpha_{2,\sigma(2)} \cdots \alpha_{n,\sigma(n)} \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 3 \cdot 5 - 3 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot 5 \\ &= 12 - 30 - 36 + 9 - 2 + 20 = 25. \end{aligned}$$

הגדרה 1.2 מטריצת סילבסטר

היו שני פולינומים $f(x), g(x)$, מעל שדה K .

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$
 נסמן

מטריצת סילבסטר של f, g מסומנת ע"י $\text{Syl}(f, g) = \text{Syl}_{n,m}(f, g)$, היא מטריצה מוגדלת $(n+m) \times (n+m)$ המוגדרת ע"י

$$\text{Syl}(f, g) = \begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

ב- m השורות הראשונות יש את המקדמים של f באופן הבא:

בשורה הראשונה מתחילים מהמקום הראשון עם a_n , בעמודה שלאחריה a_{n-1} , וכן הלאה עד a_0 . בפולינום f יש n איברים ולכן בסה"כ יתמלאו n העמודות הראשונות. נשארו m עמודות אותן נאכלס עם אפסים.

בשורה השנייה נבצע את אותו הדבר עם שינוי קטן: a_n יזוז אחד ימינה כלומר נתחיל את האיכלוס של התאים מהעמודה השנייה, ואת העמודה הראשונה נאכלס באפס. ובאופן הזה נמלא את שורות המטריצה כשכל פעם מתחילים מהעמודה הבאה, עד השורה ה- m שבה יהיו בהתחלה m אפסים ובסוף n איברי f .

באותו האופן נאכלס את n השורות האחרונות עם איברי הפולינום g . בשורה ה- $m+1$ את העמודה הראשונה נאכלס עם g_m , את העמודה השנייה עם g_{m-1} , וכך נמשיך עד העמודה ה- m , ואת שאר העמודות נאכלס באפסים. בשורה ה- $m+2$ נתחיל בעמודה השנייה עם g_m ואת העמודה הראשונה נאכלס באפס, ונמשיך באופן הזה כמו עם f .

נביא הגדרה נוספת כללית יותר.

יהיו f, g פולינומים ממעלה n, m בהתאמה. $\text{Syl}_{n,m}(f, g)$ מוגדרת באופן הבא: האיבר במיקום (i, j) שווה ל a_{n+i-j} כאשר $1 \leq i \leq m$ ו- $i - j \leq n$ או b_{i-j} אם $1 \leq i \leq m+n$ ו- $i \leq m$. אם $a_i = 0$ או $\deg(f) > n$ או $\deg(f) < 0$ ו- $b_i = 0$ אם $\deg(g) > m$ או $\deg(g) < 0$.

דוגמא:

$$\text{נגדיר } g(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0, f(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0.$$

במקרה זה $n = 3$ ו- $m = 2$, ולכן

$$\text{Syl}_{2,3}(f, g) = \begin{pmatrix} a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_2 & b_1 & b_0 & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

הבחנה 1.3

אם אחד הפולינומים f או g , ממעלה 0 אז $\text{Syl}(f, g)$ היא מטריצה משולשת.

הגדרה 1.4 הגדרת הרזולטנט

יהיו שני פולינומים $f(x), g(x)$ ממעלה n, m בהתאמה, מעל שדה F יהיו $n, m \in \mathbb{N}$.

נגדיר את הרזולטנט שלהם

$$R(f, g) = a_0b_0 \text{ אם } n = m = 0$$

בכל מקרה אחר

$$R(f, g) = \det(\text{Syl}_{n,m}(f, g)).$$

1.5 הערה

לפי הגדרה 1.4 $R(f, g)$ נקבע באופן חח"ע לפי f, g .

נרחיב את ההגדרה 1.4 לכל שני פולינומים ממעלה קטנה מ- n, m , עבור f נשלים עד למעלה n עם מקדמים 0, ובאותו אופן עבור g נשלים עד למעלה m עם מקדמים 0.

ובאופן הזה הגדרה 1.4 נכונה לכל שני פולינומים ממעלה קטנה או שווה ל- n, m .

באופן כללי נמשיך להשתמש בסימון $R(f, g)$, במקרים שנרצה להתייחס למימד בצורה מפורשת נציין זאת ע"י $R_{n,m}(f, g)$.

1.6 הבחנה

נבחין שבמקרה שגם $\deg(f) < n$ וגם $\deg(g) < m$, ב $\text{Syl}(f, g)$ נקבל עמודות אפסים ולכן $R_{n,m}(f, g) = 0$.

1.7 הערה

עבור שני פולינומים f, g מעל שדה K . נסיף לשדה F את המשתנים $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n$, ונסמן $F = K(a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n)$.

אם נסמן $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ו- $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ אז f ו- g הם פולינומים מעל F .

$\det(\text{Syl}(f, g))$ היא בעצמה איבר של F כלומר פולינום מעל השדה K במשתנים $a_0, \dots, a_n, b_0, \dots, b_n$.

ולכן נוכל להתייחס ל- $\det(\text{Syl}(f, g))$ כפולינום במשתנים אלו.

מכאן ולהבא, כשנזכיר את השדה F , כוונתנו ל- F כפי שהיא מוגדרת בהערה 1.7.

דוגמא:

עבור $f(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ ו- $g(x) = b_1 x + b_0$, נחשב את הדטרמיננטה של מטריצת סילבסטר

$$\begin{aligned} R(f, g) &= \det(\text{Syl}_{2,1}(f, g)) \\ &= \det \begin{pmatrix} a_2 & a_1 & a_0 \\ b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & b_1 & b_0 \end{pmatrix} = a_0 b_1^2 + a_2 b_0^2 - b_0 a_1 b_1. \end{aligned}$$

קיבלנו איבר בשדה F , שהוא פולינום ב-5 משתנים בלתי תלויים a_2, a_1, a_0, b_1, b_0 מעל השדה K .

1.8 משפט

יהיו $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ ו- $g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$ פולינומים מעל שדה F .

$R(f, g)$ הוא פולינום הומוגני עם מקדמים שלמים במקדמים a_i, b_i , כאשר עבור $a_0 \dots a_n$ המעלה היא m , ועבור $b_0 \dots b_m$ המעלה היא n .

הוכחה

הוכחה זו מתבססת על הגדרת הדטרמיננטה לפי תמורות.

נחזור ל $\text{Syl}(f, g)$, זוהי מטריצה מסדר $n+m \times n+m$, נתבונן באיבר כלשהוא בסכום הנתון בהגדרה 1.1 ונבחר $\sigma \in S_{n+m}$, המחומר בסכום מתקבל ע"י כפל בין איברי המטריצה כך שכל שורה וכל עמודה מופיעה בדיוק פעם אחת.

כלומר עבור $\sigma_{i_1, j_1} \dots \sigma_{i_{n+m}, j_{n+m}}$ אם $i_1 \neq i_2$ אז $j_1 \neq j_2$ לכל $1 \leq k < l \leq n+m$ ו- $i_k \neq i_l$ ולכן בסה"כ מספר האיברים במכפלה הינו כמספר השורות (או העמודות), וזה בדיוק $n+m$.

לפי הגדרה 1.2, מ- m השורות הראשונות מקבלים מקדמים של הפולינום $f(x)$, ומ- n השורות האחרונות מקבלים מקדמים מהפולינום $g(x)$, ובסה"כ סכום החזקות של σ הוא m מאיברי $f(x)$ ו- n מאיברי $g(x)$ כנדרש.

1.9 טענה

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F .

$$R_{n,m}(f, g) = (-1)^{nm} R_{m,n}(g, f) \quad (1.1).$$

הוכחה

נפתח בדיון אינדוקטיבי :

ניתן לעבור מ $\text{Syl}(f, g)$ ל $\text{Syl}(g, f)$, ע"י פעולות על שורות המטריצה, ולכן נבדוק מה יהיה המחיר לעבור מ $\text{Syl}(f, g)$ ל $\text{Syl}(g, f)$. נזכור שהחלפת שורות בין שורות המטריצה מחליפה את הסימן של הדטרמיננטה, ולכן נרצה לבדוק כמה החלפות בין השורות נדרש ע"מ להפוך בין f, g וזה יהיה הסימן המבוקש.

נעבור להוכחה.

ההחלפה בין השורות תיעשה באופן הבא :

את השורה הראשונה נעביר להיות בשורה השניה, את השניה לשלישית, וכן הלאה עד האחרונה. את האחרונה נעביר להיות השורה הראשונה.

בכתיב תמורות נקבל את המחזור

$$(r_1 r_2 \dots r_m r_{m+1} \dots r_{n+m}).$$

נבצע את המעגל הזה n פעמים. כך נקבל שהשורה הראשונה (של המטריצה המקורית) תהיה במקום ה $n+1$ ואז f תהיה ב m השורות האחרונות, והשורה ה m (של המטריצה מקורית) תהיה בשורה הראשונה כלומר g תהיה ב n השורות הראשונות (מספר השורות הוא $n+m$).

החתימה של מחזור באורך l הוא $l-1$ (הוכחת טענה זו חורגת ממסגרת המאמר הזה^[2]) וכל מחזור כזה הוא באורך $l = n+m-1$.

נבצע n מחזורים כאלו ע"מ להחליף בין f ל g ולכן בסה"כ נקבל שהסימן הוא

$$\left[(-1)^{(m+n-1)} \right]^n = (-1)^{(nm+n^2-n)} = (-1)^{nm}.$$

השוויון האחרון מתקיים כיון ש- $n^2 - n = n(n-1)$ תמיד מספר זוגי כי n זוגי או $n-1$ זוגי, ולכן $n^2 - n$ ו nm חולקים את אותה זוגיות.

פרק 2.

הרזולטנט

תחילה נציג כמה מוסכמות לפרק זה.

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \text{ ו- } g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j. \quad (1.7)$$

2. ללא הגבלת הכלליות, ניתן להניח ש F הוא שדה הפיצול של $f \cdot g$, כלומר F מכיל את כל השורשים של f ו- g .

3. $\xi_0 \dots \xi_n$ הם השורשים של f , ו $\eta_0 \dots \eta_m$ הם השורשים של g .

משפט 2.1 משפט הרזולטנט

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F .

אם $m = 0$ ו $n > 0$, $R(f, g) = a_0^m$.

אם $n = 0$ ו $m > 0$, $R(f, g) = b_0^n$.

אם $n = m = 0$, $R(f, g) = a_0 b_0$.

אם $n, m > 0$,

$$R_{n,m}(f, g) = a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j). \quad (2.1)$$

דוגמא

$$f(x) = x(x^2 - 4) = x(x+2)(x-2) = x^3 - 4x$$

$$g(x) = (x+1)(x-3) = x^2 - 2x - 3$$

נבחין כי השורשים של f הם $0, 2, -2$ והשורשים של g הם $3, -1$.

נסמן

$$\xi_1 = 0, \xi_2 = 2, \xi_3 = -2, \eta_1 = -1, \eta_2 = 3$$

נציב במשוואה (2.1) כאשר $a_n^m = 1^2, b_m^n = 1^3$.

$$((0 - (-1))(0 - 3))((2 - (-1))(2 - 3))((-2 - (-1))(-2 - 3)) = 45$$

קבלנו ש-

$$R(f, g) = 45$$

נחשב לפי הגדרה 1.1 את $\text{Syl}(f, g)$:

$$R(f, g) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

נבחין שמהשורה הראשונה תמיד נבחר את העמודה הראשונה או השלישית אחרת המכפלה תתאפס. ומאותו הטעם מהשורה החמישית נבחר את האיבר החמישי ולכן התמורות יהיו מהצורה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & & & & 5 \end{pmatrix} \text{ or } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & & & & 5 \end{pmatrix}$$

ביתר דיוק נקבל את התמורות הבאות:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{sgn}(\sigma)=1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{sgn}(\sigma)=-1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{sgn}(\sigma)=1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{sgn}(\sigma)=-1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}}_{\text{sgn}(\sigma)=1}.$$

“את הסימן רשמנו מתחת לתמורה”.

לאחר חישוב של המכפלות המתאימות נקבל

$$(-27) - (-36) + (48) - (-36) + (-48) = 45$$

כלומר במקרה זה מתקיים משפט 2.1.

כדי להוכיח את משפט 2.1, נוכיח תחילה שהוא שקול למשפט הבא.

משפט 2.2

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F .

$$I. R(f, g) = a_n^m \prod_{i=1}^n g(\xi_i).$$

$$II. R(f, g) = (-1)^{nm} b_m^n \prod_{j=1}^m f(\eta_j).$$

הוכחת משפט 2.2

טענה זו נובעת כמעט ישירות מהמשפט היסודי של האלגברה כי לפי זה ניתן לרשום את f, g כמכפלה של גורמים לינאריים מעל שדה F .

I. הוכחת

נרשום את g כמכפלה של גורמים לינאריים:

$$g(x) = b_m \prod_{j=1}^m (x - \eta_j).$$

נציב $\xi_0 \dots \xi_n$ ב g ונקבל

$$g(\xi_i) = b_m \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j). \quad (*)$$

משרשר השוויונות הבא נקבל את השוויון

$$a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j) = a_n^m \prod_{i=1}^n b_m \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j)$$

$$\text{hence } (*) = \boxed{a_n^m \prod_{i=1}^n g(\xi_i)}.$$

הוכחת II

תחילה נבחין שע"י הוצאת 1- מהביטוי $(\eta_j - \xi_i)$ נקבל את השוויון

$$a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j) = (-1)^{nm} b_m^n a_n^m \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n (\eta_j - \xi_i) .$$

מכאן נוכל להמשיך כמו בהוכחה של I. נרשום את f כמכפלה של גורמים לינאריים

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \xi_i) . \quad (**)$$

נציב $\eta_0 \dots \eta_m$

$$f(\eta_j) = a_n \prod_{i=1}^n (\eta_j - \xi_i) .$$

ולכן שוב משרשור השוויונות הבא נקבל

$$\begin{aligned} a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j) &= (-1)^{nm} b_m^n a_n^m \prod_{j=1}^m \prod_{i=1}^n (\eta_j - \xi_i) \\ &= (-1)^{nm} b_m^n \prod_{j=1}^m a_n \prod_{i=1}^n (\eta_j - \xi_i) \\ \text{hence } (**) &= \boxed{(-1)^{nm} b_m^n \prod_{j=1}^m f(\eta_j)} . \end{aligned}$$

כנדרש.

נעבור עכשיו להוכחת משפטים 2.1 ו 2.2, תחילה נוכיח שתי טענות עזר שנצטרך להם בהוכחה.

טענה עזר 2.3

יהיו f, g פולינומים ממעלה m, n בהתאמה כך שמתקיים $m \leq n$, ויהי h פולינום כך ש $\deg(h) \leq n - m$. מתקיים

$$R(f + hg, g) = R(f, g) .$$

באופן סימטרי אם $n \leq m$ אז עבור h כך ש $\deg(h) \leq m - n$ מתקיים

$$R(f, g + hf) = R(f, g) .$$

הוכחה

ההוכחה באינדוקציה על המעלה של h , נניח ש $k \leq n - m$ ונסמן $h = \sum_{\rho=0}^k h_\rho x^\rho$, נוכל להניח ללא הגבלת כלליות ש $k = n - m$ ע"י הגדרת $h_\rho = 0$ לכל שאר החזקות.

תחילה נוכיח שהמשפט מתקיים עבור מונום יחיד cx^ρ עם $\rho \in \mathbb{N}$, ובפרט הוא מתקיים עבור $h_\rho x^\rho$.

מכיון ש $m < n$, לפי הגדרת מטריצת סילבסטר נקבל

$$\begin{pmatrix} a_n + cb_{n-\rho} & a_{n-1} + cb_{n-\rho-1} & a_{n-2} + cb_{n-\rho-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_n + cb_{n-\rho} & a_{n-1} + cb_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 + cb_1 & a_0 + cb_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 + cb_2 & a_1 + cb_1 & a_0 + cb_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix} = R(f + (cx^\rho)g, g)$$

הביטוי $n - \rho$ נובע מכך שהכפל cx^ρ מזיז ב g מקומות את המונומים של g מקומות כי $cx^\rho b_j x^j = cb_j x^{j+\rho}$. לאחר הצבה $i = j + \rho$ נקבל $j = i - \rho$ כלומר המקדם של החזקה i הוא $b_{i-\rho}$.

כיון ש $\rho < n - m$, כל אחד מ m השורות הראשונות ב $\text{Syl}(f + cx^\rho g, g)$ הוא סכום של אותה שורה מוכפלת ב c עם אחת השורות מ- n השורות האחרונות.

במילים אחרות ניתן לעבור מ $\text{Syl}(f, g)$ ל $\text{Syl}(f + cx^\rho g, g)$ ע"י פעולות של הוספת קומבינציה לינארית של שורות אחרות על שורה במטריצה. אבל הוספת קומבינציה לינארית של שורות לשורה אחרת במטריצה לא משנה את הדטרמיננטה לכן

$$\boxed{R(f + (cx^\rho)g, g) = R(f, g)}$$

עתה נשלים את ההוכחה למקרה הכללי.

נניח שהטענה נכונה עבור פולינום ממעלה $k - 1$ ונוכיח אותה עבור פולינום ממעלה k .

צעד האינדוקציה:

$$\begin{aligned} \boxed{R(f + hg, g)} &= \det \left(\text{Syl} \left(f + \left(\sum_{l=1}^k h_l x^l \right) g, g \right) \right) \\ &= \det \left(\text{Syl} \left(f + \left(\sum_{l=1}^{k-1} h_l x^l \right) g + (h_k x^k) g, g \right) \right) \\ \text{step induction} &= \det (\text{Syl}(f + (h_k x^k)g, g)) \\ \text{case monom} &= \det (\text{Syl}(f, g)) \\ &= \boxed{R(f, g)} \end{aligned}$$

כנדרש.

המקרה השני $R(f, g + hf) = R(f, g)$ מתקבל באותו האופן.

טענת עזר 2.4

I. אם $\deg(g) \leq k \leq m$ אז

$$R_{n,m}(f, g) = a_n^{m-k} R_{n,k}(f, g) .$$

II. אם $\deg(f) \leq k \leq n$ אז

$$R_{n,m}(f, g) = (-1)^{(n-k)m} b_m^{n-k} R_{k,m}(f, g) .$$

הוכחה

ההוכחה מתבססת על כך שאם המקדם של החזקה הגבוהה ביותר הוא 0 אז התת מטריצת המתקבלת ע"י מחיקת השורה הראשונה והעמודה הראשונה היא מטריצת סילבסטר.

כלומר נניח ש $b_m = 0$ אז

$$\text{Syl}(f, g) = \begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_1 & a_0 \\ 0 & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

ניתן להבחין שאם נמחק את השורה הראשונה והעמודה הראשונה נקבל את המטריצה

$$\text{Syl}(f, \hat{g}) = \begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_{m-1} & b_{m-2} & b_{m-3} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

כאשר $\hat{g}(x) = \sum_{j=0}^{m-1} b_j x^j$, מכיון ש $b_m = 0$, $\hat{g}(x) = g(x)$, לכן אם נפתח את הדטרמיננטה $R(f, g)$ לפי העמודה הראשונה נקבל:

$$\boxed{R(f, g)} = a_n R_{n,m}(f, \hat{g}) = \boxed{a_n R_{n,m-1}(f, g)}.$$

באופן כללי אם $b_i = 0$ עבור כל i כך ש- $r \leq i < m$ אז

$$\begin{aligned} R(f, g) &= a_n R_{n,m-1}(f, g) \\ &= a_n a_n R_{n,m-2}(f, g) \\ &= \left(\underbrace{a_n a_n \dots a_n}_{r \text{ times}} \right) R_{n,m-r}(f, g) \\ &= a_n^r R_{n,m-r}(f, g) \end{aligned}$$

נסמן $m - r = k$ ונקבל $R(f, g) = a_n^{m-k} R_{n,k}(f, g)$ כנדרש.

הוכחת II.

לפי 1.9

$$R(f, g) = (-1)^{nm} R_{m,n}(g, f)$$

לפי I והתנאי ש $\deg(f) < k < n$ נקבל

$$(-1)^{nm} R_{m,n}(g, f) = (-1)^{nm} b_m^{n-k} R_{m,k}(g, f) .$$

שוב לפי משוואה 1.9

$$R_{m,k}(g, f) = (-1)^{km} R_{k,m}(f, g)$$

נציב ונקבל

$$\begin{aligned} (-1)^{nm} R_{m,n}(g, f) &= (-1)^{nm} b_m^{n-k} (-1)^{km} R_{k,m}(f, g) \\ &= (-1)^{m(n+k)} b_m^{n-k} R_{k,m}(f, g) . \end{aligned}$$

ומכיון של $n+k$ ו $n-k$ חולקים אותה זוגיות, נקבל לאחר כל השווינויות

$$R(f, g) = (-1)^{m(n-k)} b_m^{n-k} R_{k,m}(f, g)$$

כנדרש.

2.1 הוכחת משפט

ההוכחה באינדוקציה על הגודל של המטריצה $n+m$.

לפי המוסכמות בראש הפרק והמשפט היסודי של האלגברה, נוכל לרשום את f ו- g כמכפלה של גורמים לינאריים

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \xi_i) \quad g(x) = b_m \prod_{j=1}^m (x - \eta_j) .$$

בסיס האינדוקציה:

עבור $m = n = 0$ הטענה מתקיימת לפי ההגדרה של $Syl(f, g)$.

עבור המקרה $n = 0$ ו $m > 0$, לפי הבחנה 1.3,

$$R(f, g) = b_0^n .$$

בדומה עבור $m = 0$ ו $n > 0$

$$R(f, g) = a_0^m .$$

עתה נניח ש- $0 < m - n$

לפי המוסכמות בראש הפרק והמשפט היסודי של האלגברה, נוכל לרשום את f ו- g כמכפלה של גורמים לינאריים

$$f(x) = a_n \prod_{i=1}^n (x - \xi_i) \quad g(x) = b_m \prod_{j=1}^m (x - \eta_j) .$$

הנחת האינדוקציה:

נניח שמשפט 2.1 נכון לכל מטריצה ממעלה קטנה מ $n+m$.

מקרה 1:

$$0 < n = \deg(f) \leq m = \deg(g)$$

קיימים פולינומים r ו- q עם $\deg(r) < \deg(f)$ כך ש-

$$g = qf + r.$$

נבחין כי

$$\deg(g - r) = \deg(qf)$$

ולכן נקבל את השוויונות הבאים:

$$\deg(q) = \deg(qf) - \deg(f) = \deg(g - r) - n = m - n.$$

קבלנו $\deg(q) = m - n$, לכן נוכל להשתמש בטענת עזר 2.3: נקבל

$$R(f, g) = R(f, g - qf) = R(f, r). \quad (*)$$

נחלק שוב את המקרים.

מקרה א. $r \neq 0$

נסמן $k = \deg(r) \geq 0$

מהנחת האינדוקציה וטענת עזר 2.4,

$$R_{n,m}(f, r) \stackrel{2.5}{\cong} a_n^{m-k} R_{n,k}(f, r) \stackrel{\text{base induction}}{\cong} a_n^{m-k} a_n^k \prod_{i=1}^n r(\xi_i) = a_n^m \prod_{i=1}^n g(\xi_i) \quad (**)$$

כאשר השוויון האחרון נובע מכך ש- ξ_i הם שורשים של f , ולכן

$$\boxed{g(\xi_i)} = \underbrace{q(\xi_i)f(\xi_i)}_{=0} + r(\xi_i) = \boxed{r(\xi_i)}.$$

מ $(*)$ ו- $(**)$ נקבל את הנדרש.

מקרה ב. $r = 0$.

אז

$$g = fq.$$

מכיון שהנחנו ש- $n > 0$ מתקיים

$$R(f, r) = R(f, 0) = 0$$

על פי מה שהוכחנו לעיל.

ולכן

$$R(f, g) = 0.$$

מצד שני כיון ש f מחלק את g השורשים של f הם גם שורשים של g , ולכן בנוסחה 2.1, קיימים ξ_i ו η_j כך ש $\xi_i = \eta_j$, מכאן שמכפלת הגורמים (2.1) מתאפסת, ומתקיים השוויון הנדרש.

מקרה 2.

$$m = \deg(g) < n = \deg(f)$$

כמו במקרה הקודם קיימים q ו r עם $\deg(r) < m$ כך ש-

$$f = gq + r$$

ומאותם נימוקים כמו במקרה הקודם

$$R(f, g) = R(f - gq, g) = R(r, g). \quad (***)$$

ופה נחלק שוב את המקרים

מקרה א. $r \neq 0$

נסמן $k = \deg(r) \geq 0$, ומהנחת האינדוקציה וטענת עזר 2.4 נקבל

$$\begin{aligned} \boxed{R_{n,m}(r, g)} &= (-1)^{(n-k)m} b_m^{n-k} R_{k,m}(r, g) \quad (****) \\ (\text{base induction}) &= \left((-1)^{(n-k)m} b_m^{n-k} \right) \left((-1)^{km} b_m^k \prod_{j=1}^m r(\eta_j) \right) \\ &= (-1)^{nm} b_m^n \prod_{j=1}^m r(\eta_j) \\ &= \boxed{(-1)^{nm} b_m^n \prod_{j=1}^m f(\eta_j)}, \end{aligned}$$

כאשר השוויון האחרון נובע מכך ש η_j הם שורשים של g , מה שגורר

$$f(\eta_j) = \underbrace{g(\eta_j) q(\eta_j)}_{=0} + r(\eta_j)$$

מ $(****)$ ו $(****)$ נקבל את הנדרש.

מקרה ב.

$$r = 0$$

דומה מאוד לאותו מקרה בהוכחה הקודמת

$$R(r, g) = R(0, g) = 0.$$

לכן

$$R_{n,m}(0, g) = 0$$

כיון ש- השורשים של g הם שורשים של f , נסיק כמקודם שמכפלה הגורמים (2.1) מתאפסת ונקבל את השוויון.

פרק 3.

תוצאות ממשפט הרזולטנט

בפרק זה נמשיך עם המוסכמות שבתחילת פרק 2.

טענה 3.1

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F אזי ל- f, g יש שורש משותף אם ורק אם $R(f, g) = 0$.

הוכחה

לפי משפט 2.1

$$R(f, g) = 0 \iff a_n^m b_m^n \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m (\xi_i - \eta_j) = 0.$$

וזה מתקיים אם ורק אם קיימים ξ_i ו- η_j כך ש- $\eta_j = \xi_i$, כלומר אם ורק אם ל- f ו- g יש שורש משותף.

טענה 3.2

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F , אזי ל- f, g יש גורם משותף אם ורק אם $R(f, g) = 0$.

הוכחה

צד אחד

\Leftarrow אם ל- f, g יש גורם משותף אז $R(f, g) = 0$.

אם ל- f, g יש גורם משותף, אז יש להם שורש משותף בשדה הפיצול של fg , וממשפט 2.1 נקבל את הטענה.

\Rightarrow $R(f, g) = 0$ אז ל- f ו- g יש גורם משותף.

אם $R(f, g) = 0$, מטענה 3.1, ל- f, g יש שורש משותף בשדה הפיצול של fg שנסמן α , אז $x - \alpha$ הוא גורם משותף של f ו- g ומכאן הטענה.

לצורך המשפט הבא נזכיר מהו מימד של מטריצה.

מימד של מטריצה הוא המימד שנפרס ע"י וקטורי השורות או העמודות של המטריצה. ונציין שבמקרה ושהשורות תלויות לינארית, המימד של המטריצה קטן מהגודל של המטריצה.

משפט 3.3

יהיו f, g פולינומים בשדה F .

נסמן ב- $h = \text{GCD}(f, g)$ את המחלק המשותף המירבי של f, g . אזי המעלה של המימד של $\text{Syl}(f, g)$ הוא $n + m - \deg(h)$ ובאופן שקול המעלה של המימד של המשלים של $\text{Syl}(f, g)$ הוא $\deg(h)$.

הערה: מכיון שגודל המימד של מטריצה וגודל המימד של המשלים תלויים אחד בשני, לפעמיים נתייחס רק לגודל של אחד מהם כשהכוונה לשניהם.

הוכחה

לפני שנכנסים לגוף ההוכחה נציין:

- (1) החלפה בין שורות המטריצה לא משנה את המימד שנפרס ע"י וקטורי השורות (או העמודות) של המטריצה.
- (2) $\text{Syl}(f, g)$ ו- $\text{Syl}(g, f)$ שוות פרט לסדר של השורות, ולכן המימד שלהן שווה, מכאן, נוכל להניח ללא הגבלת הכלליות ש- $m \leq n$.
- (3) קיימים r ו- q עם $\deg(r) < m$ כך ש- $f = qg + r$. בהוכחת טענת עזר 2.3, ראינו שאפשר לעבור מ- $\text{Syl}(f, g)$ ל- $\text{Syl}(f + (-qg), g)$ ו- $\text{Syl}(r, g)$ ע"י פועלות של הוספת קומבינציה לינארית של שורות לשורה אחרת במטריצה. ולכן המימד שלהם שווה.

רעיון ההוכחה:

נמצא את h לפי האלגוריתם של אוקלידס, ותוך כדי התהליך נקטין את גודל המטריצות ונוכיח שהמימד של המשלים של המטריצות המתקבלות לא משתנה, וכך (כפי שנראה בהוכחה עצמה) נמצא את המימד של המשלים של $\text{Syl}(f, g)$.

נחלק את ההוכחה לשלבים כדי להקל על הקורא להבין את ההוכחה.

שלב 1.

קיים q ו- r עם $k = \deg(r) < m$, כך ש-

$$f = qg + r.$$

מאידך,

$$\deg(q) = \deg(qg) - \deg(g) = n - m$$

מתקיים תנאי משפט 2.3, לכן לפי (2) המימד של $\text{Syl}_{n,m}(f, g)$ שווה למימד של $\text{Syl}_{n,m}(r, g)$.

שלב 2

נסמן $r = \sum_{l=0}^n v_l x^l$, ונתבונן ב $\text{Syl}_{n,m}(r, g)$, נבחין של- r יש $n - k$ מקדמים שהם אפסים ולכן $\text{Syl}_{n,m}(r, g)$ מהצורה:

$$\text{Syl}_{n,m}(r, g) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & v_{n-k-1} & v_{n-k-2} & v_{n-k-3} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & v_{n-k-1} & v_{n-k-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & v_1 & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & v_2 & v_1 & v_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}$$

בעמודה הראשונה יש רק איבר יחיד b_m , לכן וקטור זה שייך למימד שנפרש ע"י וקטורי העמודות, ולכן מחיקת העמודה הראשונה והשורה ה- $m + 1$ (השורה שבה יש את האיבר שאינו אפס בעמודה הראשונה) לא תשפיע על המימד של המשלים.

נובע מכך שהמימד של המשלים של $\text{Syl}_{n,m}(r, g)$ ו $\text{Syl}_{n-1,m}(r, g)$ שווים, כאשר $\text{Syl}_{n-1,m}(r, g)$ היא המטריצה שהתקבלה אחרי המחיקה של השורה והעמודה המתאימה.

שלב 3

נחזור שוב על שלב 2 (במקרה ש $n - k > 1$), על המטריצה $\text{Syl}_{n-1,m}(r, g)$, וכך נמשיך עד שנקבל את המטריצה $\text{Syl}_{k,m}(r, g)$, ולפי ההסבר בשלב 2 המימד של המשלים של המטריצות המתקבלות ע"י מחיקה העמודה והשורה המתאימות לא משתנה.

סיכום ביניים:

המימדים של המשלימים של $\text{Syl}_{n,m}(f, g)$, $\text{Syl}_{n,m}(r, g)$ ו $\text{Syl}_{k,m}(r, g)$ שווים, כאשר r הוא השארית של החלוקה של f ב g .

שלב 4

לפי (2) המימדים של $\text{Syl}_{k,m}(r, g)$ ו $\text{Syl}_{m,k}(g, r)$ שווים.

נבצע את שלבים 3 - 1 על $\text{Syl}_{m,k}(g, r)$, עם $k_0 = \deg(r_0) < k$ ו- q_0 המקיימים $g = rq_0 + r_0$.

נמשיך שוב ושוב את השלבים 3 - 1 (כלומר נבצע את האלגוריתם של אוקלידס) עד שנקבל r_d כך ש- $r_d = q_d r_{d-1} + r_d$ עם $r_{d-1} = h$, מהאלגוריתם של אוקלידס, נובע ש- $r_d = h$.

שלב 5

משלבים 3 ו 2 המימדים של המשלימים של $\text{Syl}_{k_0,k}(r_0, r)$, $\text{Syl}_{k_1,k_0}(r_1, r_0) \dots$, $\text{Syl}_{k_{d-1},l}(0, h)$, $\text{Syl}_{k,m}(r, g)$, $\text{Syl}_{n,m}(f, g)$ שווים.

ולכן נשאר לבדוק מהו המימד של המשלים של $\text{Syl}_{k_{d-1},l}(0, h)$ לפי הגדרת מטריצת סילבסטר למטריצה $\text{Syl}_{k_{d-1},l}(0, h)$ יש l שורות אפסים ו $d-1$ שורות בת"ל, לכן המימד של המשלים של $\text{Syl}_{k_{d-1},l}(0, h)$ הוא $l = \deg(h)$, זה מוכיח שהמימד של $\text{Syl}_{n,m}(f, g)$ הוא $n+m - \deg(h)$.

משפט 3.4

יהיו f, g פולינומים מעל שדה F .
יהי $v = (\alpha_{m-1}, \dots, \alpha_0, \beta_{n-1}, \dots, \beta_0)$ וקטור שורה מדרגה $n+m$.
מתקיים

$$v \text{Syl}_{n,m}(f, g) = 0$$

אם ורק אם $pf + qg = 0$ כאשר $p = \alpha_{m-1}x^{m-1} + \dots + \alpha_0x^0$ ו $q = \beta_{n-1}x^{n-1} + \dots + \beta_0x^0$.

הוכחה

נתבונן במכפלה $\gamma = v \text{Syl}_{n,m}(f, g)$

$$\gamma = (\alpha_{m-1}, \dots, \alpha_0, \beta_{n-1}, \dots, \beta_0) \begin{pmatrix} a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_1 & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & b_{m-2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_2 & b_1 & b_0 \end{pmatrix}$$

$$= \left(\underbrace{\alpha_{m-1}a_n + \beta_{n-1}b_m}_{\gamma_1}, \underbrace{\alpha_{m-1}a_{n-1} + \alpha_{m-2}a_n + \beta_{n-1}b_{m-1} + \beta_{n-2}b_m}_{\gamma_2}, \dots, \underbrace{\alpha_0a_0 + \beta_0b_0}_{\gamma_{n+m}} \right)$$

הרכיב ה j של γ מתקבל ע"י המכפלה

$$\gamma_j = (\alpha_{m-1}, \dots, \alpha_0, \beta_{n-1}, \dots, \beta_0) \begin{pmatrix} a_{n+1-j} \\ \vdots \\ a_{n+m-j} \\ b_{m+1-j} \\ \vdots \\ b_{n+m-j} \end{pmatrix}.$$

כאשר $1 \leq j \leq n+m$, נרשום γ_j כסכום של טורים, הטור הראשון הוא $\sum_{i=1}^m \alpha_{m-i}a_{n+i-j}$ ובטור השני האינדקס מתחיל $m+1$ ולכן נסמן $i = i - m$, ונקבל $\sum_{m+1}^{n+m} \beta_{n+m-i}b_{i-j}$ ולכן בסה"כ

$$\gamma_j = \sum_{i=1}^m \alpha_{m-i}a_{n+i-j} + \sum_{m+1}^{n+m} \beta_{n+m-i}b_{i-j}.$$

נוכיח ש-

$$pf + qg = \sum_j \gamma_j x^j$$

ובזה נסיים את ההוכחה.

נחקור את הביטוי

$$\gamma_j = \sum_{i=1}^m \alpha_{m-i} a_{n+i-j} + \sum_{i=m+1}^{n+m} \beta_{n+m-i} b_{i-j}$$

לשם כך נחשב כל אחד מהמחוברים בנפרד. נבצע החלפת אינדקסים $i = m - k$

$$\sum_{i=1}^m \alpha_{m-i} a_{n+i-j} = \sum_{k=0}^{m-1} \alpha_k a_{n+m-k-j} = \sum_{k=0}^m \alpha_k a_{n+m-k-j}$$

(השוויון האחרון נובע מכך ש $\alpha_m = 0$).

בדומה עבור הביטוי השני נבצע את ההחלפת האינדקסים $i = m + n - k$

$$\sum_{i=m+1}^{n+m} \beta_{n+m-i} b_{i-j} = \sum_{k=0}^{n-1} \beta_k b_{m+n-k-j} = \sum_{k=0}^n \beta_k b_{m+n-k-j}$$

(השוויון האחרון נובע מכך ש $\beta_n = 0$).

בסה"כ קבלנו

$$\gamma_j = \sum_{k=0}^m \alpha_k a_{n+m-k-j} + \sum_{k=0}^n \beta_k b_{m+n-k-j}$$

נבצע החלפת אינדקסים $j = m + n - l$, לכל $0 \leq j \leq n + m$ בפרט $0 \leq l \leq n + m$

מתקיים

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k a_{n+m-k-j} + \sum_{k=0}^n \beta_k b_{m+n-k-j} = \sum_{k=0}^m \alpha_k a_{l-k} + \sum_{k=0}^n \beta_k b_{l-k}.$$

אם $m > l$, מכיון שלכל $k > l, \alpha_k = 0$, מתקיים

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k a_{l-k} = \sum_{k=0}^l \alpha_k a_{l-k}.$$

אם $m < l$, מכיון שלכל $k \geq m, \alpha_k = 0$ (כי $\deg(p) = m - 1$). לכן

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k a_{l-k} = \sum_{k=0}^l \alpha_k a_{l-k}.$$

ובאותו אופן מתקיים

$$\sum_{k=0}^n \beta_k b_{l-k} = \sum_{k=0}^l \beta_k b_{l-k}$$

קבלנו ש

$$\gamma_j = \sum_{k=0}^l \alpha_k a_{l-k} + \sum_{k=0}^l \beta_k b_{l-k} \quad (*)$$

עתה נחשב את המכפלה

$$\begin{aligned}
 \boxed{pf + qg} &= \sum_{\tau} \alpha_{\tau} x^{\tau} \sum_k a_k x^k + \sum_{\tau} \beta_{\tau} x^{\tau} \sum_k b_k x^k \\
 &= \sum_l \sum_{k+\tau=l} \alpha_{\tau} a_k x^l + \sum_l \sum_{k+\tau=l} \beta_{\tau} b_k x^l \\
 &= \sum_l \sum_{k=0}^l \alpha_k a_{l-k} x^l + \sum_l \sum_{k=0}^l \beta_k b_{l-k} x^l \\
 &= \sum_l \left(\sum_{k=0}^l \alpha_k a_{l-k} + \sum_{k=0}^l \beta_k b_{l-k} \right) x^l \\
 &= \boxed{\sum_k \gamma_j x^k}
 \end{aligned}$$

ואכן קבלנו את השוויון הנדרש.

בבליוגרפיה

[1]. *Mc Connell* (1957). *Applications of Tensor Analysis*. *Dover Publications*.

[2]. *Rotman, Joseph J.* (2006), *A First Course in Abstract Algebra with Applications* (3rd ed.), *Prentice – Hall*.