

# Erweiterte Higgs Sektoren

Seminarvortrag - Emilia Welte

7. Juli 2021

# Gliederung

## Wiederholung SM

- Wiederholung Eichbosonensektor

- Wiederholung Fermionsektor

- Wiederholung Higgssektor

## Erweiterung des SM Higgs Sektors am Beispiel des 2HDM

- Goldstone Bosonen

- Eichbosonen Massenerzeugung

- Fermionen Massenerzeugung und FCNCs

# Zu klärende Fragen

- ▶ Was sind erweiterte Higgs Sektoren ?
- ▶ Warum braucht man erweiterte Higgs Sektoren ?

# SM Wiederholung- Eichsektor

- ▶ Dynamik der Eichbosonen steckt in Form von Feldstärketensoren in der Lagrangedichte  $\mathcal{L}_{\text{Eich}}$
- ▶ Die Wechselwirkung der Eichbosonen mit Fermionen/Skalaren steht in der kovarianten Ableitung  $\mathcal{D}_\mu$

## SM Eichstruktur

$$\text{SU}(3)_C \times \text{SU}(2)_L \times \text{U}(1)_Y$$

- ▶ Massenterme: quadratische Ordnung der Felder (Einsetzen von Eichtrafo der Felder in  $\mathcal{L}_{\text{Eich}}$ )  $\rightarrow$  ungebrochene Eichsymmetrie führt zu masselosen Eichbosonen

# SM Wiederholung - Fermionsektor

- ▶ SM: 3 Generationen von händigen Fermionen (Händigkeit besitzt jeweils unterschiedliche Transformationseigenschaften)

## Allg. Fermionen Feld Lagrange

$$\mathcal{L}_{\text{Fermion}} = \bar{\Psi} i \partial_{\mu} \gamma^{\mu} \Psi - m \bar{\Psi} \Psi$$

erster Term: kinetischen Anteil, zweiter Term: massen Anteil,  $\gamma^{\mu}$ : Dirac-Matrizen<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Logan, "TASI 2013 lectures on Higgs physics within and beyond the Standard Model".

- Nutzung der Projektionsoperatoren für links- und rechtshändige Fermionen ( $1 = P_R^2 + P_L^2$ ) → separation händiger Fermionen im kinetischen Term (bleibt Eichinvariant)

## kinetischer Anteil

$$\bar{\Psi} i \partial_\mu \gamma^\mu \Psi \rightarrow \bar{\Psi}_L i \partial_\mu \gamma^\mu \Psi_L + \bar{\Psi}_R i \partial_\mu \gamma^\mu \Psi_R$$

- Analoge Vorgehensweise → mischen von händige Zustände im Massenterm (Eichinvarianz verletzt)

## Massen Term

$$m \bar{\Psi} \Psi \rightarrow m \bar{\Psi}_R \Psi_L + m \bar{\Psi}_L \Psi_R$$

# Zusammenfassung

- ▶ Der Eichbosonen Massenterm ist nicht Eichinvariant  $\rightarrow$  Ohne Symmetriebrechung sind Eichbosonen masselos
- ▶ Der Fermion Massenterm ist nicht Eichinvariant  $\rightarrow$  Ohne Symmetriebrechung sind Fermionen masselos

# SM Wiederholung - Higgs Mechanismus

- ▶ Neuer Bestandteil der experimentell bestätigte Bosonen-/Fermionenmassen erklärt → Einführung eines skalaren  $SU(2)_L$ -Dublett Feldes was durch Higgs Mechanismus zu spontaner  $SU(2)_L \times U(1)_Y$  Symmetriebrechung führt
- ▶ Dublett hat Hypercharge  $Y = \frac{1}{2}$  und ist ein farb Singlett

## Higgs Dublett

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi^+ \\ \Phi^0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \Phi_1 + i\Phi_2 \\ \Phi_3 + i\Phi_4 \end{pmatrix}$$

$\Phi_j$ : normierte reelle Felder mit  $j \in [1, 4]$ .<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Logan, "TASI 2013 lectures on Higgs physics within and beyond the Standard Model".



# SM Wiederholung - Higgs Mechanismus

## SM Higgs Lagrangedichte

$$\mathcal{L}_\Phi = (\mathcal{D}_\mu \Phi)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \Phi) - V(\Phi) + \mathcal{L}_{\text{Yukawa}}$$

- ▶ Allgemeine Form eines Higgs Potentials könnte wie folgt aussehen<sup>3</sup>):

$$V(\Phi) = -\mu^2 \Phi^\dagger \Phi + \lambda (\Phi^\dagger \Phi)^2$$

- ▶ ist  $-\mu^2 < 0$  und  $\lambda > 0 \rightarrow$  Minimum des Potentials weg von  $|\Phi| = 0 \rightarrow$  Vakuums-/Minimumsenergie nicht mehr invariant unter Eichsymmetrie  $\rightarrow$  Eichsymmetrie ist spontan gebrochen
- ▶ sind beide größen positiv hat das Potential sein minimum bei  $|\Phi| = 0 \rightarrow$  elektroschwache Symmetrie ungebrochen
- ▶ im Falle  $\lambda < 0$  ist das Potential ungebunden und es gibt keinen stabilen Vakuumszustand

<sup>3</sup>Logan, "TASI 2013 lectures on Higgs physics within and beyond the Standard Model".

# SM Wiederholung - Higgs Mechanismus

- ▶ Vakuumszustand muss im Potential Minimum liegen  $\rightarrow$   
Vakuumerwartungswert  $v = \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}}$
- ▶ Wir definieren unsere Felder so, dass die Erwartungswerte wie folgt aussehen  $\langle \Phi_3 \rangle = v$  und  $\langle \Phi_1 \rangle = \langle \Phi_2 \rangle = \langle \Phi_2 \rangle = 0$
- ▶ Zusätzlich addieren wir zu  $\Phi_3$  ein Feld  $h$  welches einen verschwindenden Erwartungswert hat:

# SM Wiederholung - Higgs Mechanismus

- Diese Form des Potentials wollen wir nun nutzen um Sie in eine Form der Massen und Wechselwirkung des Higgsteilchens umzuschreiben:

## Allgemeine Form der Massenmatrizen

$$V(\Phi) = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \Phi_3 \\ \Phi_4 \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} & M_{34} \\ M_{41} & M_{42} & M_{43} & M_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \Phi_2 \\ \Phi_3 \\ \Phi_4 \end{pmatrix} + \text{h.O.}$$

# SM Wiederholung - Higgs Mechanismus

- ▶ Wir erhalten ausschließlich Massen für das Feld mit nichtverschwindendem Erwartungswert (in unserem Fall  $\Phi_3$ )

# SM Wiederholung - Eichbosonenmasse

- Für die Eichbosonenmassen betrachten wir den kinetischen Term unseres Higgs Dubletts

## kinetischer Term des Higgs Dubletts

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &\supset (\mathcal{D}_\mu \Phi)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \Phi) \\ &= \frac{1}{2} (\partial_\mu h) (\partial^\mu h) \\ &\quad + \frac{1}{8} g^2 (v + h)^2 (W_\mu^1 - W_\mu^2)(W^{\mu 1} + W^{\mu 2}) \\ &\quad + \frac{1}{8} (v + h)^2 (g W_\mu^3 - g' \mathcal{B}_\mu)^2\end{aligned}$$

# SM Wiederholung - Fermionenmasse

- ▶ Für die Fermionenmasse betrachten wir den Yukawa Term
- ▶ Beispiel anhand der Quarks, um bei den Leptonen das Neutrinomassenproblem zu umgehen.
- ▶ Man verwende dabei eine unitäre Eichung gemäß

$$\Phi^\dagger Q_L = \left(0, \frac{v+h}{\sqrt{2}}\right) \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}$$

## Yukawa Term

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -[y_d \bar{d}_R \Phi^\dagger Q_L + y_d^* \bar{Q}_L \Phi d_R]$$

- ▶ Damit erhalten wir für unser Beispiel (quadratischer Term gibt wieder Masse an<sup>4</sup>)

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} \supset -\frac{y_d v}{\sqrt{2}} \bar{d} d - \frac{y_d}{\sqrt{2}} h \bar{d} d$$

---

<sup>4</sup>Logan, "TASI 2013 lectures on Higgs physics within and beyond the Standard Model".

# SM Wiederholung - Fermionenmasse

- Um die Masse des up Quarks zu bekommen, muss in unitärer Eichung die Kopplung mit diesem stattfinden können → Verwendung des konjugierten Higgs Skalars in unitärer Eichung

$$\tilde{\Phi} = \begin{pmatrix} \Phi^{0*} \\ -\Phi^{+*} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\nu+h}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Vorgehensweise gilt für die einzelnen Generationen von Quarks, SM besitzt jedoch 3 von ihnen → Allgemeine Form des Yukawa Anteils (Nur für Quarks, entsprechend müsste für Leptonen ein Term addiert werden)

# SM Wiederholung - Fermionenmasse

## Yukawa Term - Quarks

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}}^q = - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 [y_{ij}^u \overline{u_{Ri}} \tilde{\Phi}^\dagger Q_{Lj} + y_{ij}^d \overline{d_{Ri}} \Phi^\dagger Q_{Lj}] + h.c.$$

$y_{ij}^u$ : Yukawa Matrix,  $Q_{Lj}$ ,  $u_{Ri}$  und  $d_{Ri}$  steht für die drei Generationen wobei  $j \in [1, 3]$ .

- Allgemeiner quark Yukawa Anteil wollen wir wieder in eine Form der Massenmatrizen umschreiben



# Motivation zu Erweiterten Higgs Sektoren

- ▶ Wir haben in der Theorie alle Massen berechnet
- ▶ Aus Lagrange konnten wir auch alle theoretisch möglichen WW ablesen
- ▶ Mit diesen Größen können nun Zerfallsbreiten, Wirkungsquerschnitte und Verzweigungsverhältnisse berechnet werden
- ▶ Gibt es nun experimentelle Abweichungen von den Vorhersagen → Erweiterung
- ▶ Erweiterung die Randbedingung und Symmetrie des SM gehorcht aber zusätzliche Zerfälle, WW erlauben würde → Bestätigung durch Experiment

# Erweiterung des SM Higgs Sektors am Beispiel des 2HDM

- ▶ Eigenschaften die das SM von Grund auf hat, aber in Erweiterung nicht fehlen dürfen: minimale Flavor Verletzung sowie eine händige  $SU(2)_L$  Symmetrie
- ▶ Konsequenz der fehlenden minimalen Flavor Verletzung wird anhand vom 2HDM gezeigt

## Higgs Dupletts des 2HDM Modells

$$\Phi_1 = \begin{pmatrix} \Phi_1^+ \\ \Phi_1^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi_1^+ \\ \frac{h_1 + v_1 + ia_1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}; \Phi_2 = \begin{pmatrix} \Phi_2^+ \\ \frac{h_2 + v_2 + ia_2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Die geladenen Komponenten entsprechen zwei komplexen skalaren, zusätzlich gibt es zwei reelle CP-gerade Skalare  $h_1, h_2$  sowie zwei CP-ungerade Skalare  $a_1, a_2$ <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Altenkamp, Dittmaier und Rzehak, "Renormalization schemes for the Two-Higgs-Doublet Model and applications to  $h \rightarrow WW/ZZ \rightarrow 4 \text{ fermions}$ ".

## 2HDM - Finde Goldstonebosonen

- ▶ Angenommen unser Higgs Potential hat folgende Form

$$\begin{aligned} V = & m_{11}^2 \Phi_1^\dagger \Phi_1 + m_{22}^2 \Phi_2^\dagger \Phi_2 - m_{12}^2 (\Phi_1^\dagger \Phi_2 + \Phi_1^\dagger \Phi_2) \\ & + \frac{1}{2} \lambda_1 (\Phi_1^\dagger \Phi_1)^2 + \frac{1}{2} \lambda_2 (\Phi_2^\dagger \Phi_2)^2 + \lambda_3 (\Phi_1^\dagger \Phi_1) (\Phi_2^\dagger \Phi_2) \\ & + \lambda_4 (\Phi_1^\dagger \Phi_2) (\Phi_2^\dagger \Phi_1) + \frac{1}{2} \lambda_5 [(\Phi_1^\dagger \Phi_2)^2 + (\Phi_2^\dagger \Phi_1)^2] \end{aligned}$$

- ▶ Schreibe Potential in voller Form aus um Interaktionsterme und Massenmatrizen identifizieren zu können

## 2HDM - Finde Goldstonebosonen

- Bringe Potential in Form der allgemeinen Massenmatrizen

### Massenmatrizen Form

$$\begin{aligned} V = & \begin{pmatrix} \Phi_1^+ \\ \Phi_2^+ \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} M_{11,\phi} & M_{12,\phi} \\ M_{21,\phi} & M_{22,\phi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Phi_1^+ \\ \Phi_2^+ \end{pmatrix} \\ & + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} M_{11,a} & M_{12,a} \\ M_{21,a} & M_{22,a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \\ & + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} M_{11,h} & M_{12,h} \\ M_{21,h} & M_{22,h} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \\ & + \text{tadpole} + \text{interaktionen} \end{aligned}$$

## 2HDM - Finde Goldstonebosonen

- ▶ Diagonalisierung der Massenmatrizen liefert Massenquadrate und Transformationsmatrix um Masseneigenzustände zu erhalten

## 2HDM - Eichboson Massenerzeugung

- W und Z Bosonen erhalten Bedingungen durch beide Higgs Dupletts im Eichkinetischen Term

### Eichkinetischer Term

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Eichkin}} &\supset (\mathcal{D}_\mu \Phi_1)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \Phi_1) + (\mathcal{D}_\mu \Phi_2)^\dagger (\mathcal{D}^\mu \Phi_2) \\ &= \frac{1}{2}(\partial_\mu h_1)^\dagger (\partial^\mu h_1) + \frac{1}{2}(\partial_\mu h_2)^\dagger (\partial^\mu h_2) \\ &\quad + \frac{1}{4}g^2[(v_1 + h_1)^2 + (v_2 + h_2)^2]W_\mu^+ W^{-\mu} \\ &\quad + \frac{1}{8}(g^2 + g'^2)[(v_1 + h_1)^2 + (v_2 + h_2)^2]Z_\mu Z^\mu\end{aligned}$$

# 2HDM -Fermion Massenerzeugung

## Yukawa Kopplungen

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Yukawa}}^{l,q} = & - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 [y_{ij}^{u1} \overline{u_{Ri}} \tilde{\Phi}_1^\dagger Q_{Lj} + y_{ij}^{d1} \overline{d_{Ri}} \Phi_1^\dagger Q_{Lj} + y_{ij}^{l1} \overline{e_{Ri}} \Phi_1^\dagger L_{Lj}] + h.c. \\ & - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 [y_{ij}^{u2} \overline{u_{Ri}} \tilde{\Phi}_2^\dagger Q_{Lj} + y_{ij}^{d2} \overline{d_{Ri}} \Phi_2^\dagger Q_{Lj} + y_{ij}^{l2} \overline{e_{Ri}} \Phi_2^\dagger L_{Lj}] + h.c.\end{aligned}$$

## 2HDM -Fermion Massenerzeugung

- Wir haben jetzt 6 komplexe Yukawa Matrizen und nicht mehr 3 wie im SM

### Massenmatrizen - Quarks

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Yukawa}}^{l,q} \supset \mathcal{L}_{\text{Yukawa}}^{\text{down}} &= - (y_{ij}^{d1} \Phi_1^\dagger + y_{ij}^{d2} \Phi_2^\dagger) \overline{d_{Ri}} Q_{Lj} + h.c. \\ &\rightarrow - (y_{ij}^{d1} \frac{v_1}{\sqrt{2}} + y_{ij}^{d2} \frac{v_2}{\sqrt{2}}) \overline{d_{Ri}} d_{Lj} + h.c.\end{aligned}$$

- Man kann wie im SM die down Typ Massenmatrix direkt ablesen und diagonalisieren, aber der Unterschied ist jetzt, dass die diagonalisierung der Massenmatrix im allgemeinen nicht mehr die Yukawa Matrizen diagonalisiert



## 2HDM -Fermion Massenerzeugung

- ▶ Warum ist das ein Problem?
- ▶ Es gibt zwei Lösungsansätze um die FCNCs im 2HDM zu verhindern in dem man minimale Flavor Verletzung wiedereinführt
- ▶ Natürliche Flavor Erhaltung
- ▶ Yukawa Ausgleich

# Zusammenfassung

- ▶ Erweiterte Higgs Sektoren können sowohl aus experimenteller als auch aus theoretischer Sicht sinnvoll sein
- ▶ Bei Erweiterungen sind Randbedingungen durch experimentelle Erkenntnisse gegeben

# Quellen



Altenkamp, Lukas, Stefan Dittmaier und Heidi Rzehak. "Renormalization schemes for the Two-Higgs-Doublet Model and applications to  $h \rightarrow WW/ZZ \rightarrow 4$  fermions". In: *Journal of High Energy Physics* 2017.9 (09/2017). DOI: 10.1007/jhep09(2017)134. URL: <https://doi.org/10.1007%2Fjhep09%282017%29134>.



Englert, F. und R. Brout. "Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons". In: *Phys. Rev. Lett.* 13 (1964). Hrsg. von J. C. Taylor, S. 321–323. DOI: 10.1103/PhysRevLett.13.321.



Gunion, John F. "Extended Higgs Sectors". In: (2002). eprint: hep-ph/0212150. URL: <https://arxiv.org/pdf/hep-ph/0212150.pdf>.



Gupta, Rick S., Heidi Rzehak und James D. Wells. "How well do we need to measure Higgs boson couplings?" In: *Physical Review D* 86.9 (11/2012). DOI: 10.1103/physrevd.86.095001. URL: <https://doi.org/10.1103%2Fphysrevd.86.095001>.



Guralnik, G. S., C. R. Hagen und T. W. B. Kibble. "Global Conservation Laws and Massless Particles". In: *Phys. Rev. Lett.* 13 (1964). Hrsg. von J. C. Taylor, S. 585–587. DOI: 10.1103/PhysRevLett.13.585.



Higgs, Peter W. "Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons". In: *Phys. Rev. Lett.* 13 (1964). Hrsg. von J. C. Taylor, S. 508–509. DOI: 10.1103/PhysRevLett.13.508.



Isidori, Gino und David M. Straub. "Minimal flavour violation and beyond". In: *The European Physical Journal C* 72.8 (08/2012). DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2103-1. URL: <https://doi.org/10.1140%2Fepjc%2Fs10052-012-2103-1>.



Lee, T. D. "A Theory of Spontaneous T Violation". In: *Phys. Rev. D* 8 (1973). Hrsg. von G. Feinberg, S. 1226–1239. DOI: 10.1103/PhysRevD.8.1226.



Logan, Heather E. "TASI 2013 lectures on Higgs physics within and beyond the Standard Model". In: (06/2014). eprint: 1406.1786. URL: <https://arxiv.org/pdf/1406.1786.pdf>.



Steggemann, Jan. "Extended Scalar Sectors". In: *Annual Review of Nuclear and Particle Science* 70.1 (10/2020), S. 197–223. DOI: 10.1146/annurev-nucl-032620-043846. URL: <https://doi.org/10.1146%2Fannurev-nucl-032620-043846>.