Wiederholung Bernoulli Kette

Ein Zufallsversuch wird als ***Bernoulli-Versuch*** bezeichnet, wenn es nur zwei Ausgänge T und $\overline{\mathrm{T}}$ gibt. T wird als Treffer (Erfolg) und $\overline{\mathrm{T}}$ als Niete (Misserfolg) bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit p für das Eintreten von T wird als ***Trefferwahrscheinlichkeit*** bezeichnet.

Beispiele sind das Werfen einer Münze (Kopf, Zahl), das Werfen eines Würfels (Sechs, keine Sechs) oder das Überprüfen eines Bauteils (defekt, nicht defekt)

Wiederholt man einen Bernoulli-Versuch n-mal in exakt gleicher Weise, so spricht man von einer ***Bernoulli-Kette der Länge n mit der Trefferwahrscheinlichkeit p***.

Formel von Bernoulli

Liegt eine Bernoulli-Kette mit der Länge n mit der Trefferwahrscheinlichkeit p vor, so wird die Wahrscheinlichkeit für genau k Treffer mit $\mathrm{B}_{(n;p;k)}$ bezeichnet. Sie kann mit der folgenden ***Formel von Bernoulli*** berechnet werden:

$$\mathrm{P}_{(X=k)} = \mathrm{B}_{(n;p;k)} = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Mit der Formel von Bernoulli werden *Punktwahrscheinlichkeiten* $\mathrm{P}_{(X=k)} = \mathrm{B}_{(n;p;k)}$ einer binomialverteilten Zufallsgröße für eine einzige Trefferzahl k berechnet.

Wird dagegen nach der *Intervallwahrscheinlichkeit* $\mathrm{P}_{(X\leq k)}$ gefragt, so müssen die Punktwahrscheinlichkeiten $\mathrm{P}_{(X=0)}, \mathrm{P}_{(X=1)}, \dots, \mathrm{P}_{(X=k)}$ berechnet und anschließend addiert werden, also:

$$\mathrm{P}_{(X\leq k)} = \mathrm{B}_{(X=0)} + \mathrm{B}_{(X=1)}, + \cdots + \mathrm{B}_{(X=k)}$$

Man spricht in diesem Fall von ***kumulierten Binomialverteilung***.

Diese müssen wir nicht separat im Taschenrechner berechnen, sondern können über das Summenzeichen arbeiten. Dieses erreichst du mit Shift und log.



Hier kann man als k im Taschenrechner X eingeben. Nun muss man nur noch die Formel eingeben.

Damit man $\binom{n}{k}$ eingeben kann muss man Shift und ÷ drücken. Damit bekommt man ein **C**.



Die erste Zahl ist das n und die zweite k. In diesem Beispiel wäre es also $\binom{1}{2} = 2$.

Wenn wir jetzt eine ***kumulierte Binomialverteilung*** haben, können wir das Summenzeichen Σ verwenden. In einer Formel sähe das so aus:

$$\sum_{k=0}^{2} \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

Das wäre das Beispiel für $\mathrm{P}_{(X<3)}$.

Nun nehmen wir ein tatsächliches Beispiel:

$$n = 7, \qquad p = 0{,}5, \qquad k \leq 5$$

$$\sum_{k=0}^{5} \binom{7}{k} \cdot 0{,}5^k \cdot (1-0{,}5)^{7-k}$$

Im Taschenrechner sähe es wie folgt aus:



σ-Umgebung des Erwartungswertes

Zunächst aber der Erwartungswert: Der ***Erwartungswert*** einer Zufallsvariablen beschreibt die Zahl, die die Zufallsvariable im Mittel annimmt, d.h. $\mathrm{E}_{(X)} = n \cdot p = \mu$

Die Standardabweichung σ ist ein Maß dafür, wie stark die Werte einer Zufallsgröße X um ihren Erwartungswert μ streuen. Für binomialverteilte Zufallsgrößen besitzt die Standardabweichung eine ganz besonders anschauliche und leicht fassbare Bedeutung, die wir nun herausarbeiten werden.

Beispiel

Eine Münze wird 50-mal geworfen. X sei die Anzahl der Kopfwürfe. Bestimme, wie wahrscheinlich es ist, dass X einen Wert annimmt, der höchstens um σ bzw. 2σ bzw. 3σ vom Erwartungswert μ abweicht.

Lösung

Die Anzahl der Kopfwürfe X beim 50-maligen Münzwurf besitzt den Erwartungswert $\mu = 25$ und die Standardabweichung $\sigma \approx 3{,}54$, was man leicht nachrechnen kann $\left(\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)}\right)$.

Gesucht ist zunächst die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X vom Erwartungswert $\mu = 25$ um höchstens $\sigma \approx 3{,}54$ nach oben oder nach unten abweicht.

$$\mathrm{P}_{(|X-\mu| \leq \sigma)} = \mathrm{P}_{(|X-25| \leq 3{,}54)}$$

$$= \mathrm{P}_{(22 \leq X \leq 28)}$$

$$= \mathrm{P}_{(50;0{,}5;28)} - \mathrm{P}_{(50;0{,}5;22)}$$

$$\approx 0{,}8389 - 0{,}1611$$

$$= 0{,}6778$$

$$\underline{\approx 68\%}$$

Analoge Rechnungen wieder:

$$\mathrm{P}_{(|X-\mu| \leq 2\sigma)} = \mathrm{P}_{(|X-\mu| \leq 7{,}08)}$$

$$\approx 0{,}9672 = 97\%$$

$$\mathrm{P}_{(|X-\mu| \leq 3\sigma)} = \mathrm{P}_{(|X-\mu| \leq 10{,}62)}$$

$$\approx 0{,}9974 = 99{,}74\%$$

Anschaulich heißt dies, dass die Zufallsgröße „$X =$ Anzahl der Kopfwürfe“ mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 68% in ein Intervall mit dem Radius σ um den Erwartungswert μ fällt. Man bezeichnet dieses Intervall als ***σ-Umgebung des Erwartungswertes μ***.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 96% fällt die Zufallsgröße X in einer 2σ-Umgebung von μ und mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. $99{,}7\%$ in eine 3σ-Umgebung von μ.
Diese σ-Regeln können aber nur angewandt werden, wenn $\sigma > 3$.

Testen von Hypothesen

Bei vielen statistischen Problemen reicht es oft nicht aus, das vorliegende Material alleine durch Häufigkeitsverteilungen oder Wahrscheinlichkeiten zu beschreiben.

Beispiel:

Die Firma Wosram liefert Glühlampen in Großpackungen mit Gütemerkmalen $I.$ und $II.$ Wahl. Aus irgendeinem Grund ist nicht bekannt, welches Gütemerkmal einem Karton zuzuordnen ist. Mit Hilfe einer Stichprobe kann eine Hypothese über das Vorliegen eines Merkmals (z.B. $I.$ Wahl) aufgestellt werden. Da eine Stichprobe ein Zufallsexperiment ist, kann die Hypothese verworfen werden, obwohl sie wahr ist bzw. angenommen werden, obwohl sie falsch ist.

Es gibt nun Prüfverfahren (sog. Hypothesentest), die bei der Entscheidung über die Annahme bzw. Ablehnung einer Hypothese helfen.

Grundbegriffe

Eine Menge von Elementen, bei der ein bestimmtes Merkmal von Interesse ist, nennt man ***statistische Gesamtheit*** oder ***Grundgesamtheit***. Mit einer Stichprobe will man nun aus der Kenntnis über gewisse Eigenschaften einer Teilmenge der Grundgesamtheit eine Aussage über die entsprechenden Eigenschaften der Grundgesamtheit treffen. Von Interesse an der Grundgesamtheit ist ein bestimmtes ***Merkmal***, dessen Auftreten zufallsbedingt ist. Das Auftreten des Merkmals wird durch eine Zufallsgröße X (***Prüfgröße***) beschrieben, wobei deren Verteilung ***Prüfverteilung*** heißt.

Die Zufällige Auswahl einer Teilmenge von n Elementen aus der Grundgesamtheit mit anschließender Betrachtung des interessierenden Merkmals nennt man ***Stichprobe*** vom Umfang n. Über die Grundgesamtheit gibt es eine Vermutung – Hypothese genannt – ob die von einer Stichprobe gelieferten Daten auf die Grundgesamtheit zu übertragen sind oder nicht. Die zu überprüfende Hypothese nennt man auch ***Nullhypothese*** H_0, die andere Möglichkeit der Entscheidung ***Alternativhypothese*** H_1. In der Praxis wird als Nullhypothese H_0 die Behauptung bzw. die Vermutung festgelegt, die man widerlegen möchte. Oft findet man die Erklärung: Als Nullhypothese wird die Hypothese gewählt, deren irrtümliche Ablehnung die schlechtesten Konsequenzen hat. Dies ist jedoch davon abhängig, welche Hypothese man bestätigen möchte.

Mit Hilfe der Prüfgröße X muss eine ***Entscheidungsregel*** – oft charakterisiert durch Festlegung einer sog. ***kritischen Zahl*** K – über die Annahme bzw. Ablehnung der Nullhypothese (gleichbedeutend mit der Ablehnung bzw. Annahme der Alternativhypothese) formuliert werden.

Die Menge der Werte X, bei denen Eintreten H_0 abgelehnt bzw. verworfen wird, heißt ***Ablehnungs-*** bzw. ***Verwerfungsbereich*** von H_0 besteht aus der Menge der Werte X, bei deren Eintreten H_0 angenommen wird.

Da die Stichprobenergebnisse zufallsbedingt sind, kann die Auswertung, wie oben bereits angemerkt, zu Fehlentscheidungen führen.

Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Fehlentscheidungen

	H_0 ist wahr	H_1 ist wahr
Entscheidung für H_0	Richtig	Fehler 2. Art
Entscheidung für H_1	Fehler 1. Art	Richtig

Mit anderen Worten: Ein ***Fehler 1. Art*** liegt vor, wenn eine richtige Hypothese abgelehnt wird, ein ***Fehler 2. Art*** liegt vor, wenn eine falsche Hypothese angenommen wird.

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Entscheidungsregel zu einem Fehler 1. Art (gelegentlich auch als α-Fehler bezeichnet) führt, nennt man auch ***Irrtumswahrscheinlichkeit 1. Art***, analog definiert man für einen Fehler 2. Art (gelegentlich β Fehler genannt) die ***Irrtumswahrscheinlichkeit 2. Art***.

Signifikanztest

Bei Alternativtest sind für die zwei Hypothesen die beiden zugehörigen Wahrscheinlichkeiten bekannt. Oft hat man aber für den Wert von p nur eine Vermutung, die durch einen Test bestätigt oder widerlegt werden soll. Dann wird ein ***Signifikanztest*** durchgeführt.

Einseitiger Signifikanztest

Die Nullhypothese $H_0: p = p_0$ wird gegen die Hypothese $H_1: p > p_0$ getestet.
Der Annahmebereich von H_0 ist eine Menge $\{0,1, \dots, K\}$.

Zweiseitiger Signifikanztest

Die Nullhypothese$H_0: p = p_0$ wird gegen die Hypothese $H_1: p \neq p_0$ getestet, d.h.
$H_1: (p < p_0$ oder $p > p_0)$.

Der Annahmebereich von H_0 ist eine Menge der Gestalt $\{K_1 + 1, K_1 + 2, \dots K_2 - 1)$ mit den kritischen Zahlen K_1 und K_2.

Signifikanzniveau α

Den Fehler 1. Art oder α-Fehler bezeichnet man als Signifikanzniveau des Tests.

Bei zweiseitigen Signifikanztests besteht der Ablehnungsbereich von H_0 aus zwei Teilen, der Menge $\{0,1, \dots, K_1\}$ und der Menge $\{K_2, \dots, n\}$ die zusammen den α-Fehler bestimmen.

Vorgehen beim zweiseitigen Signifikanztest zum Testen einer Nullhypothese $H_0: p = p_0$ (Alternative $H_1: p \neq p_0$)

1. Stichprobenumfang n und Signifikanzniveau bestimmen.
2. Annahmebereich $[K_1; K_2]$ der Nullhypothese bestimmen (Entscheidungsregel)
   Der Annahmebereich entspricht einer bestimmen σ-Umgebung von μ, in der das Stichprobenergebnis mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (entsprechend dem Signifikanzniveau) liegt.
   Annahmebereich: $[\mu - c \cdot \sigma; \mu + c \cdot \sigma]$
   Die Berechnung erfolgt mit einem Faktor c, der einer Tabelle zu entnehmen ist.

Signifikanzniveau	Zweiseitiger Test	Einseitiger Test
1%	2,58	2,33
5%	1,96	1,64
10%	1,64	1,28

Oder:

$P_{(\mu-\sigma<X<\mu+\sigma)} \approx 0{,}683$	$P_{(\mu-1{,}64\sigma<X<\mu+1{,}64\sigma)} \approx 0{,}90$
$P_{(\mu-2\sigma<X<\mu+2\sigma)} \approx 0{,}954$	$P_{(\mu-1{,}96\sigma<X<\mu+1{,}96\sigma)} \approx 0{,}95$
$P_{(\mu-3\sigma<X<\mu+3\sigma)} \approx 0{,}997$	$P_{(\mu-2{,}58\sigma<X<\mu+2{,}58\sigma)} \approx 0{,}99$

Signifikanztest 2

Vorgehen beim einseitigen Signifikanztest zum Testen einer Nullhypothese $H_0: p = p_0$

- Stichprobenumfang n und Signifikanzniveau α bestimmen
- Annahmebereich der Nullhypothese bestimmen (Entscheidungsregel)

Linksseitiger Test	**Rechtsseitiger Test**
Nullhypothese $H_0 = p = p_0$ (auch $p \geq p_0$) Alternative $H_1: p < p_0$	Nullhypothese $H_0: p = p_0$ (auch $p \geq p_0$) Alternative $H_1: p > p_0$
Annahmebereich $[K; n]$ der Nullhypothesen bestimmen.	Annahmebereich $[0; K]$ der Nullhypothese bestimmen
Ablehnungsbereich links	Ablehnungsbereich rechts

Entsprechend dem Signifikanzniveau ermittelt man dafür eine bestimmte σ-Umgebung von μ (nur einseitig) mit Hilfe eines Faktors c, der einer Tabelle zu entnehmen ist. Dann prüft man, ob das Versuchsergebnis oberhalb bzw. unterhalb der ermittelten $c\sigma$-Umgebung von μ liegt.

Die Normalverteilung

Berechne die Wahrscheinlichkeit dafür, dass beim 500-maligen Werfen einer fairen Münze höchstens 260 mal Kopf kommt.

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei sehr langen Bernoulliketten ist mit dem Taschenrechner nicht möglich.

Dennoch müssen wir nicht passen, denn es gibt die Möglichkeit die Werte aller kumulierten Binomialverteilungen bei genügend großem Stichprobenumfang näherungsweise durch Funktionswerte einer einzigen relativ einfachen Funktion Φ darzustellen.

Die Standardisierung der Binomialverteilung

Die Gestalt des Histogramms zu einer Binomialverteilten Zufallsgröße X hängt nur von den Parametern n und p ab. Diese bestimmen die Anzahl und Höhe der Säulen sowie die Position der höchsten Säule, während die Säulenbreite stets 1 ist, sodass die Fläche der Säule Nr.k gleich $\mathrm{B}_{(n;p;k)} = \mathrm{P}_{(X=k)}$ ist.



Wird der Stichprobenumfang n für eine feste Grundwahrscheinlichkeit p weiter vergrößert, so nährt sich die Form des Histogramms im Grenzfall einer „Glockenkurve“ an.
Es ergeben sich dabei je nach Wert von p unterschiedliche Glockenkurven



Allerding kann man eine sogenannte Standardisierung durchführen. Dabei wird durch eine geeignete Transformation allen Histogrammen eine relativ einheitliche Form und Lage verpasst. Noch wichtiger ist, dass die transformierten Histogramme sich mit wachsendem n allesamt unabhängig von p ein und derselben „Glockenkurve“ anpassen.

Der Standardisierungsprozess

Schritt 1

Durch einen ersten Übergang von der Zufallsgröße X zur Zufallsgröße $Y = X - \mu$ wird der Erwartungswert nach 0 verschoben.

Schritt 2

Anschließend sorgt ein weiterer Übergang zu $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ dafür, dass die Standardabweichung auf 1 normiert wird. Der wesentliche Teil des Histogramms bleibt dann unabhängig von n stets etwa gleich breit.

Die Streifenbreiten verändern sich allerdings von 1 auf $\frac{1}{\sigma_{(X)}}$

Schritt 3

Zum Ausgleich der Streifenbreitenänderung werden die Streifenhöhen mit $\sigma_{(X)}$ multipliziert.

Dadurch erreicht man, dass die Streifenflächeninhalt gleich bleiben, sodass Streifen Nr.k auch in der standardisierten Form den Flächeninhalt $\mathrm{B}_{(n;p;k)} = \mathrm{P}_{(X=k)}$

Jede binomialverteilte Zufallsgröße X kann in der beschriebenen Weise standardisiert werden. Das Histogramm der zugehörigen Standardisierten Zufallsgröße z kann in jedem Fall durch ein und dieselbe Glockenkurve approximiert (angenähert) werden. Es handelt sich um die sogenannte ***Gauß'sche Glockenkurve***.

Sie ist nach dem Mathematiker und Astronomen *Carl Friedrich Gauß* $(1777 - 1855)$ benannt, der sie im Zusammenhang mit der Fehlerrechnung entdeckte.
Mithilfe der Funktion Φ kann das Histogramm einer binomialverteilten Zufallsvariablen mit hoher Genauigkeit angenähert werden, wenn die sogenannte ***Laplace-Bedingung*** erfüllt ist:

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} > 3$$

Die lokale Näherungsformel von Laplace und De Moivre

Die Binomialverteilte Zufallsgröße X erfülle die Laplace-Bedingung $\sigma > 3$.

Dann gilt die folgende Näherungsformel für $\mathrm{P}_{(X=k)}$ bei einer Bernoullikette der Länge n mit der Wahrscheinlichkeit p und dem Erwartungswert μ und der Standardabweichung σ:

$$\mathrm{P}_{(X=k)} \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}z^2} \text{ mit } z = \frac{k-\mu}{\sigma}$$

Wenn man diese Formel noch einsetzt und ausmultipliziert:

$$\mathrm{P}_{(X=k)} \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{(x-\mu)^2}{2 \cdot \sigma^2}}$$

Globale Näherungsformel von Laplace und de Moivre

Eine Zufallsgröße, deren Wahrscheinlichkeitsverteilung die Gauß'sche Glockenkurve ist, wird als ***normalverteilte Zufallsgröße*** bezeichnet. Binomialverteilte Zufallsgrößen sind für großes n annähernd normalverteilt.

Im Folgenden betrachten wir die kumulierte Binomialverteilung. Der Flächeninhalt unter der Kurve bis zur Säule k kann durch folgende Formel beschrieben werden: $\mathrm{F}_{(n;p;k)} = \mathrm{B}_{(n;p;0)} + \cdots + \mathrm{B}_{(n;p;k)}$

Man kann aber auch die entsprechenden Säulen der zugehörigen standardisierten Form verwenden, da diese inhaltsgleich sind.

Diese Fläche wiederum kann durch diejenige Fläche unter der Gauß'schen Glockenkurve approximiert werden, die sich von $t = -\infty$ bis $t = z$ erstreckt, wobei $z = \frac{k-\mu+0{,}5}{\sigma}$ der rechte Randwert der standardisierten Säule Nr.k ist.

Der angegebene Wert der Hilfsgröße z ergibt sich, wenn man zur Mitte der k-ten Säule – also zu $\frac{k-\mu}{\sigma}$ – die halbe Säulenbreite $\frac{1}{2\sigma}$ addiert. Diese Stetigkeitskorrektur ist notwendig um die Fläche der k-ten Säule vollständig zu berücksichtigen.

Den Flächeninhalt kann man als Integral von φ berechnen. Für das entsprechende Integral von $-\infty$ bis z verwendet man abkürzend die Bezeichnung $\Phi_{(z)}$.
Die Funktion Φ heißt ***Gauß'sche Integralfunktion***.

Weil man Φ nicht durch elementare Funktionen ausdrücken kann, sind die Werte dieser wichtigen Funktionen in „Tabellen und Formeln" tabelliert. Die Tabelle findest du im Tafelwerk auf der Seite 46.

Die Dominanz einer Minderheit über eine Mehrheit

Wir betrachten den Fall einer Volksabstimmung:

Eine Volksabstimmung soll mit einfacherer Mehrheit über eine Gesetzesänderung entscheiden, der die rund 4 Millionen Stimmberechtigten recht gleichgültig gegenüberstehen. Allerding ist eine relativ kleine Interessengruppe von ca. 3000 Personen wild entschlossen, gegen die Gesetzesänderung zu stimmen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit setzt die Minderheit ihren Willen durch?

Als erstes schreiben wir unsere gegebenen Werte heraus.

$$n = 4'000'000, \qquad p = 0{,}5, \qquad \mu = 2'000'000, \qquad \sigma = 1000$$

Wir wissen, dass sicher 3000 Personen gegen die Gesetzesänderung stimmen werden. Das heißt es braucht noch $2'000'001 - 3000 = 1'997'001$ Personen, die gegen diese Änderung stimmen, damit sie nicht durchgesetzt wird.

Wir berechnen also: $\mathrm{P}_{(X \geq 1997001)} = 1 - \mathrm{P}_{(X \leq 199700)}$

Nun können wir berechnen, wie die Chancen stehen, dass genau $1'997'000$ Personen dagegen stimmen werden mit Hilfe der Näherungsformel von Laplace und De Moivre.

$$z = \frac{1'997'000 + 0{,}5 - 2'000'000}{1000} = -2{,}9995$$

Wenn wir das nun aus der Tabelle ablesen kommen wir auf:

$$p = 1 - 0{,}9987$$

Da wir jedoch $1 - \mathrm{P}_{(X \leq 199700)}$ rechnen, kürzen sich die $1 - (1 - \mathrm{P})$ raus.

Deshalb kommen wir auf:

$$\mathrm{P}_{(X \geq 1997001)} = 99{,}87\%$$

Intervallwahrscheinlichkeiten – Beidseitig

Wie berechnen wir die Wahrscheinlichkeit für $20 \leq X \leq 30$? Normalerweise würden wir es mit der Bernoulli-Kette machen. Was machen wir jedoch wenn es heißt:

$$25500 < X < 26000, \text{ mit } p = 51{,}4\% \text{ und } n = 50000?$$

Wir rechnen die obere Grenze 30000 minus die untere Grenze 20000.

Also:

$$\mathrm{P}_{(X \leq 25999)} - \mathrm{P}_{(X \leq 25501)}$$

Diese Werte können wir (recht) einfach berechnen, wenn wir die Normalverteilung anwenden. Wir nutzen also die Funktion Φ. Um nun einen brauchbaren Wert zu bekommen, müssen wir zunächst z ausrechnen.

$$z_1 = \frac{25999 + 0{,}5 - 50000 \cdot 0{,}514}{\sqrt{50000 \cdot 0{,}514 \cdot (1 - 0{,}514)}} = 2{,}68, \qquad z_2 = \frac{25501 - 0{,}5 - 25700}{111{,}76} = -1{,}79$$

Wir rechnen nicht $+0{,}5$, sondern $-0{,}5$, da es sich um die untere Grenze handelt und wir 0,5 sonst zu viel haben würden.

Im Anschluss lesen wir aus dem Tafelwerk ab:

$$\Phi_{(2{,}68)} = 0{,}9963, \qquad \Phi_{(-1{,}79)} = 1 - 0{,}9632$$

$$0{,}9963 - (1 - 0{,}9632) = 0{,}9595 \rightarrow \mathbf{P = 95{,}95\%}$$

Anwendung der Normalverteilung beim Testen

Wenn wir unseren ganz normalen Hypothesentest mit H_0 und H_1 haben, berechnen wir normalerweise mit der Bernoulli-Formel. Dies ist bei sehr großen n aber nicht möglich. Rechnen wir dafür ein Beispiel:

Ein Hersteller von Speicherchips versucht den Ausschussanteil durch neue Maschinen von 5% auf 3% zu senken. Nach der Umstellung soll der Erfolg durch eine Stichprobe von $n = 800$ ermittelt werden. Die Entscheidungsregel lautet: Sind höchstens 30 Chips fehlerhaft, wird angenommen, dass die Ausschussquote auf 3% gesunken ist (Hypothese $H_1: p_1 = 0{,}03$) Andernfalls wird angenommen, dass der Anteil nach wie vor 5% beträgt (Hypothese H_0). Wie groß sind die Irrtumswahrscheinlichkeiten?

In der Aufgabe sind bereits Nullhypothese und Alternativhypothese gegeben. Die kritische Zahl k ist auch gegeben mit $k \leq 30$. Damit können wir den α-Fehler bestimmen.

Der α-Fehler ist $\mathrm{P}_{(X \leq 30)}$ mit $p = 0{,}05$.

Hier benutzen wir die Φ-Funktion. Dafür müssen wir als erstes z bestimmen.

$$z = \frac{k + 0{,}5 - \mu}{\sigma}$$

$$k = 30, \qquad \mu = 40, \qquad \sigma = 6{,}16$$

$$z = \frac{30 + 0{,}5 - 40}{6{,}16} = -1{,}54$$

$$\Phi_{(-1{,}54)} = 1 - 0{,}9382 = \mathbf{6{,}18}\%$$

Der β-Fehler ist $\mathrm{P}_{(X \geq 31)}$ mit $p = 0{,}03$

Wir schreiben $\mathrm{P}_{(X \geq 31)}$ um zu $1 - \mathrm{P}_{(X \leq 30)}$

$$z = \frac{30 + 0{,}5 - 24}{4{,}82} = 1{,}35$$

$$\Phi_{(1{,}55)} = 0{,}9115$$

$$1 - 0{,}9115 = \mathbf{8{,}85}\%$$

Als zweite Aufgabe: Im obigen Beispiel soll die Entscheidungsregel so abgeändert werden, dass der α-Fehler nicht mehr als 4% beträgt. Wie muss die kritische Zahl k nun gewählt werden.

Wir wissen:

$$\Phi_{(z)} - \Phi_{(z)} = 1$$

$$\Phi_{(z)} = 1 - \Phi_{(-z)} \leq 0{,}04$$

Also:

$$1 - \Phi_{(-z)} \leq 0{,}04$$

$$-\Phi_{(-z)} \leq -0{,}96$$

$$\Phi_{(-z)} \geq 0{,}96$$

Nun lesen wir im Tafelwerk ab

$$-z \geq 1{,}75 \rightarrow z \leq -1{,}75$$

z ist definiert als

$$z = \frac{k + 0{,}5 - \mu}{\sigma}$$

Deswegen muss $\frac{k+0{,}5-\mu}{\sigma}$ kleiner als $-1{,}75$ sein.

$$-1{,}75 \geq \frac{k + 0{,}5 - \mu}{\sigma}$$

$$k \leq z \cdot \sigma - 0{,}5 + \mu$$

$$k \leq -1{,}75 \cdot 6{,}16 - 0{,}5 + 40 = 28{,}72$$

Also muss k unter $28{,}72$ liegen: k muss mindestens 28 sein.

Ein anderer Weg dies zu lösen wäre für k ein paar Werte einzusetzen, also einfach ausprobieren. Das dauert zwar vielleicht ein wenig länger ist aber auf jeden Fall richtig.

Der letzte (hier noch mögliche) Lösungsansatz ist die Bernoulli-Kette. Hier ist das $\binom{n}{k}$ noch nicht über $1 \cdot 10^{100}$, deswegen lässt es sich berechnen.

$$\sum_{k=0}^{29} \binom{800}{k} \cdot 0{,}05^k \cdot (1 - 0{,}05)^{800-k} = 0{,}394 = 3{,}94\%$$

Wenn man das Ganze mit der Bernoulli-Kette löst, kann man sehen, dass k mindestens bei 29 liegen muss. Wie kommt dieser Unterschied zustande?

Das ist, weil die Funktion Φ nur eine Näherung für die Bernoulli-Kette ist, aber nicht ganz exakt.