



Correction TD-TP modélisation numérique, éléments finis

Exercice 1 : Soient les fonctions d'interpolations (ou de forme) $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ définies sur les éléments 1,2,3



Elément j :



$$l = (x_{j+1} - x_j)$$

Sur chaque élément E_j , on peut définir la fonction $y = f_j(x)$ comme fonction des valeurs de la fonction aux extrémités de l'élément (y_j, y_{j+1}) pondérée par les fonctions de formes sur l'élément j :

$$f_j(x) = y_j \phi_j + y_{j+1} \phi_{j+1}$$

avec :

$$\phi_j(x) = \frac{x_{j+1} - x}{x_{j+1} - x_j} \quad \text{et} \quad \phi_{j+1}(x) = \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}.$$

Soit :

$$f_j(x) = y_j \left(\frac{x_{j+1} - x}{l} \right) + y_{j+1} \left(\frac{x - x_j}{l} \right), \quad \text{avec} \quad l = x_{j+1} - x_j.$$

On peut vérifier que cette fonction est bien une fonction linéaire de x telle que $f_j(x_j) = y_j$ et $f_j(x_{j+1}) = y_{j+1}$.

Le programme correspondant aux interpolations linéaires par morceaux est Exo1.m

Exercice 2 :

1. Soit une section de poutre d'épaisseur dx et de section S à l'équilibre entre les efforts internes (la traction exercée par la barre vers le haut en x et la traction exercée vers le bas en $x+dx$) et son poids (vers le bas). On peut écrire :

$$F(x+dx) - F(x) + \rho g S dx = 0$$

On utilise le développement limité de $F(x)$ au voisinage de x :

$$F(x+dx) \sim F(x) + \frac{\partial F}{\partial x} dx$$

(les signe \sim indique que cette expression est une approximation de $F(x+dx)$).

On obtient donc

$$F(x) + \frac{\partial F}{\partial x} dx - F(x) + \rho g S dx = 0$$

Soit :

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \rho g S dx = 0$$

On simplifie par dx , et on obtient :

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \rho g S = 0$$

On utilise maintenant la relation contraintes – Forces, puis la loi de Hooke pour relier les forces aux déplacements (voir énoncé), et on en déduit :

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(SE \frac{\partial u_x}{\partial x} \right) + \rho g S = 0$$

Que l'on peut simplifier par S . Comme E ne dépend pas de x , on peut écrire l'équation ci-dessus :

$$E \frac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + \rho g = 0 \quad (1)$$

Par la suite, pour simplifier on notera $u_x = u$.

2. Solution analytique :

De l'équation (1) on déduit :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{-\rho g}{E}$$

On intègre une première fois par rapport à x :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{-\rho g}{E} x + B \quad (2)$$

On intègre une seconde fois par rapport à x :

$$u(x) = \frac{-\rho g}{2E} x^2 + Bx + C \quad (3)$$

On utilise les conditions limites pour déterminer les constantes

En $x = 0$, $u(0) = 0$

De l'équation (3), on déduit $u(0) = C = 0$

cas a) Si $F(L) = 0$, on a simplement

$$B = \frac{\rho g L}{E}$$

cas b) En $x = L$, $F(L) = SE \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = b$

On utilise $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L}$ déduit de l'équation (2) que l'on remplace dans l'équation ci-dessus

$$F(L) = SE \left(-\frac{\rho g}{E} L + B \right) = b$$

d'où

$$B = \left(\frac{b}{SE} + \frac{\rho g L}{E} \right)$$

Finalement :

$$u(x) = \frac{\rho g}{E} \left[-\frac{x^2}{2} + Lx \right] \quad \text{si } F(L) = 0 \quad (4)$$

$$u(x) = \frac{1}{E} \left[-\frac{\rho g}{2} x^2 + \left(\frac{b}{S} + \rho g L \right) x \right] \quad \text{si } F(L) = b \quad (5)$$

3. Formulation faible

$$\int_0^L v(x) \left(E \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \rho g \right) dx = 0$$

On intègre par parties¹ en posant $f = v(x)$ et $g' = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ (le terme ρg n'est pas intégré par parties), ce qui donne :

$$\left[E v(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L - \int_0^L E \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx + \int_0^L v(x) \rho g dx = 0$$

Soit

$$\int_0^L E \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx = \left[E v(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L + \int_0^L v(x) \rho g dx \quad (6)$$

4. On discrétise les solutions recherchées (les déplacements) et on écrit :

$$u(x) = \sum_{i=0}^N u_i \phi_i(x) \quad \text{que les fonctions de formes (ou d'interpolation) correspondent à des}$$

interpolations constantes, linéaires ou quadratiques.

L'approximation de Galerkin consiste à choisir $v(x) = \phi_j(x)$

Avec la discrétisation et l'approximation de Galerkin, la formulation faible (equation (6)) devient

$$E \int_0^L \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \sum_{i=0}^N u_i \frac{\partial \phi_i}{\partial x} dx = \left[E \phi_j(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L + \int_0^L \phi_j(x) \rho g dx$$

L'intégrale de la somme, étant égale à la somme des intégrales, on peut écrire

$$E \sum_{i=0}^N \int_0^L \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} u_i dx = \left[E \phi_j(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L + \int_0^L \phi_j(x) \rho g dx$$

Cette formulation est vraie pour l'ensemble du domaine, mais elle est aussi vraie sur chaque élément.

On considère maintenant ces intégrales sur chaque élément, et on écrit :

$$E \sum_{i=0}^N u_i \int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} dx = \left[E \phi_j(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L + \int_{x_j}^{x_{j+1}} \phi_j(x) \rho g dx \quad (7)$$

5. On prend cette fois des fonctions linéaires. Pour 3 éléments, on a 4 points d'interpolations ou 4 u inconnus et 4 fonctions de formes. L'équation (7) s'écrit

$$E \sum_{i=0}^4 u_i \int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{\partial \phi_j}{\partial x} \frac{\partial \phi_i}{\partial x} dx = \left[E \phi_j(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right]_0^L + \int_{x_j}^{x_{j+1}} \phi_j(x) \rho g dx$$

¹ Rappel $\int f g' = [fg] - \int f' g$ où g est la primitive de g'

Comme les fonctions de formes sont nulles sur une partie du domaine, on a les produits suivants :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{d\phi_j}{dx} \frac{d\phi_j}{dx} dx = 0 \text{ si } i \neq j, i \neq j+1,$$

et $\phi_i(0)=0$ si $i=2,3,4$ et $\phi_i(L)=0$ si $i=1,2,3$.

On écrit :

- pour l'élément 1 (seules les fonctions de forme ϕ_1 et ϕ_2 sont non nulles, ϕ_2 est nulle en 0 et L $\phi_1(0)=1$ et $\phi_1(L)=0$)

$$E \left(u_1 \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_1}{\partial x} dx + u_2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} dx \right) = -E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + \int_{x_1}^{x_2} \phi_1(x) \rho g dx$$

$$E \left(u_1 \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} dx + u_2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \phi_1}{\partial x} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} dx \right) = \int_{x_1}^{x_2} \phi_2(x) \rho g dx$$

- pour l'élément 2 (seules les fonctions de forme ϕ_2 et ϕ_3 sont non nulles, et elles sont nulles en $x=0$ et $x=L$)

$$E \left(u_2 \int_{x_2}^{x_3} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} dx + u_3 \int_{x_2}^{x_3} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} dx \right) = \int_{x_2}^{x_3} \phi_2(x) \rho g dx$$

$$E \left(u_2 \int_{x_2}^{x_3} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} \frac{\partial \phi_2}{\partial x} dx + u_3 \int_{x_2}^{x_3} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} dx \right) = \int_{x_2}^{x_3} \phi_3(x) \rho g dx$$

- Pour l'élément 3 (seules les fonctions de forme ϕ_3 et ϕ_4 sont non nulles, ϕ_3 est nulle en 0 et L $\phi_4(0)=0$ et $\phi_4(L)=1$)

$$E \left(u_3 \int_{x_3}^{x_4} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} dx + u_4 \int_{x_3}^{x_4} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} \frac{\partial \phi_4}{\partial x} dx \right) = \int_{x_3}^{x_4} \phi_3(x) \rho g dx$$

$$E \left(u_3 \int_{x_3}^{x_4} \frac{\partial \phi_4}{\partial x} \frac{\partial \phi_3}{\partial x} dx + u_4 \int_{x_3}^{x_4} \frac{\partial \phi_4}{\partial x} \frac{\partial \phi_4}{\partial x} dx \right) = E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} + \int_{x_3}^{x_4} \phi_4(x) \rho g dx$$

D'autre part, on a les résultats d'intégrations suivants

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{d\phi_j}{dx} \frac{d\phi_j}{dx} dx = \frac{1}{l} \quad , \quad \int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{d\phi_j}{dx} \frac{d\phi_{j+1}}{dx} dx = -\frac{1}{l}$$

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{d\phi_{j+1}}{dx} \frac{d\phi_j}{dx} dx = -\frac{1}{l} \quad \int_{x_j}^{x_{j+1}} \frac{d\phi_{j+1}}{dx} \frac{d\phi_{j+1}}{dx} dx = \frac{1}{l}$$

et

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \phi_j dx = \frac{l}{2} \quad , \quad \int_{x_j}^{x_{j+1}} \phi_{j+1} dx = \frac{l}{2}$$

En utilisant la condition limite en $x=L$, $F(L) = b$, on peut écrire

$$F(L) = S E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = b \quad , \quad \text{d'où} \quad E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = \frac{b}{S}$$

On en déduit, les systèmes suivants :

- sur l'élément 1 :

$$\frac{E}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + \frac{\rho g L}{2} \\ \frac{\rho g L}{2} \end{bmatrix}$$

- Sur l'élément 2 :

$$\frac{E}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\rho g L}{2} \\ \frac{\rho g L}{2} \end{bmatrix}$$

- Sur l'élément 3 :

$$\frac{E}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\rho g L}{2} \\ \frac{b}{S} + \frac{\rho g L}{2} \end{bmatrix}$$

7. Pour constituer le système global de 4 équation, on remplace la 2nd ligne de ce système par la somme de la seconde ligne de l'élément 1 et de la 1ère ligne de l'élément 2. De la même façon, on remplace la 3ème ligne de ce système par la somme de la 2nd ligne de l'élément 2 et de la 1ère ligne de l'élément 3. Ceci revient à ajouter, les matrices de raideur à une matrice globale. Ce qui donne :

$$\frac{E}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} + \frac{\rho g L}{2} \\ \rho g L \\ \rho g L \\ \frac{b}{S} + \frac{\rho g L}{2} \end{bmatrix}$$

On connaît $u(0)=u_1=0$, on peut donc réduire le système et éliminer la 1ère colonne et la première ligne. Le système ci dessus se réduit à :

$$\frac{E}{L} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho g L \\ \rho g L \\ \frac{b}{S} + \frac{\rho g L}{2} \end{bmatrix}$$

8. Le programme Exo2.m montre la résolution pour N = 3 ou 10 éléments au choix.

On obtient donc pour b= 0


$u_2 = 0.0068$, $u_3 = 0.0109$, $u_4 = 0.0122$;

et pour b = 15000 N

$u_2 = 0.0151$, $u_3 = 0.0276$, $u_4 = 0.0372$;


Les erreurs sont négligeables :

Err (b=0) = 2.25e-36



Err (b = 15000) = 1e-36

9. pour 10 éléments



Les erreurs sont elles aussi négligeables.