

## INTRODUCCIÓN AL MODELADO CONTINUO

Primer Cuatrimestre 2025

### Guía de problemas N° 1: Construcción de modelos con EDOs

**Ejercicio 1.** Un médico forense es llamado a la escena de un asesinato. La temperatura del cuerpo al momento de hallarlo es de  $24^{\circ}\text{C}$  y una hora más tarde la temperatura cayó a  $21^{\circ}\text{C}$ . Si la temperatura en el cuarto en la que el cuerpo fue encontrado estuvo constantemente a  $20^{\circ}\text{C}$ , ¿cuánto tiempo pasó desde el asesinato hasta que el cuerpo fue hallado?

Suponer que el cuerpo obedece la ley de enfriamiento de Newton,

$$\frac{dT}{dt} = \beta(T - T_R),$$

donde  $T$  es la temperatura del cuerpo,  $\beta$  es una constante y  $T_R$  es la temperatura del cuarto.

**Ejercicio 2.** La ecuación diferencial usada para modelar la concentración de glucosa en sangre, digamos  $g(t)$ , cuando se administra por vía intravenosa en el cuerpo es dada por

$$\frac{dg}{dt} + kg = \frac{G}{100V},$$

donde  $k > 0$  es una constante,  $G$  es la tasa a la cual la glucosa es administrada y  $V$  es el volumen de la sangre en el cuerpo.

Resolver la ecuación diferencial y discutir los resultados obtenidos.

**Ejercicio 3.** Dos tanques  $A$  y  $B$ , ambos con volumen  $V$ , están llenos con agua a tiempo  $t = 0$ . Para  $t > 0$ , una solución de volumen  $v$  conteniendo un soluto de masa  $m$  fluye hacia el tanque  $A$  por segundo; la mezcla fluye del tanque  $A$  al tanque  $B$  a la misma tasa; y la mezcla resultante fluye hacia afuera del tanque  $B$  a la misma tasa. La ecuación diferencial usada para modelar este sistema viene dada por

$$\frac{d\sigma_A}{dt} + \frac{v}{V}\sigma_A = \frac{m}{V}, \quad \frac{d\sigma_B}{dt} + \frac{v}{V}\sigma_B = \frac{v}{V}\sigma_A,$$

donde  $\sigma_{A,B}$  son las concentraciones del soluto en los tanques  $A$  y  $B$  respectivamente.

Mostrar que la masa del soluto en el tanque  $B$  viene dada por

$$\frac{mV}{v} \left(1 - e^{-vt/V}\right) - mte^{-vt/V}.$$


**Ejercicio 4.** Durante una epidemia, la tasa a la cual las personas sanas se infectan es  $a$  por su número, las tasas de recuperación y de muerte son, respectivamente  $b$  y  $c$  por el número de personas infectadas. Si inicialmente hay  $N$  personas sanas y no hay personas enfermas, hallar el número de muertes para tiempo  $t$ . ¿Es este modelo realista? ¿Qué otros factores deben ser tenidos en cuenta?

**Ejercicio 5.** En un estudio experimental de dinámica poblacional de crustáceos (*Daphnia Magna*) de 1963 los autores encontraron que sus mediciones no coincidían con las predicciones del modelo logístico. Usando la variable  $M$  (la masa de la población) como un indicador de su tamaño, los autores propusieron el modelo

$$\dot{M} = rM \left( \frac{K - M}{K + aM} \right),$$

donde  $r, K$  y  $a$  son constantes positivas. Hallar los puntos de equilibrio y determinar su estabilidad.


**Ejercicio 6.** Una reacción química simple se describe como



lo que indica que los reactantes  $A$  y  $B$  se combinan para producir  $C$  a una tasa  $k$ .

Para modelar reacciones químicas se puede usar la *Ley de acción de masa*. La misma dice:  
**Ley de acción de masa:** La tasa de cambio de una reacción química elemental es proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes.

Escribir las ecuaciones diferenciales que modelan las siguientes reacciones y resolverlas analíticamente o con la ayuda de la computadora.



**Ejercicio 7.** Un oscilador mecánico simple puede ser modelado usando la siguiente ecuación diferencial de segundo orden

$$\ddot{x} + \mu\dot{x} + 25x = 0$$

donde  $x$  mide el desplazamiento del equilibrio

1. Reescribir la ecuación como un sistema lineal de primer orden.
2. Esbozar un diagrama de fases para los valores  $\mu = -8$ ,  $\mu = 8$  y  $\mu = 26$ .
3. Describir el comportamiento dinámico en cada caso suponiendo que  $x(0) = 1$  y  $\dot{x}(0) = 0$ . Graficar las soluciones en el plano  $tx$ .

**Ejercicio 8.** Un circuito eléctrico no lineal capacitor-resistor, puede ser modelado usando la ecuación diferencial

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -x + x^3 - (a_0 + x)y,$$

donde  $a_0$  es una constante no nula y  $x(t)$  representa la corriente del circuito a tiempo  $t$ . Esbozar el diagrama de fases cuando  $a_0 > 0$  y cuando  $a_0 < 0$ . Dar una interpretación física de los resultados.

**Ejercicio 9.** Una población dependiente de la edad puede ser modelada por la ecuación diferencial

$$\dot{p} = \beta + p(a - bp), \quad \dot{\beta} = \beta(c + (a - bp)),$$

donde  $p$  es la población,  $\beta$  es la tasa de nacimientos y  $a$ ,  $b$  y  $c$  son constantes positivas. Hallar los puntos críticos del sistema y determinar el comportamiento asintótico de las soluciones.

**Ejercicio 10.** La potencia,  $P$ , generada por un molino de agua a velocidad  $V$  puede ser modelada por el sistema

$$\frac{dP}{dt} = -\alpha P + PV, \quad \frac{dV}{dt} = 1 - \beta V - P^2,$$

donde  $\alpha$  y  $\beta$  son constantes positivas. Describir el comportamiento cualitativo del sistema cuando  $\alpha$  y  $\beta$  varían y dar interpretaciones físicas de los resultados.

**Ejercicio 11.** Un modelo muy simple de la economía viene dado por

$$\dot{I} = I - KS, \quad \dot{S} = I - CS - G_0,$$

donde  $I$  representa el ingreso,  $S$  la tasa de gastos,  $G_0$  es la constante de gastos del gobierno y  $C, K$  son constantes positivas.

1. Graficar posibles soluciones cuando  $C = 1$  e interpretar esas soluciones en términos económicos. ¿Qué sucede cuando  $C = 1$ ?
2. Graficar la solución cuando  $K = 4, C = 2, G_0 = 4, I(0) = 15$  y  $S(0) = 5$ . ¿Qué sucede con otras condiciones iniciales?

**Ejercicio 12.** Las ecuaciones de Lotka-Volterra adimensionales son

$$\begin{aligned}\frac{dh}{d\tau} &= \rho h(1-p), \\ \frac{dp}{d\tau} &= -\frac{1}{\rho} p(1-h),\end{aligned}$$

donde  $h$  y  $p$  representan la población escalada de presa y depredador respectivamente y  $\rho$  es un parámetro positivo.

1. Mostrar que existe una función  $(h, p) \mapsto f(h, p)$  que es constante en cada trayectoria del plano  $(h, p)$ .
2. Usar el resultado del ítem anterior para encontrar una función de Lyapunov definida en un entorno del punto de equilibrio  $(1, 1)$ .

**Ejercicio 13.** Para desarrollar una estrategia para cosechar un recurso renovable, consideremos la ecuación

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - H(N),$$

que es la modelo de crecimiento logístico usual con un crecimiento de la tasa de mortalidad como resultado del proceso de cosecha.  $H(N)$  representa el rendimiento de la cosecha por unidad de tiempo.

1. Suponiendo que  $H(N) = CN$  donde  $C$  es la tasa de captura intrínseca, encontrar la población de equilibrio  $N^*$  y determinar el rendimiento máximo.
2. Si como estrategia alternativa se considera cosechar con una rendimiento constante  $H(N) = H_0$ , el modelo es

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - H_0.$$

Determinar el punto de equilibrio estable y mostrar que cuando  $H_0$  se aproxima a  $\frac{1}{4}rK$  por abajo, existe el riesgo de que la población cosechada se extinga.

**Ejercicio 14.** Supongamos que el sistema

$$\dot{N}_1 = r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1}\right) - \lambda_1 N_1 N_2 - C N_1, \quad \dot{N}_2 = r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2}\right) - \lambda_2 N_1 N_2,$$

es un modelo aceptable de dos especies de peces que compiten, en el que la especie 1 está sujeta a ser cosechada. Para ciertos valores de los parámetros (en particular con  $C = 0$  -sin cosecha-), este sistema tiene un equilibrio inestable con valores no nulos de ambas poblaciones. En este caso particular, ¿qué sucede cuando la tasa de cosecha  $C$  se hace positiva?

**Ejercicio 15.** La competencia entre dos especies por el mismo recurso se puede describir por el sistema bidimensional

$$\dot{N}_1 = N_1 f_1(N_1, N_2), \quad \dot{N}_2 = N_2 f_2(N_1, N_2),$$

donde  $f_1$  y  $f_2$  son funciones diferenciables.

1. Mostrar que la pendiente de las nulclinas es negativa.
2. Suponiendo que existe un único punto de equilibrio no trivial  $(N_1^*, N_2^*)$ , dar condiciones para que ese punto de equilibrio sea asintóticamente estable.

**Ejercicio 16.** El sistema de ecuaciones diferenciales usado para modelar especies que compiten por recursos es

$$x' = x(2 - x - y), \quad y' = y(\mu - y - \mu^2 x),$$

donde  $\mu$  es una constante. Describir el comportamiento cualitativo del sistema cuando el parámetro  $\mu$  varía.

**Ejercicio 17.** Un sistema predador-presa puede modelarse mediante el sistema

$$x' = x(1 - y - \varepsilon x), \quad y' = y(-1 + x - \varepsilon y),$$

donde  $x(t)$  es la población de la presa e  $y(t)$  la del predador a tiempo  $t$  respectivamente. Clasificar los puntos críticos para cada valor de  $\varepsilon \geq 0$  y graficar los diagramas de fase para los diferentes tipos de comportamiento cualitativo. Interpretar los resultados en términos del modelo.

**Ejercicio 18.** En algunos experimentos realizados en dos especies de moscas de frutas, los autores testearon 10 modelos diferentes de competencia interespecífica, incluyendo el modelo de Lotka-Volterra como un caso especial. Se encontró que el modelo que daba el mejor ajuste a los datos experimentales es

$$\dot{N}_1 = r_1 N_1 \left( 1 - \left( \frac{N_1}{K_1} \right)^{\theta_1} - a_{12} \frac{N_2}{K_1} \right), \quad \dot{N}_2 = r_2 N_2 \left( 1 - \left( \frac{N_2}{K_2} \right)^{\theta_2} - a_{21} \frac{N_1}{K_2} \right),$$

donde  $r_1, r_2, K_1, K_2, \theta_1, \theta_2, a_{12}$  y  $a_{21}$  son constantes positivas. ¿Bajo qué condiciones este modelo presenta un punto de equilibrio no trivial asintóticamente estable?

**Ejercicio 19.** Dado el Hamiltoniano  $H(x, y) = \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}$ , esbozar el diagrama de fases para el sistema Hamiltoniano asociado.

**Ejercicio 20.** Graficar un diagrama de fases para la ecuación del péndulo amortiguado

$$\ddot{\theta} + 0,15\dot{\theta} + \sin \theta = 0$$

y describir qué sucede físicamente.

**Ejercicio 21.** Estudiar la estabilidad del origen como punto crítico para los sistemas:

1.  $x' = -y - x^3$ ,  $y' = x - y^3$ , usando la función de Lyapunov  $V(x, y) = x^2 + y^2$ ;
2.  $x' = x(x - \alpha)$ ,  $y' = y(y - \beta)$ , usando la función de Lyapunov  $V(x, y) = (x/\alpha)^2 + (y/\beta)^2$ ;
3.  $x' = y$ ,  $y' = y - x^3$ , usando la función de Lyapunov  $V(x, y) = ax^4 + bx^2 + cxy + dy^2$ .

**Ejercicio 22.** Probar que el origen es el único punto crítico del sistema

$$\dot{x} = -\frac{1}{2}y(1+x) + x(1-4x^2-y^2), \quad \dot{y} = 2x(1+x) + y(1-4x^2-y^2).$$

Determinar la estabilidad del origen usando la función de Lyapunov  $V(x, y) = (1-4x^2-y^2)^2$ .

**Ejercicio 23.** Consideremos el siguiente sistema bidimensional

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1-3x_1^2-2x_2^2),$$

que describe un oscilador armónico perturbado. Usar el teorema de Poincaré-Bendixson para demostrar la existencia de un ciclo límite.

*Sugerencia:* Usar coordenadas polares para mostrar que existe un conjunto invariante acotado de la forma

$$\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 < r_1 < x_1^2 + x_2^2 < r_2\},$$

que no contiene puntos de equilibrio.

**Ejercicio 24.** ¿Para qué valores de los parámetros el modelo de Holling-Tanner

$$\dot{x} = x\beta \left( 1 - \frac{x}{k} \right) - \frac{rxy}{(a+ax)}, \quad \dot{y} = by \left( 1 - \frac{Ny}{x} \right)$$

tiene un ciclo límite?

**Ejercicio 25.** Graficar los diagramas de fases para el sistema de Liénard

$$\dot{x} = y - \mu(-x + x^3), \quad \dot{y} = -x,$$

cuando  $\mu = 0,01$  y  $\mu = 10$ .

**Ejercicio 26.** La segunda ecuación adimensional de Ludwig-Jones-Holling que modela el brote de gusanos de las yemas es

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{k}\right) - \frac{x^2}{1 + x^2},$$

donde  $x$  representa la densidad escalada de gusanos y  $r, k$  son parámetros positivos.

1. Mostrar que, dependiendo de los valores de  $k$  y  $r$ , existen o bien 2, o bien 4 puntos de equilibrio y estudiar la estabilidad de los mismos.
2. Determinar analíticamente los dominios en el espacio  $(k, r)$  donde esta ecuación posee 1 o 3 puntos de equilibrio. Mostrar que el borde entre esos dos dominios tiene una cúspide. Hallar sus coordenadas.

**Ejercicio 27.** Considere que se cosecha una especie de peces en grandes lagos. La ecuación diferencial usada para modelar la población  $x(t)$  en cientos de miles de habitantes es dada por

$$\frac{dx}{dt} = x \left(1 - \frac{x}{5}\right) - \frac{hx}{0,2 + x}.$$

Determinar y clasificar los puntos críticos y realizar un diagrama de bifurcación.

¿Cómo puede ser interpretado el modelo?

**Ejercicio 28.** Consideremos los siguientes sistemas de ecuaciones diferenciales uniparamétricos:

1.  $x' = x, y' = \mu - y^4$ ;
2.  $x' = x^2 - x\mu^2, y' = -y$ ;
3.  $x' = -x^4 + 5\mu x^2 - 4\mu^2, y' = -y$ .

Hallar los puntos críticos, realizar un diagrama de fases y esbozar un diagrama de bifurcación para cada caso.

**Ejercicio 29.** Consideremos los siguientes sistemas uniparamétricos en coordenadas polares:

1.  $r' = \mu r(r + \mu)^2, \theta' = 1$ ;
2.  $r' = r(\mu - r)(\mu - 2r), \theta' = -1$ ;
3.  $r' = r(\mu^2 - r^2), \theta' = 1$ .

Graficar los diagramas de fases para  $\mu < 0, \mu = 0$  y  $\mu > 0$  en cada caso. Esbozar los correspondientes diagramas de bifurcación.